

Pallygonum

Compositum 2 I fructibus cancellatis, fetis ramosis mollibus. L Heret in
Act. sci. Lin. 1. pag. 100
Habitat in Aegypto et Barbana &
an varietas praecedenti

polygonoides Call: fructibus cancellatis setis ramosis rigidis L'Herit in
art. sci. lin. 1. pag. 179
Polygonoides orientale Ephedra facia Tournef. cor. 47. t. 2.
p. 356. tab. 356
Calligonum polygonoides Lin. Spei. pl. pag. 740
Habitat in Armenia †

non vid.

Pallasiæ Cal. Insetibus alatis, aliis membranaceis crispis dentatis L'Herit in lra

Trans: 1. p. 100x

Pterococcus aphyllus Pall. A. 11. 730. 7. 5 et 111. p. 356

Pallasiæ caespicia Lea. Suppl. p. 100

Habitat ad mare caespitum

Indes semicorymbis, ramis diffusis totus flendus. Rami alterni
teretes reclinati, flexuosi, articulati, subnodosi, aphylli. Tunones
ad singula genicula 6-10 confertissimi, parvi saepe ramosi, subulati
articulati subglaucescentes. Folia alterna sessilia, solitaria
ad singulas articulationes Tunonum, teretia, subulata, carnosae,
Tunonibus conformia, seminealia. ^{lobata} Apula. membranacea obsolete
infida articulum ambrae ut in Polygoni. Flores laterales vel
axillares, saepe terni ad singulum articulum pedunculati, fragrantis