

Pallitriche

Col. 0. Pet. 2. Sem. quatuor nuda, cincta, membranae marginata  
fo

Specimen fide autumnale & canbaxi Richard de 23/ non in C. canbaxi  
fide nazari

polymorpha Callitriche foliis ovalibus linearibusve apice integris bifidisve

serena α Alsiue aquatica surrector Bauh. hist. 3. p. 786.

Callitriche serena foliis superioribus ovalibus floribus androgynis  
Lin. S. Veg. p. 92.

Callitriche fontana. Scop. fl. Carn. no 1201.

Callitriche dioca; foliis inferioribus lanceolatis superioribus ovalibus, in petiolum decurrentibus; floribus deorsum Petage.  
inst. bot. 2. p. 10.

Stagnalis β. Callitriche Plein Colum. Ephr. p. 315. f. 316.

Stellaria foliis petiolatis subrotundis Hall. hel. no 553.

Callitriche stagnalis Scop. fl. Carn. no 1202.

intermedia γ. Stellaria aquatica Tab. ic. p. 792.

Stellaria Callitriche dubia; foliis superioribus ovalibus, caulinis linearibus bifidis Rothe. fl. Germ. 2. p. 477.

Austriacalis δ. Stellaria aquatica longifolia Petiv. fl. Br. t. 674.  
Lenticula palustris angustifolia; foliis apice despecto  
Loes. fl. Prus. 140. t. 38.

Callitriche autumnalis; foliis omnibus linearibus apice bifidis, floribus  
hermaphroditis Lin S. Veg. p. 53.

~~longata~~  
~~longata~~ & Callitriche bicha foliis linearibus oppositis connatis, internodiis  
distantibus Petag. inst. bot. 2. p. 10

~~galioides~~ & Alsine palustris repens multicaulis galifolia Herb. Vaillantii

Habitat a. p. v. d. in Europa fossis aqueosis a quoque <sup>in</sup> Japonia, &  
in Calabria Calabur, <sup>in</sup> ad margines stagnorum, omnes primo vere  
florent

# in S longitudo  
radigiti mini <sup>radicibus</sup> caulibus palmatis & ultra, in E longissimi  
radicibus palmatis & ultra, in D & E longissimi <sup>radicibus</sup>

opposita, Folia <sup>in</sup> inferiori remotiora, & superiora conferta in rosulam. Flores interdum

Polygami, interdum hermaphroditi, raro divici, plerumque monoci

♀ filamenta femibus foemineis inferne, masculis superne; in omnibus axillares;

breviora sessiles, solitarii oppositi interdum alterni. Folia in a & b basi

in petiolum acuminata, integerrima in y tantum superora, in d. E. & line

aria in d apice divisa in e & e apice integra. E. quam apud Petagna vidi  
michi videbatur differre nisi caule elongato et articulis longioribus verosimile a loco

Serna Callitriche foliis superioribus ovalibus, floribus androgynis. Lin.

S. Veg. p. 52. Cl. Dan. 1. 129.

Alsine aquatica Burmeister Bank. hist. 3. p. 786

videtur <sup>3</sup> Callitriche Plin. Colum. Ephr. p. 315. f. 316

Stallani foliis petiolatis subrotundis Hall. herb. no 553.

Habitat in Europa foris aquis, vasa florens

Caulis filiformis, teretes, palmares, ultra, ad 6 articulos  
radicantes. Folia integerrima, in petiolum acuminata, opposita  
superiora in rosulam conferta. Flores axillares, inferiores feminei  
superiores masculi. filamentum elongatum.

# hic multata 2 folia breviora, florum feminei inferioris, hermaproditum speciosum

retusa Justicia specis terminalibus, bracteis obovatis subtrifidis <sup>imbriatis</sup> glabris  
foliis ovatis acuminatis

# Ex Insula St. Crucis Americae misit Dr. Pflug.

Caulis herbaceus, teres, glaber, uti tota planta

Folia petiolata, bipollicaria et ultra, nervis utraque elevatis,  
in egerima obtusa sinuata, subtus pallidiora.

Petoli unguiculares

Pedunculus terminalis simplex 3-4 pollicaris apice floriferus.

Flor. in specis brevi pollicari, solitarii, oppositi

Bractes ternae ad singulum florem: exterior reliquis <sup>multo</sup>  
latior, fere sinuata basi angustata obovata duo laterales  
oblonga basi attenuata exteriori brevior. pilis minutis pubesca  
tis

Calyx quinquepartitus: laciniis lanceolatis glabris

Corolla magna, purpurea, ultra medium fissa; labium  
superius lanceolatum bidentatum, <sup>superius inferius brevius</sup> in genus triplo latius tri-

fidum: laciniis oblongis, superiore longiore.

Stamina longitudine labii superioris. Anthera gemina

Spathulata 2 Callitriche foliis <sup>omnibus</sup> rhombico ovatis <sup>spathulatis</sup> petiolatis, capsulis globosis

Habitat in nova Zelandia mecum communicata a Dr. Dahl.

Planta tenella - Caudis repens, subopellans. Folia minora per quam  
C. verticalis, glabra, opposita, <sup>in eodem</sup> medio denticulo minuto. Capsula  
res, solitaria sessile.

~~Callitriche~~

trijulea  
distorta

Justicia pedunculis axillaribus subtrifloris floribus sessilibus, foliis

oblongis obtusis. <sup>distorta</sup>  
~~Justicia trijulea (L.) Ten pag. 7~~  
~~Habitat in Umbra foliis~~

apud Ytazono

Tricoma rigidus. Ramis oppositis, distortis, cicatrisatis, teretibus. <sup>corollae</sup> cinereis pubescentes, res, inferne aphylli.

Folia petiolata, pollicaria, approximata, oblonga, integerrima, coriacea, avenia, nervosa: Venella subbinera centa.

Pedunculi axillares, solitarii, oppositi, petiolo <sup>petiolo duplo brevioris</sup> bi s. triflori.

Flores sessiles. Bractea utrinque ad apicem petioli, lanceolata, calycis longior, alia sua ad basin singuli calycis, ovata <sup>levis</sup> einarescens calycis brevior.

Calyx quinque fidus: laciniis lanceolatis subullosi.

Corolla sesquipollicaria; labiis aequalibus; superius lanceolatum obtusum, integrum: inferius trilobum, laciniis lineari-

Hamula longitudine corollae. Antheris geminis

Stylus, corolla longior

pedunculata? Callitriche folus setaceis, floribus pedunculatis.

~~Callitriche~~  
Habita Parisi Desfontaine

Calles palmares vel spithomsi, alternatim ramosi, capillares:  
rami indivisi. Sola ~~pro~~posita, potentissima, unguiculata, summa  
congesta, acutissima. Pedunculi axillares, solitarii, uniflori, alterni.  
Oculus parum minor quam in verna. Stamina non vidi, an dicitur?

Callitriche ~~folis~~ ~~setaceis~~ ~~linearibus~~ ~~quasi~~ ~~lanceolatis~~, ~~floribus~~ ~~alternis~~  
parisi Desfontaine p. 11.



fruticosa Salicornia caulescens fruticoso Lin. Spec. pl. p. 5. \* S. V. p. 52.

Nali Tabern.

Salicornia Dod.

Nali geniculatum majus Bauh. Pin. 5.

Habitatio Europa maritima

Sempervirens et caesa longe major a herbacea videtur diversos, proterquam  
quod specie etiam differant. Differentia loci si ulla Lin.  
varietas absque dubio

articulis ramulorum ancapitibus, squamis florali-  
bus truncatis membranaceis Willd.

Rami oppositi. Specie laterales et terminales opposito angulatos.

Salicornia var. Tortu