

Campanula

Campanula

Habitat herb. Tournef.

Caulis herbaceus, crassitie pennis asperius, hirtus. Folia bipollicaria lanceolata  
to oblonga, basi in petiolum attenuata, superiora sessilia, exteriora obtuse fer-  
rata, obtusa, villosa, scaberrima, subtus costa hirta. Pedunculi axillares  
superne uni flori, diphylli, hirti, folio florali longiores. Flores maximi. Calyx  
obtusius: lacinae ovatae, acutae, hirtae. an medium? flores crati.

Campanula

Campanula calyc. Duro Ephesio Tournef. herb.

Habitat in Epheso herb. Tournef.

Canescens, pedalis majoris: rami sub simpliciter. Folia cuneata, inferum in  
petiolum longum attenuata

Campanula

Campanula pratensis, pumila, repens, flore minore Tournef. herb.

Habitat in P. Eur. herb. Tournef.

Planta, caespitosa. Caulis interdum digitatus, uno floribus, dichyllus. Folium  
linearia, integerrima.

Campanula

Campanula orientalis, angustifolia, penula, floribus coeruleis, uno vesp.  
Asproptis Tournef. Cor. pag.

Habitat in Ibero herb. Tournef.

Caules <sup>ascendens, glaber, inferne angulatus, superne ter.</sup> simplex, subpedalis. Folia cordato-oblonga inferne petiolata, oblongo  
lanceolata, basi attenuata, inaequaliter crenata, margine serrata acutis,  
oculo aromato villosa, superiora sessilia lanceolata, remota, paucia. Ra-  
dunculi superne, filiformes, uniflori, superne folia duo sessilia. Flores pen-  
di, nutantes, C. rotundifolia majoris. Calyx obtectus: laciniis linearibus lan-  
ceolata, glabra

habeo

*Tubulosa Campanula*

*Campanula cretica* caule supino, foliis incispi, flora oblongo Tournef. Cor.

Habitat in Creta herb. 9 usq.

Caules decumbentes, ramosi, pilosi. Sola in ferora in petiolum attenuata, petiolo lato membranaceo, et folio decurrente dentato. Folia tripliciana, supinum semper minus, obtusiuscula, inaequaliter obtuse serrata, basi subincisa, suprema ovata, sessile, acuta, ut tripliciana inaequaliter serrata, omnia villosa, venosa. Pediculi ex apice ramorum, solitarii, uniflori. Calycis lacini lanceolata, attenuata, uti corolla exterior villosa. Capsula obtusa

alata Campanula

Habitat Algona Herb. Desfontaine

Caulis herbaceus, simplex, crassitie fere digiti minimi, glaber. Folia  
semidecurrentia, bis. 3 pollicaria, frequentia, lanceolata, glabra, sub  
senosa, serrata: serraturis oculo armato spinulosis subseratis. Spica  
terminalis, tripollicaris. Flores approximati. foliola lanceolata, calycis  
longitudine, integerrima. Germen hirsutum. Calycis laciniis lanceolatis  
ciliatis

velutina Campanula

Habitat herb-Desfont.

Caudex pilosus, decumbens, villosus-tomentosus, inanis, uti folia, pitha-  
mosi. Stipula oblonga, integerrima



Campanula

Habitat in Syria herb. Desfont.

Caulis plures, decumbentes, inani, uti reliqua planta, ramis,  
angulati. Cola intendum sempollitosa, serrata. Calycis obtusi

Supina Campanula

Campanula uetula caulibus supinis, foliis incisi flore oblongo Tournef

Cor. pag.

Habitat in Creta herb. Desfont. 4

Caulis plures, herbacei, fruticulosi, villosi, simplices. Sola remota, inferiora petis  
lata, superiora alterna, oblonga, pollicaria, serrata, acuta, tenui, villosula  
acuta. Pedunculi axillares et terminaliter, 2-4 phylli, folio longior, unguis  
ni. Calyx obtusus, villosus, uti corolla edius: laciniis lanceolatis, attenua  
tis, patentibus. Corolla calyce parum longior, uti semipollinaria

Verbasci Campanula

Habitat

Hort. Panf.

Caulis erectus, crassitie pennis-egnea, villosus, subanascens, teres, simplex.  
Folia ovata, obtusa, serrulata, vix serrata, acuta, subtus incana, inferora  
petiolata, basi attenuata, superiora sessilia. Spica terminalis, pedalis, erectus,  
basi compositus. Flores copiosi, parvi, quinquefidi. Calycis villosi, ore  
serrato serrulati.

reperi Campanula foliis oblongis carnosis, floribus solitariis, caelestibus.  
vixo reperto Lour. fl. Coch. pag. 139.

Habitat in agri Cochinchino.

Caulis herbaceus et monopneus. Folia oblonga ovata integerrima  
nervosa, pilosa, opposita. Flores axillares simpliciter albi. Capitula pilo  
sa monopneis

an hujus generis?  
non vidi

~~foliatus~~  
nutans

Camparula consulari quinquelobularibus, caule in diviso erecto folioso,  
floribus nutantibus

Habitat in Hungaria a Nitarelio missa sub nomine Cervulle

Caulis sesquipedalis, simplicissimus, erectus, <sup>subhirsutus</sup> villosus, infer-  
ne purpurascens, superiorae partem striatam. Folia <sup>patentia & longa</sup> & parva bipollicia-  
ria, inferiora & superiora minoria, parum <sup>inferius</sup> decurrentia, lanceolata  
inferna basi versus sem oblonga lanceolata basi versus superiora  
attenuata, <sup>inferna</sup> venis <sup>obtus a superiora remote serrata acuti</sup> crenato serratis, venis <sup>tripliciter</sup> sub glandula mucosa  
terminata, subpubescentia, & subhirsuta. Peduncululi <sup>superne</sup>

alterni remoti pubescentes, scabrum <sup>lineari</sup> pediculi quadri-quinqueflori  
pedicelli distantes uniflori, basi folio <sup>lineari</sup> ciliato ~~puber~~ & puberti, et duo  
minores in tribus lateralibus oppositi. Flores ante et post antheras  
erecti, sub florescentia nutantes, uterque folio duplo majoris  
caeruleo violaceo. Calycis obtecti, laciniis <sup>lineari</sup> lanceolatis

<sup>retusis</sup> ciliatis lacunosa Corolla quoque ante antheras in quinque angul-

tae angulis pilosis, laciniis <sup>retusis</sup> intus pilis longis crispis adspersa  
laciniis oblongis, parum reflectis medio linea divisa, ab utroque

~~affine aloni~~

germen pentagonum angulis ciliatis velis variis nonnullis adspersis  
et ciliatis vel glabris

34-35  
omne medium

*Catipoleus* Glad. ~~leptus~~, foliis lato-lanceolatis plicatis nervis  
rariis longioribus, tubo pappi brevior. La Mark. T. Enc. pag. 119  
Habitat in Ampela Francie

Campanula Caucasica capsulis trilobularibus cernuis, cauliculis erectis pau-  
cifloris, foliis obovatis crenatis scabris, radice repente Masch. in Pflanz. Jour.  
J. D. bot. 1. b. pag 456

Habitat in abruptis sterilibus lapideis circa Kust-Kulak &  
Planta pygmaea. Capsula obliqua

Convolvata Campanula

young young

Habitat in Hungaria Vitisal

Talis p. glom. Tota scabra, pubescentia. Caulis pedalis vel sesqui-pedalis, erectus, subangulatus, ramis, ramis alternis, simplicibus caule brevioribus. <sup>folia stipuligeris</sup> Folia radicalia oblongo lanceolata, <sup>crenata</sup> ~~oblongo lanceolata~~, <sup>gemis amplius caulis</sup> ~~oblongo lanceolata~~, undulata pubescentissima, utrinque punctis piliferis, praesentibus. Flores terminaliales in capitulo involucreto collecti, circiter 16. magnitudine glomerata involucrem polyphyllum foliata lanceolata, squae exteriori reflexa basi dilatato-cordata, pollicariam internodia minorum erecta. Gamae globosae, depressae globosum angulus decem ea stantibus ciliatis calycis laciniis linearibus lanceolatis ciliatis. Corolla glabra laciniis erectis acutiusculae

prostrata f. folio suber. prostrata globosa, racemo terminali, ciliatis, erectis. Hort. Kew. t. p.  
 prostrata: laciniis alternis angustioribus, filicamentis erectis. Hort. Kew. t. p.  
 59  
 Habitat in Cap. b. p. 2



~~australis Agrostis panicula subspicata, seminibus ovatis pubescentibus: aristis longis  
Studine calycis Mant 36. \* L. V. p. 110~~

~~Habitat in Hispania~~

~~Culmi tripedales, articulati, foliosi, laeves. Simillima A. arundinacea, sed  
panicula magis spicata. Semina non basi hirsuta, sed undique pubescentia.  
Calyces apice fere staccii. Folia latiora, planiora. Culmus plu-  
ribus geniculis Lon. Mant l. c.~~

milium leudigenum est

bellidifolia C foliis obovatis petiolatis glabris serratis racemo ter-  
minali simplici floribus remotis

Habitat in Gava Thaurin

Caulis vix d. tota planta vix palmarum simpliciflorus  
herbaceus siciformis, ramis pubescentibus. folia sesqui-  
pollicaria, basi attenuata, se obtuse paucis serrata super-  
na. Peduncululus terminalis caule longior flexuosus  
floris dicitur octo. Calyx glaber laciniis lanceola-  
tis stigma simplex

vix hujus generis  
flos non vidi an igitur Campanula hinc retuli ob similitudinem cum  
C. Enno

Limonifolia C. ramis patentibus indivisis. foliis radicalibus ellipticis. Lobis integerrimis, floribus sessilibus ternis *Lin. Spec. pl. 239\* L. V. p. 210*  
*Campanula orientalis, limonii minimi Jacq., flore patulo Tournef. corol. 3.*  
Habitat in Oriente

Folia radicalia ovali-oblonga, integerrima, glabra, petiolata, non tamen rigida.  
Caulis ramis simplicissimis virgatis, foliis linearibus, subulatis. Flores remoti, axillares, sessiles, sepius terni, bracteis longitudine germinis *Lin. Spec. l.*

unidentata Camp erecta, glabra, foliis lanceolatis acutis utroque unidentatis, parvis  
Cula divaricata Lx. Suppl. p. 139. t. V.  
Habitat in Cap. bono spici  
Caulis simpliciter spinosus

unidentata foliis lanceolatis denticulatis glabri caule simpliciter  
floribus racemosis Thunb. prodr. fl. Cap.

non ardi

aurca Camp. capsulis quinqueloculatis, Stigmatibus quinquefidis, caule paniculato,  
foliis duplicato serratis Lin. Suppl. p. 1417 S. V.

Habitat in Insula Madera 7

Caulis paniculati, rufus depressi. Folia lanceolata, glabra. Calyx superus, coloratus. Corolla tubus a calyce distinctus: laciniis linearibus, reflexis Lin. l. c.

aurca P. capsulis quinqueloculatis, foliis ellipticis serratis glabris, floribus subpaniculatis quinque partitis, caulebus fruticosis carnosissimis Hort. kew. 1. p. 223

*Tetraphylla C. foliis quaternis oblongis serratis Thunb. fl. jap. p. 874 L.V. p. 211*

*Habitat in Japonia*

Caules <sup>obtusiusculi</sup> angulati, articulati glabri, bipedales, superne <sup>ramos</sup> paniculato ramosi. Rami 4 oppositi et alterni virgati, diffusi, subtetragoni floriferi glabri, superioribus brevioribus capillaribus. Folia sesquialtera inferne attenuata, acuta, supra viridia subtus pallida, nervo medio elevato: glabra pollicaria. Flores in ramis racemosi; cernui bracteae serratae glabrae. Racemi multiflori pedunculis capillaribus unguiculatis. Corolla alba Thunb.

*Lilifolia* l. foliis lanceolatis: caulinis acute serratis, floribus paniculatis nuda  
Hb. L. S. V.

*Campanula* utrius foliis glabra, floribus minoribus pendulis Amm. ruth.

11. n. 17.

Habitat in Tatana, Sibiria B

Caulis erectus striatus glaber, teres simplex. Folia petiolata parva  
frequentia acuta adnata glabra <sup>tripollicana superiora minus</sup> subtus pallidiora grosse serrata  
flos superne paniculati, pedunculi remoti pauci  
feliciformes <sup>calycis glabro</sup> supremis simplicibus. Flores magnitudine campanulae rotunda folio.

Folia inferioribus serratis glabris orbis, superioribus cordatis super  
nura lanceolato elliptica floribus paniculatis nutantibus.

allianifolia Campanula - capsulis <sup>obtusis</sup> <sup>dentatis</sup> flantibus radicalibus  
reniformibus duplicato, caulinis ovatis dentatis sepli-  
bus Wild. spec. pl. pag 910.

C. orientalis Alliano folio, flore albo pyramidato

Tournef. Cor. 3.

Habitat in Oriente

non vid.



pyramidalis L. foliis lobatis serratis cordatis, caulibus canaliculatis, caulibus pinnatis simplicibus, umbellis sessilibus lateralibus Lin. I. V.

Rapunculus hortenii; latiori folio, f. pyramidalis Benth. pin 93.

Habitat

Caulis erectus terribilis stratus teres. folia petiolata bipol-  
lici area serratis minutis apice cartilagineis superne  
sensim minora frequentia. Flores copiosi racemosi pe-  
dicellis saepe pluribus filiformibus unifloris, bracteis linea-  
ribus longitudine pedicellorum. Caernis calycis subula  
to

---

foliis serratis serratis cordato ovatis caulibus canaliculatis  
obliquo canaliculatis serratis cartilagineis, caule simpliciter  
racemo terminali

grandiflora  $\odot$  foliis ternis oblongis serratis, caule unifloro, flore patulo *Lin. Sup.*  
p. 140. *S.V. p. 207x. Flacq. bot. 3. t. 2. Gmel. bot. p. 3. p. tab. 20.*

Habitat in Tatara, Siberia *cauli simplex*

Caules tenues <sup>sub</sup> striati, glabri. Folia sessilia, sesquipollicaria <sup>perduntur data terni</sup>  
<sup>utroque</sup> glabra subtus glauca venosa, <sup>pedunculis</sup> <sup>suprema</sup> <sup>lanceolata</sup> <sup>alternis</sup> <sup>terminalibus</sup> interdum altera ex axillis <sup>supremo</sup> <sup>ramis</sup> <sup>trifloris</sup>  
<sup>natis</sup>. Calycis <sup>lobis</sup> <sup>tuberculatis</sup> <sup>lineatis</sup> <sup>elevatis</sup> <sup>glauco-</sup>  
<sup>reflexis</sup> <sup>laciniis</sup> <sup>linearibus</sup> <sup>glabris</sup>. Laciniis corollae  
ovato acutis. Tota rarisime ternata

*foliis lanceolato-oblongis serratis* <sup>pubescentibus</sup> *caule subuni-*  
*floro, corolla patente*

*Campanula gentianoides* La Mark

*Culta*

Carpaticea P. foliis glabris cordatis serratis petiolatis, pedunculis elongatis, caly-  
ce reflexo glutinoso, corolla patula Lin. Suppl. p. 140 S. V. 207. Geiq. h.  
1. Tab. 57.

Habitat. in alpebus Carpaticeis,

Carpaticea P. foliis omnibus cordatis serratis petiolatis glabris, ramis filiformibus  
unifloris Hort. New. t. p. 19.

Caulis ascendens & lineis decumbentibus subius angulatus glaber, ramis  
pedalis. Stipulae <sup>longae</sup> petiolatae, sparsae, glabrae venosae cavae sequipollicia-  
res, Petiolus foliorum longior. Pedunculi aliquot supremi uniflori  
Calyx glaber laciniis lanceolatis acuminatis. Corolla minor quam  
in grandiflora

americana Campanula foliis cordatis lanceolatisque serratis, petioli inferorum ciliati, floribus axillaribus simplicibus, corollis quinque partitis planis, stylis corollae longioribus Hort. kew. 1. p. 220

Campanula americana foliis cordatis lanceolatisque petioli ciliatis, floribus secundis, corollis quinque partitis planis Lin. 1. V. pag. 206.

Habitat in Pennsylvania <sup>man. 3374</sup>

Caulis et gemmae teretes. Folia acuminata. Flores tres s. plures ex  
singulis alii s. bracteis. Corolla parva. Stylus corollae longior

non vid.

*Sapiumulata* Camp. fructuosa, erecta, foliis ovatis subuni-entatis recurvis, flori-  
bus glomeratis terminalibus Len. Suppl. p. 139. L. V.  
Habitat in C. bonopei

Senella C. caulis diffusis glabris, foliis ovatis subusidentatis reflexis,  
floribus solitariis terminalibus Lin. Suppl. p. 141. L. V. p. 207.

Habitat in C. b. p. r.

a Thunb. sub hoc nomine habui sed vix mihi videtur huius generis calycis  
caulis <sup>in hunc est p. ten. stylus induratus. Pneuma campanulae, dicitur in hunc</sup>  
caulis <sup>caulis</sup> crassitie fidei emporitici purpurascens glabri ligno  
si. Folia coriacea cum rudimentis foliorum in axillis omni  
bus bilinearia acute reflexa, integerrima vel raris dent  
utrinque unice margine incurvata ramuli laterales  
et terminales simplices unis piflori laciniis calycis lan  
ciolato, medio linea elevata distincta et Camp Senella

16

Zoysii C. Caulibus subtrifloris, foliis radicalibus ovatis longe  
petiolatis caulinis oblongis ovatis sessilibus. Georgia - coll. 2  
p. 122.

michi cognata



~~verticillata~~ Camp foliis floribusque verticillatis Lin. Suppl. p. 1417. l. V

Camp. verticillata Pall. Fl. vol. 3. p. 719. t. Gx fig. 1.

Habitat in Daunia 4

Folia quina s. sena verticillata, lanceolata, serrata. Flores verticillati plures,  
pedunculati, nudantes. Lin.

undulata Camp. foliis lanceolatis dentatis undulatis, floribus subpeltatis pedunculatis  
Lin. Suppl. p. 442. S. V.  
Habitat in Cap. bono spei

non vidi

compresja Camp. herbarica, erecta, foliis lanceolatis dentatis recurvis basi ciliatis ad  
presji, panicula decemprocta Len. Suppl. p. 140. t. V.  
Habitat in Cap. bono frei

*Cernua* P. caule erecto, paniculato, foliis lineari lanceolatis dentatis

Habitat in cap. b. frei

Caulis dens folia unguiculata remote denticulata. Calycis  
parvi quinque dentat.

folia adpressa Thunbergii

Specimen imperfectum ~~an eadem cum paniculata~~

cinerea Camp. erecta, tomentosa, foliis subulatis integris erectis approximatis, floribus  
solitariis terminalibus Len Suppl p. 139. S. V. p.  
Habitat in C. bono spei

foliis lanceolatis integris glabris, caule lanato, floribus  
terminalibus solitariis Tuent. prodr. fl. cap. pag. 39

non vidi

Falckna P. foliis cordatis excipis, caule sarmentoso Thunb. prod. pag. 35

Habitat in Cap. b. p. ei

procumbens Camp. caule dichotomo diffuso, foliis obovatis crenatis obtusis, floribus solitariis erectis Lin Suppl. p. 141. T. V.

Habitat in cap. b. spec. humidis

Planta tenella

Caules filiformes ramosi <sup>procumbentes</sup> glabri. Solia sessileae semperqueculariae glabrae crenis tres vel quatuor utrinque. Pedunculis terminalibus solitariis unifloris erectis Capsulae magnitudine seminis aequandi.

caule repente diffuso, foliis oppositis oblongis crenatis, floribus pedunculis solitariis terminalibus unifloris

52-53. diffusa Campanula caulis diffusis foliis <sup>petiolatis</sup> ~~ferato~~ <sup>seriatis</sup> dentatis, inferioribus cordatis  
superioribus lanceolatis, pedunculis unifloris.

Campanula parva, rotundifolia, flore conules, pentagono grandi  
Raii h. pag. 791. Tournef. Inst. R. H. pag. 112. fide Heberni Tournef.

Campanula saxatilis, rotundifolia, hispida, flore caelo amplo italica  
Banc. Icon. 453

Habitat in Calabria ~~et~~ Pacifico 4

Præter perennans

Caules diffusi ramosi. Rami teretes, glabri, striati.

Folia petiolata alterna, <sup>obtusè</sup> ~~dent~~ <sup>glabra</sup> serrato-dentata, inferiora cordata, superiora summa lanceolata.

Petiolus longitudine folii

Flora versus apicem pedunculati. Pedunculis solitariis unifloris

suffultus foliolo lanceolato integerrimo.

Lacinia calycis ~~tenues~~ subulatis

( Varietatem vidi caulis folisque pido sissimis, lacinis calycis  
lanceolato subulatis lacinibus.



nervosa *Trichilia* foliis ternatis, folioli ovatis  
Melia Hoedjajie foliis ternis Burman. Pl. Ind. pag. 107.

Habitat in Java Burmannus

Rami apice villosi tomentosi

Folia petiolata, alterna, ternata. Foliola ovata, brevis petiolata, integerrima  
acuta, subtus nervosa villosa, bipollicaria.

Petiolus villosus tomentosus longitudine foliorum, supra canaliculatus  
~~Paniculae~~ axillares, solitarii petiolo longiores contracti

Flores paniculati conferti

Flores in panicula contractis

Catipolia C. foliis ovatis lanceolatis, caule simplicissimo tereti, floribus solitariis  
pedunculatis, fructibus cernuis Lin. Sp. pl. p. 2334 fl. Dan. tab. 782. P. 8

+ Trachelium majus belgicum Claf. hist. 2. p. 172.

+ Campanula maxima foliis Catipolii Bauh. pin. 94.

P. folio conlevo fl. Dan. tab. 782.

+ Habitat in Anglia, Norvegia, Suecia montosis, sepibus & <sup>frequentia</sup>

+ <sup>in pedibus</sup> Caulis erectus <sup>in pedibus</sup> fructu pelis ranonibus aspersus, foliis inferis  
na sessilibus, inaequaliter serrata attenuata tri vel quadri  
nervi ana lobis in venis pelis pora flori rariore  
ext. glis supremis <sup>superiores folia generalibus conjugibus</sup>  
<sup>terminalibus</sup> parum erecti <sup>et rariore</sup> cernui, peduncu  
li pubescentes uniflori calyces glabri lacini lanceola  
to attenuata interdum subserrata flore conlevo etiam  
habet Hallerus

calycibus lobis

non video que nota cernua ab alba d. distingui potest

an illa flore albo diversa. Innot

rapunculoides. Folio cordato - lanceolatis, caule ramofo, floribus secundis par-  
tis, calycibus reflexis Lin. l. v.

Campanula utriusque folio oblongis minus asperis Bauh. pin. 94.

Campanula hortensis, rapunculi radice Bauh. pin. 94. Morph. hist. 2. p. 460  
p. 1. 3. fig. 32.

Habitat in Helvetia, Gallia, Austria, Scythia

Caulis erectus bipedalis vel ultra superne ramosus; teretis  
superne scaberrimus, pili minuti adpressi, folia inferiora  
petiolata superiora sessilia utraque secundum venas  
velosa, scabra attenuata tripollicaria superne vesper-  
tensim angustiora breviora rami tenues ex axillis  
supremis. flores breves pedicellati nutantes bractea linear-  
lanceolata brevior. pedunculis plerumque uniflori rari  
inferiores triflori intermediis longiore. Calycis scabri subvelosi  
lacini lanceolati. lacina corollae lanceolata extus  
glabra

folio ovato lanceolatis, caule ramofo tereti, raris secundis  
calycibus scabri subnudi

urtica folia Q

Tum

Trachelium & caule angulato, foliis petiolatis, calycibus ciliatis, pedunculis  
trifidis Lin - Spec. pl. p. 23, 5;  
Trachelium vulgare Clus. hist. 2. pag. 170

Campanula vulgarior, foliis utris, vel, major et a prior Bauh. pin 94.

Habitat in Europa sepebus & subhispidis  
Caulis tetragonus simplex pubescens. Folia profunde serrato-cuspa  
attenuata interdum ovato lanceolata. Pedunculi pelis minuti  
prostrati in costa et venis subtus adpressi. Pedunculi axillares  
breves 1 pro duobus. Calyx basi utriusque marginis laciniarum strigis  
albi. corolla magno eumulo. Folia floralia lanceolata

foliis cordatis <sup>tenuibus</sup> ~~aluminatis~~ nec so serratis  
calycibus strigosis

glaucis. foliis sessilibus ovatis serratis subtus glaucis, caule angulato paniculato,  
pedunculis unifloris Thunb. fl. jap. puz. 804 l. v. p. 211.  
Nesio vulgo kikiyo et kumakoo hampf. am. ex. v. p. 822.

Habitat in Japonia

caulis suffruticosus, glaber erectus, superne paniculato-ramosus, bipedalis.  
Rami flexuosi, erecti, subsuffragati, glabri. folia supra vicia, serrata  
in arguto margine parum reflexa, subtus scabra venoso-reticulata:  
inferiora majora petula, superiora sensim minor, erecta, pollicari  
Flores axillares in summitate ramorum, solitarii. pedunculi bractea  
2 pollicares. bractea 1-2 in pedunculo lanceolata alterna. Calyx  
glaucus. laciniis lanceolatis reflexis. Corolla magna, compta.  
Thunb.

Rhomboides C. foliis rhomboidibus serratis, spica secunda, calycibus dentatis. Lenz.

v.

Campanula Draba minoris foliis Bauh. prod. 36. per. 94.

Rapunculus alpinus (Teucrii folio) rhomboidalis Boze. mus. 75. t. 61.

Rapunculus Teucrii folio Barr. Ge. 8. 567.

β. Campanula alpina. foliis lanceolatis serratis lobis, floribus racemosis  
si per undis mutantibus, calycibus serratis Lenz. pl. pag. 169 &  
Campanula pyramidalis minor Alp. exot. 340  
Habitat in alpebus Helvetia, Italia

caulis erectus pedalis & tenax decumbentibus angulatis <sup>in</sup> <sup>utroque</sup> <sup>costa</sup>  
filiis filis emportis, interdum adscendentibus. folia inferiora in  
reticulum brevem attenuata superiora sessilia, pollicaria subtus  
nervi raris marginae pubescentia <sup>acuta</sup> <sup>pubescentia</sup> <sup>suprema</sup> <sup>angusta</sup>  
sa lanceolata. flori superne interdum flori unicus, inter  
plurimique plures pedunculati alterni, pediculis filiformi  
bus unifloris, calycibus glabris laciniis <sup>obtusis</sup> <sup>puberulis</sup> angustis

variat foliis pollicantibus vel sempollucantibus

foliis oblongis serratis, racemo secundo calycibus <sup>dentatis</sup>

comp. alpina β. mea omnino est Halleri et Karst. Lenz. planta  
descriptio recedit

*Platycodon* C. foliis oblongis sessilibus crenato serratis hispido pedunculatis elongatis hispido glabris unifloris, floribus erectis

Habitat in C. b. prope du. Banks

Caulis teres an herbaceus, hispidus. Folii unguiculati acutiuscula superiora paucim angustiora. Peduncululi duo ad apicem adpressi squamis paucis remotis minutis an interdem ramosis. Calyx glaber

an eadem cum elongata

inter cornua Thunb



percyana <sup>Q.</sup> foliis ovato oblongis rugosis ~~fructu~~ petiolis marginato dilata  
 ti serratisque, caule simpliciter hispido, corollis patulis hinc modis  
 pag. 204 \*

Campanula frugosa caule simpliciter tereti, floribus subsessilibus  
 sessilibus; tribracteatis, calycibus decem angulatis; foliis  
 ovatis duplicato-serratis, tota hispida Retz off. pag. 24. \*

Habitat in Europa australi & <sup>†</sup>

Caulis erectus simplicissimus, in solo pueriori interdum ramo  
<sup>foliis</sup> valde hispidus. Folia radicalia prim. vix ovata  
 oblonga  
 tripollicaria, obtusa, utroque latere crenata, petiolus

peruvianus dilatatus inaequaliter dentato subnitidus. Caulisna simelli  
 media theli  
 uti: et Tournef  
 foliis: herb. <sup>ma</sup> modo minor serrata vel duplicato serrata minor  
 hisj: habitas <sup>suprema</sup> angustiora sessilibus flori ex axillis supremis super  
 forte quoque <sup>ne</sup> conferti, solitarii sessilibus copiosi. Calyx & absque pedic  
 in oriente <sup>bus</sup> reflexis laciniis lanceolatis, hispidis corolla dimi  
 hinc herb. <sup>diobreviora</sup>. Corolla inter rotatam et campan  
 Cutam media, fundo atro-ovaleo

Campanula <sup>peruviana</sup> la Marti eni.

in l. v. omisa an eadem cum fructu.

Campanula media, foliis inferius  
 Cardiga Comuflne velti Tournef.  
 Mart. pag. 94. Tournef. fruct. 116  
 foliis: Da la Marti

bononiensis & foliis ovato-lanceolatis subtus scabris fersilibus; caule paniculato.

Lin. Mont. 337. Gaerth. Coll. 2. p. 7. L.V. p. 207.

Campanula sive Cervicaria bononiensis, flore parvo Bauh. hist. 2. p. 204. Monf. hist. 2. p. 461. f. s. 4. fig. 30.

~~Campanula~~  
Habitat in Baldi, Lespinesum jugis, Bononia.

Habitat

versipinnis

Caulis erectus pedalis teris pubescens. <sup>erectus</sup> Folia sessilibus  
ovato-ang. serrata subtus villosa molliscula canescentia supra scabripula, attenuata, tripollicaria  
frequentia sursum versus sensim minor. Racemus  
elongatus pedalis inferne compositus, pedunculis  
triv. vel pollicibus superne flores sparsi pedunculis  
unifloris interdum plures aggregati et flores cernui

crenatis <sup>pediculis</sup> molliter

foliis

subtus villosis

siculis terminalibus subcompositis  
floribus racemato nutantibus

glomerata & caule angulato simplicii, floribus sessilibus capitulo terminali

Lin. Sp. Pl. p. 235. All. fl. ped. n. 411. f. 39. fig. 1  
Paspunculus sylvestris, conleus umbellatus Thal. her. u. p. n. 2  
Campanula pratensis, flore conglomerato Bauh. pin. 94.

Trachelium alpinum, floribus conglomeratis, foliis asanis rigidis et hirsutis  
Herm. par. 235. t. 235.

Habitat in Anglia, Gallia, Austria, Suecia et Dania praevalens 2

Caules erectus simplicis simus, angulatus villosi, ~~conspicuis~~. Folium  
superiora sessilia lanceolata inferiora petiolata, ovata lanceo-  
lata, crenata, ut supra, petiolus basi dilatatus amplexu cau-  
lis. flores in capitulo terminali involucreto, involucri ovatis  
villosi flore brevioribus floribus <sup>sessilibus</sup> simplicibus solitariis in axillis superioribus  
laciniis calycis linearibus lanceolatis

Trachelium minus Clus. her. 2. pag. 171.

glomerata  
venato serratis  
foliis inferioribus ovatis petiolatis

mont

Cerviciana C. hispida, floribus sessilibus, capitulo terminali, caule simplicissimo  
foliis lanceolato-linearibus undulatis fl. juv. 1914 fl. Jan. Tab 787.  
All. fl. Ped. n. 4124

Campanula foliis echii, Bauh. prodr. 36 (non penae)

Trachelium altissimum, foliis apertis angustis, floribus parvis Bauh.  
herb. 2. p. 301. t. 301.

habitat in Helvetia, Danica, Germanis succis apertis sylvaticis

Caules erectus e lineis decumbentibus a basi foliorum angulatis  
tuberculis minutis ciliis insistentibus, subtrigonus, simplicissimus  
sesqui-pollaris pedalis. folia lanceolata sessilia alternata  
vel quadri-pollicaria, scabra, crenata, pilosa utrinque

Pedunculus terminalis capitulo lateralibus oppositis ter  
minati majori involucreto: involucreto orato longi. rudani  
capituli nervoso-venosum, scabra piloso

herb. 2.

marginata foliis lanceolatis undulatis serratis marginatis, ramis debilibus,  
floribus terminalibus foliariis Thunb. fl. jap. p. 894 t. V. p. 211.

Habitat in Japonia <sup>resp. Procyoni formi Spithamei</sup> glabrescens <sup>superior</sup>

Caulis basi <sup>crassus</sup> <sup>sublig</sup> <sup>nosus</sup> <sup>decumbens</sup>. Rami plurimi, capillares, debiles  
in pedunculor <sup>erectiusculi</sup>, ramulofi, striati glabri, spithamei. Folia in inferiore  
Dorsum parte ramorum, sessilia alterna linear lanceolata, margine albo  
serratis remotis, pelis albidis hispida unguiculari. Thunb.

<sup>caulis</sup>  
Scaberrima  $\odot$  foliis linearibus lanceolatis integerrimis scabri flori-  
bus paniculatis

Habitat in monte Auro thous

Caules ~~caulis~~ teretibus decumbentibus ~~angulatis~~. Folia bipolli-  
cari attenuata utrinque ~~scaberrima~~ frequentia  
radicalia non vidi. Pedunculi superne remoti ex axe  
les foliorum ramosi. Flores radicosi. Calyx glaber. laci-  
nis setaceis. Corolla campanula rotundifolia

an varietas  $\odot$  patulo

*Thysanodea* *l. hispida*, racemo axillari-oblongo, terminali, caule simplicissimo, foliis  
lanceolato-linearibus  
auct. s. t. 411. Fady. obs. 34. t. 21. fl.

*Pennsylvanica* major *venosifolia* Thal. her. 32. t. 4.

*Campanula* *foliis echii* Bauh. pin. 94.

*Alopecurus* *alpinus* quibusdam, *echium montanum* *Dalichampii* Bauh.  
her. 2. p. 809.

Habitat in alpebus Carynio, 7

Radix crassa Caulis erectus, simplicissimus, semipedalis inferne foliis superne  
pennis cymis floribus ceteri. Soli tripollicari superne sensim minorum  
basi angustata obtusa integerrima scaberrima corollae pelosae  
conferta.

— integerrimis

elongata A. foliis linearis lanceolatis repandis sive plicatis subhispidis  
caule paniculato hispido, pedunculis elongatis glabris

Habitat in Cap. b. frei

Caulis erectus squarrosus. Solia bipollicana attenuata  
Pedunculi superne ramosi pedicelli uniflori bipollicana  
et calyx glaber

Frei edubra



capensis C. foliis lineariter coloratis pilosis scabri denticulatis, caule  
subsimplici ramis unifloris.

Habitat in Cap. b. spec. Kunberg

Caulis herbaceus erectus, teres pilosus superne in pedunculatos  
paucos divisi. folia sessilia bipollicaria remote denti-  
culata acuta attenuata.

an capensis

hippidula Camp. hispida, floribus erectis, calycibus longitudine corollae Lin. Suppl. p. 142.

\* S.V.

Campanula africana hispida, parvo angustoque folio, flore pallide violaceo  
Com. hort. 2. p. 73. t. 37.

Habitat in C. bona spei O

Caules ramulosi, palmatis, hispidi, superne magis ramulosi. Folia alterna, linearia, acuminata, ciliata, imprimis carinata. Calyces subsessiles, terminales; erecti lineares, carina ciliati, longitudine corollae. Corolla infundibuliformis. Lin. 6.

foliis lanceolatis ramis diffusis hispida

~~an~~ a Dahlia habui sub nomine Camp. ciliata

