

Campanula

Linoides Campanula

Habitat in monte videlicet Commet. herb. Guss.

Caulis pedalis, basi ramosus; superne in ramulis floriferis, teres, glaber, e lincide
currentibus fit natus. Folio sessile, sparsa, frequentia, unguiculata, lineari lan-
ceolata, indegemina, margine panem incrasata, supra glabra, subtus prope
in canna pilis nonnullis adspersa, acuta. Pedunculi terminalis et ad apices
ramorum, in flori. Flores parvi. Calycis glabri: laciniis lanceolatis

ampifolia Campanula

Habitat in Insula Bourbonis herb. Mus. P.

Rami glabri, inferne squamis griseis combriati, superne foliosi. Folia sessilia, congesta, bipolliciana, lanceolata, utrinque glaberrima, anguste serrata, acuta, supra tenuissime lineata, subtus nervosa, venosa: floralia superiora integerrima. Corollae sessilis, pendula: pediculi sesqui-pollicares, medio-diphylli: folioli alternis. Calycis glabri: laciniis ovato lanceolatis, acutis, uti folia floralia et bractea ciliata. Corolla laciniis acuminatis.

pelviiformis Campanula

Campanula cretica, caule supino, flore maximo pelviiformi. Tournef. Cor.

Habitat in Creta herb. Tusc.

Caulis herbaceus. Rami subullosi. Solia ut pollicaria, oblonga, in fenora in petiolum attenuata, superiora sessilia, serrata, basi versus integerrima, vellosula, acuta, subsenosa. Pedunculi ex alii superioribus, uniflori, folio brevioris, digylli: foliola lanceolata, serrata. Calycis lacinae ovato-lanceolatae, attenuatae, ciliatae. Corolla magnitudine C. carpatia, extus pilis raris. Capsula obtusa.

rolo folio Campanula

Habitat herb. Guss.

Folia radicea petiolata, cordata, polliciana, obtusa, venosa, utrinque fere pellu-
cidi adpressa, prope ^{in venis interstitiis} subtus, inaequaliter obtuse serrata. Petiolus pelosus. Caulis
sesquipedalis, semipollicinaris, canaliculatus, inaequaliter serratus, inferne prothulatus
lamina ovata. Caulis palmatis, subhepatis. Capsula obtusa. Calycis lacini
non canaliculati, canina margineque ciliata. Corolla pollicaris.

Lacinata Campanula

Habitat in oriente herb. Guss.

Caulis decumbens, teres, crassitie pennis asperis, ramosis, oculo armato villis raris adspersi: rami simpliciter, fraxi, floriferi. Folia radicalia spatulata, pinnatifida solum ^{insuper obtusa} ~~obtusis~~, lacinia terminali palmatis, oblonga, incisiva: laterales lanceolatae, inaequaliter serratae subnerviis, infero lineariter dentibus apice glandula flavescente, simpliciter venosa, oculo armato utrinque villosa: Caulinae cuneato-lanceolatae, basi attenuatae, infera bipollicaria, incisiva, superiora remote paucis serrata, obtusa sequi pollicaria, simpliciter minor, basi versus integerrima. Pedunculi axillares, solitarii uniflori, foliis breviores, diphylli: foliolis lanceolatis, subintegerrimis. Calycis lacinae ovatae, attenuatae, oculo armato villosa. Corolla magna, extus villosa. Sepala obtecta

parviflora Campanula

Campanula orientalis foliis incisi flore minimo et multiplici Tournef. Cor
Habitat in Oriente herb. Ausf.

Caulis (cultus forte) pedalis, erectus, teres, villosus, simpliciter superne in ramor-
um flosculos dispersus. Folcia radicalia, pedicelata, bipollicaria, oblonga, per petio-
lum parum decurrentia, obtusa. Caulina sessilia, pollicaria, simpliciter
versus superius minima, in ferne attenuata, obtusiuscula, ubi radicalia inae-
qualiter obtuse serrata, scabriuscula, venosa, utrinque nullis nisi, pro se-
ctum in venis majoribus et ad marginem. Ramis floriferi alterni, foliis
paucis remotis. Pedunculi axillares et terminales, solitarii, unum flori; di-
phylli parum supra medium. Flores frequentes, nutantes. Calycis lacinae
lanceolatae, ciliatae. Corolla glabra, ad medium fere fusa. Lacinae oblon-
gae. Capsula obtusa.

Tomentosa Campanula

Campanula foliis profunde incis, fructu duro tomentoso et tota incana Tournef.
Cor. ? ped. net in folior ad eam

Caulis erectus, 7e ver, villosus, canescens, simplex a basi ad apicem floriferus.

Folia radicalia in petiolum longum attenuata, oblonga, serrata, villosa, obscure nervosa: caulina cinerea, vix pollicaria, sessilia, serrata, basi integerrime, villosa, arvensis, enervia. Pedunculi axillares, secundi b. tri. flori, folio longiores, villosi, canescentes. Folia versus medium duo, alterna parva. Calyx incanus: laciniis lanceolatis. Corolla semi pollicaris, pubescenti. Capsula obtecta.

Stylopa Campanula

Habitat herb. Fus.

Caulis adscendens, spithamei, simplicis. Solia petiolata, semipollicaria, cordata, attenuata, remote serrata, utrinque glabra, subtus venosa. Flores terminales, paucissimi, penduli, parvi. Calycis lacinae lanceolatae. Stylus corollae longior, pedicello armato pubescens.

argentea Campanula

Campanula armenica saxatilis argentea leucopifolia Tournef. Cor. 3.

Habitat in Oriente herb. fus.

Caulis digitalis vel paucum ultra, teres, villosus, canescens. Folia lineari cuneata
vix unguiculata, ad basin cuneatissima, superne remotiora, integerrima, incana.
Peduncululi fere a basi usque ad apicem, alterni, remoti, foliosi, foliis lineari
lanceolatis, acutis, parvis, uniflori, patentes. Germen tuberculatum. Calycis laciniis
subulatis.

Heterophylla Campanula.

Campanula foliorum inficiorum bellidis coelestis nummularia Tournef. Cor.

¶ Habitat in oriente herb. Turc.

Caules plures, decumbentes, feliiformes, superne pubescentes. Folia caulina petiolata, oblonga, crassa, frequentia, unguiculata, integerrima, obtusa, basi attenuata, aerea, enervia, glabra, suprema minima, lanceolata. Pediculi: superne, axillares, solitarii, uniflori, longitudine fere folii, triphylli. Flores cernui. Capsulae obtusa. Calyx parvus: lacina lanceolata, oculo armato pubescentes

Descript. folium radicale adda ex specimen

Calamenthe folia Campanula

Campanula juxta alii, foliis inferioribus bellidis, ceteris nummulariis subhispidis crenatis
Et veluti nigosi Tournef. Cor.

Habitat in oriente herb. Turc.

Caulis fruticosus, teretes, glabris, decumbentes, superne villosi-canescentes. Folia cauli
non subpetiolata, unguiculata ^{vel parum utrinque} oblongo subrotunda, serrata, basi versus integerrima,
utrinque villosa, subcanescentia. Ramuli floriferi ex omnibus axillis, patentissimum
semipollicares, incani, magnitudine folia magnitudine serpylli, oblonga, integerrima,
pedunculi ex hinc axillis, solitarii, uniflori, folio breviores. Calyx incanus: laciniis
canescolatis. Corolla villosa. Capsula obtusa.

Campanula

Campanula orientalis, foliorum crenis amplioribus et crispis, flore patulo
subcaeruleo Tournef. Cor. pur

Habitat in Armenia herb. Tournef. ^{cor.} pte pennis arvensis

Caulis erectus, simplex, glaber, folia ^{cor.} inaequalia longipetiolata, sublyrata,
laciniis lateralibus parvis, remotis, lanceolata, terminalis cordato-ovata,
palmaris, venosa, inaequaliter serrato-incisa: caulina petiolata, semper
liciana, ovata, per petiolum parum decurrantia, venosa, glabra, ^{cor.} argute
inaequaliter ^{et profunde} serrata. Racemus semipedalis, foliosus: peduncululi gemini in
axillis foliorum floralium, brevissimi. Calyx laciniis ovatis, acutis, margine
ope lenti villosula. Corolla glabra, magnitudine Camp. rotundifoliae, squa
rida, laciniis ovatis

Campanula

Campanula orientalis, folis longo, rigido, aspero, flore supra spectante Tournef
Por. pag.

Habitat in Armenia herb. Tournef.

Caulis ramosus, scaberrimus: rami fraxi. Folia sessilia, pollicaria, lanice-
lata, scaberrima, cæcæ spinulis albidis decumbentibus, acute serrata: ramo-
rum remotissima, integerrima parva. Flores terminalis solitarii. folia duo
a basi calycis. Calyx membranaceus et partibus ab inspis alatis.

Campanula

Campanula orientalis, pubescentia, flore maximo ^{nusquam uscente} ~~coarctato~~ Tournef. Cor. pag
(herb flore poemles)

abitat in Iberia herb. Tournef.

Caulis erectus, villosus, inaequalis; crassitie penna asperna, simplex. Folia sessilibus,
pelticaria, oblonga, venosa, biferrata, acuta, villosula, subtus canescentia. Pe-
dunculi axillares, solitarii, uniflori. Flores maximi, erecti, glabri.
Calyces non obtecti; laciniis lanceolatis

Campanula

Campanula orientalis, phaeocephala, angustiore folio, flore caeruleo
Tournef. Cor. pag

Habitat in oriente Herb. Tournef

Canescens. Caulis prostratus. Folia inferiora petiolata, ovata lanceolata
floralia cordata, sublanceolata. Flores in axillis superioribus et apice glo-
meratis.

var. varietas C. glomerata

Campanula

Campanula græca, saxatilis, Bugula folio Tournef. Bor. pag. 3.

Habitat in græcia.

Folia radicalia in orbem expansa. Caules plures ascendentes, foliosi. Pediculi axillares, uniflori, diphylli, foliolongiores

Campanula

Campanula orientalis, angustifolia, capitulo Papaveris Rhodod. Tournef. Cor.
reg. 4.

Habitat in Armenia herb. Tournef.

Radix superne dursus. Folia radicalia plurima. Caulis simplicissimus, radice
cum pithemous

habes

Campanula

Campanula orientalis, altissima, flore parvo, pyramidato Tournef. Cor. p. 4.

Habitat in Libani. herb. Tournef.

Caulis erectus, ramosus, subangulatus, villosus. Rami prostrati, simpliciter, superne flori-
feri. Folia sessilia, subovato lanceolata, sesqui pollicaria, minime lobata, vix
subtus villosa - canescentia, acuta, obtuse serrata. Racemi superne. Pediculi
solitarii, uniflori. Flores parvi, penduli. Calycis laciniis glabris, lanceolatis,
non obtusis.

Campanula

Campanula alpina, genista Victorio folia, folio angulato Vaillant.

Habitat herb. Musci

Caulis sesquipedalis, erectus, frutuosus, simplex, teres, glaber, uti tota planta
Folia frequentia, sessilia, lanceolata, serrulata vel integerrima, arenaria, nervi-
osa, acuta. Pedunculi superne, alterni, biflori, filiformes. Corolla magni-
tudine Camp. rotundifolia. Calycis laciniis subulato. Folia sub pedunculis sub-
lata

Campanula

Campanula saxatilis herbis foliorum crispis, flore magno. Tournef. Inst. R. H.
pag. 664.

3-4 polliciani
Caulis ascendens, simplex pedalis herbis. Folia lanceolata, radicalia in petio-
lum attenuata, caulina sessilia, 2 pollicaria, simpliciter venosa, margine venis
que utrinque villosa, extusum obsoleta remote serrata, scabriscula. Pedun-
culi superne, alterni, foliosi, folio parum longioribus, uni flori. Calycis
obtecti, herbis: lacinis lanceolato. Corolla lacinis rotundato, mucrona-
to.

pubescens Campan. caule hispido foliis glabris; radicalibus cordatis, lam-
inis oblongis dentatis petiolatis Wild. spec. pl. pag. 894
Campanula pubescens.

Schmedl. botem. no 167

Habitat in Bohemia sylvis 2

non vidi

erifolia Campanula fruticosa, foliis oppositis serratis glabris
floribus paniculatis natis. De Mart. encycl. 1. p. 575.
Habitat in monte ignivomo Bourbonis ?

michi ignot.

Schmidtii Camp. caule angulato hispido foliis ovato-lanceo-
latis grosse serratis; pedunculis unifloris axillaribus
cernuis, calycibus hispido Schmidt Bohem. n 173. ^{estica}
folia
Habitat in Bohemia nemoribus 4

michi ignota

urticaefolia Campanula

Stylosa Campanula foliis ovato cordatis equaliter dentatis, flombus paniculatis, stylis corolla longioribus Willd. spec. pl. pag 901.

Campanula foliis subrotundis Bauh. pinod. 35. V. 35

C. foliis ex cordato-lanceolatis, caule panicum ramoso, flombus

terminantibus Gmel. fl. 3. p. 152. Tab. 27.

Campanula fl. ^{Stylosa} La Martk

Habitat in Libria ?

ptarmicifolia Campanul. folus lineari-bus - margine ciliato-fero
tis, flombus sessilibus erectis Willd. spec. pl. naz.
902.

C. orientalis folus *ptarmico*, flore oblongo Tournef. Cor.

4.
Camp. ptarmicifolia

La Moeth. Enc. p. 1. p. 573
Habitat in Armenia

non vidi

punctata Campanula capsulis trilocularibus obtectis, caule simpliciter
erecto folioso, foliis subsessilibus, floribus nutantibus
Wieder speiq. 907.

C. calycibus e tergo lanceolis notatis, pedunculis
unifloris Gmel. fib. 3. p. 155. T. 30

Camp: punctata

La manth. Enc. 1. p. 579

Habitat in Libria

non vid.

selutina Campan. caule basi decumbente, foliis obovatis incanis mollis
fimis, floribus paniculatis laciniis calycinis sagittatis Depon
fl. atl. pag 106 tab 51.
Habitat in Gessani rupem montis Atlas 4

calycibus obtectis

non vidi

alata Campanula caule simpliciter: foliis lato-lanceolatis, glabris decurren-
tibus, floribus sessilibus terminalibus Defont. fl. Atl. pag. 170 tab. 50
Habitat in monte Atlas

michi nota

medium & capsulis quatuor: caule indiviso erecto folioso, floribus erectis: Lin. 1. 1.

Viola manana Dod. penit. 163. Clus. hist. 2. pag. 182

Campanula hortensis, folio et flore oblongo Bauh. pin. 94.

Habitat in Germanis, Italia sylvae apricis ♂

Caulis erectus bipedalis et ultra simplicis spinis raris, crassitie pennis cygnaea
crenulato ^{hirsuta} ~~vellosa~~ ^{majori} utraque una pilosa. Flores in racemo terminali, pedunculati
parvi erecti simplici pediculi uniflori pedunculati in medio folii duobus
oppositis lanceolatis. Calycis lacinae ovatae subfragili. Corolla
magno nudante

medium

puberulatis calycibus obtusis fragili pedunculati subuni flori
diphylli

barbata & capsulis quinquelocularibus obtectis, caule simplicissimo subuni folio,
foliis lanceolatis cœulis barbatis. Lin. Spei: p. 236 + Gaëqu. obj. 1. p. 14. t. 37

Campanula foliis hispida, caule subuni folio All. pedem. 36. t. 6. fig. 2.

Campanula foliis liliæ, floribus villosis Bauh. prodr. 36. t. 36. p. 94.

Rapunculidius montanus Bauh. hist. 2. p. 000.

Campanula alpina aperiens, foliis liliæ flore magno villosis. Pluken
phyt. 153. fig. 6.

Habitat in alpebus austriæ, Helvetiæ, Pedemontic

caulis teres, ascendens ^{hirsutus} pedalis vel minor, folia radicalia
plurima, lanceolata, basi attenuata, obtusa tripollicaria, villosa
sa ut nunc, ut videri in caulem unicam inferne lineariter

mutantur. flores ^{superne} pedunculati alterni remoti
ad basin singuli pedicelli brevior. Calycis lacinae ovatae
subfimbriose. Corolla magna, extus lacinae villosae, intus lacinae
nunc ovatae intus hirsutae

alpestris C. caule simplicissimo ^{unifloro} foliis, foliis lineari lanceolatis, pedunculis
terminalibus unifloris ^{subcuneiformibus} et barbatis

Campanula saxatilis Echii folio magno flore Tournes. cap. 110. ^{ser. 15.}

Campanula foliis repidis, caule ~~unifloro~~ Hall. hist. p. 694 All.

Speci. pedem. p. 36. tab. 6. fig. 3.

Campanula trilocularis: capsulis trilocularibus obtusis; caule
simplicissimo unifloro, foliis lanceolatis integerrimis acutis
corolla barbata Turc. fl. ital. prodr. p. 64. n. 10.

Campanula alpestris All. fl. pedem. n. 418. tab. 6. fig. 3.

Habitat in alpebus Italiae et helvetiae ^{prope in 4^{to} specie}

caulis erectus pilosus: folia semiamplexicaulea
extrosus latifolia, pilosa mollia saepe b-pollucina
integerrima. Flores terminalis, erectus, major quam in
barbato. Calyx pilosus, laciniis ovatis ^{acuminatis}
corolla triplo brevioribus. Corolla extus pilosa intus
pilis longioribus adspersa, ^{not} barbata tamen

vaedensis f

allioni

Spicata & hispida spica laca, floribus alternis, foliis linearibus integerrimis
Linn. Spec. pl. pag. 234 & All. fl. Ped. n. 414. t. 46. fig. 2. Tab. 47. fig. 1. &
Campanula hispida foliis angusto leviter serrato, floribus parvis spicati
Plukh. alm. 76. t. 153. fig. 3.

Habitat in vallechia.

Trachelium altissimum foliis oppositis, floribus parvis Bauh. hist. 2. p. 801

Habitat in vallechia ♂

Caulis erectus simplicis fimus. Vexer ^{sequipedali} hispide canescens, folia lanceolata
inferiora in fime attenuata basi dilatata ^{intermedia triangulari in petiolum attenuata} pinnatifida
utroque lobis obtusifida floralia ovata lanceolata
calycis parum longiora. floris remoti, calycis uti folia
floralia hispide canescens. lacinia linearibus ^{concoloribus} obtusa

foliis linearibus lanceolatis

alpina L. caule simpliciter, pedunculis unifloris axillaribus diphyllis Spec. plant
1699. * Faug. fl. austr. 2. t. 110.

Trachelium ~~peruvianum~~ ^{nummula} alpinum Claf. hist. 171.

Pampanula alpina ~~canadensis~~ Bauh. pin. 94

Habitat. in alpinis Schneebay 4

Caulis digitalis villosus foliosus folia radice lanceolata acuta
basi attenuata pollicaria saepe pilosa: caulibus linearibus
pubulata. ^{longius in aequatione} Olori saepe unicus terminalis nictas. Corolla
calycis lanceolata pilosa

mollis β cappulis quinque locularibus obtectis pedunculatis caule prostrato, foliis
suborbiculatis Lin. Spec. pl. pag. 2374

2 Campanula hirsuta ocymsifolia caulem ambiente, flore pendulo Boiss.
sic. β .

3 Viola manana coerulea, folio subrotundo, calyce corniculato Barr.
4c: 754

Dichotoma β Campanula dichotoma

1 Campanula rotundifolia hirsuta saxatilis, folio molli Boiss. mus.

app.
Campanula dichotoma cappulis quinque locularibus obtectis, caule
dichotomo, floribus cernuis Am. acad. 4. p. 3064 S. V.

reloso
foliis oblongis Habitat in Oriente, Hispania. β . in Syria, Sicilia

Caules decumbens ^{subramosi} superne dichotomo ^{subramosi}
nigrescunt villosi angulati, ^{vaghi hirsuti} angulis ^{scabri} scabri, folia simplicia
integerrima, villosa in β . scabriuscula basi attenuata ^{ob-}
^{so} floralia acuta. flores ex alis foliorum, solitarii longius
pedunculati foliis floralibus ³ plo majore calyce hirsuto
canaliculati attenuati auriculis posticis canaliculatis. mollis
^{differt plus moribus et tota planta mollior}

Synonyma 2 sub molli ad dichotom. pert. Dichot. vero ad moll.

foliis oblongis integerrimis

Dichotoma P. capulis quinquelocularibus obtectis, caule dichotomo, floribus cernuis
Len Am. Acad. 4, p. 386 * S. V. p. 200

Campanula hirsuta, Oxymeris caulem ambiente, flore pendulo Boiss. p. 1.
23. t. 45. fig. 1. Monf. h. 2. p. 459. f. 5. t. 3. fig. 26. Paui. h. 736.

Habitat in Syria, Sicilia

Caulis dichotomus. Folia oblonga, scabra. Flores solitarii, & dichotomia stapiliibus
ramorum, cernuis, strobilosa Camp. Medii, sed dimidio minores, at duplo
maiores quam in Sibiriæ Len. Am. t. c.

varietas mollis.

Campanula

Angosa Campanula capsulis oblectis, foliis lanceolatis integerrimis, pedunculatis
axillariis unifloris, caule Angosa ^{calycibus que}

Habitat in oriente O

Caulis erectus, palmans, ~~scandens~~ ^{repens, scandens} angulatus, stimulis parvis, adspersus;
ramis floriferis simplicissimis, bipollicariis, et axillis axillares.

Folia sessilia, sesquipollicaria, alterna, lanceolata, integerrima, subtus
villosa-scabra, supra glabriora.

Stems versus apicem ramulorum ^{orum}, duo vel tres, pedunculatis; et axilla
folii, ~~terminali~~ ^{terminali}. Pedunculi longitudine foliorum, solitarii, in flori

Calycis Angosi: laciniis lanceolatis, corolla parum brevioribus.
Corolla extus villosa. limbo quinquifido. laciniis lanceolatis

Saxatilis C. capsulis quinque carinatis, floribus alternis nutantibus, foliis obovatis
crenatis Lin. P. V. p. 209

Trachelium saxatile, bellidis folio, consuleum creticum Boiss. Mus. 2. p. 76. 7. 67.
Campanula cretica saxatilis, bellidis folio, magno flore Tournef. F. R. III.
Barr. 4c. 013.

Habitat in Creto scopulis saxosis. herb. musci

Caulis prostratus, subramosus, teres, subvillosus. Folia radice alia frequen-
ter, cuneata, obtusa obscure crenata: caulina lanceolata, et trochan-
terum dilatata. Pedunculi axillares et terminales, breves, folio unico
instructi. Calycis lacinae ovato, uti corolla, ciliis villosa

Edulis C. foliis oblongis sessilibus serratis, calycibus ciliatis glabris caule
ramoso decumbente, pedunculis axillaribus unifloris

Campanula edulis: foliis ovato-acutis serratis sessilibus opposit.

desf. r. pag. 44.

Habitat in Arabia

Caulis ^{herpidus} angulatus, ~~pelosus~~ angulis scabri, spithamo v; folia sessilia
oblonga, unguiculata supra glabra, subtus in venis
et costa pilosa margine scabra. Pedunculi filiformes
axillares et terminales solitarii. Lacinis calycis lan-
ceolata glabra nisi margine. Corolla calyce parva
longiora

inter calycis cal: obtus. colloc.

tridentata Q. Capsula quinqueloculari obtusa, caule uniflora, foliis radicalibus tridentatis Mant. 44. * L. V. p. 209. Schreb. Dec. 3. t. 2.

Campanula orientalis pumila repens, flore magno Tournef. Corol. 3.

Habitat in Oriente herb. Tournef.

Folia radicalia Habitus reticulata, lanceolata, cuneiformia, apice saepe subtridentata. Caulis foliis duplo longior, foliis aliquot linearibus. Flores erectus majusculus, solitarius. Calyx sinibus reflexis germen tegentibus. herb. Mont. l. c.

Lacinata C. capsulis obtectis pedunculatis, foliis serratis; radicalibus lyratis. cauli-
mis lanceolatis Lin-Spec. 237* S.V. p. 209

medium Dioscoridi Rauwolf. id. p. 204.

Campanula manana, laciniatis foliis perennia Bauh. Pin. 94. Monf. h. 2. p. 460
f. 5. t. 3. f. 31.

Campanula gosa saxatilis, jacobae folio Tournef. cool. 1. t. 1. p. 99. t. 99

Campanula foliis longis laciniatis Lin-Spec. 1. p. 165.

Campanula foliis radicalibus dentato pinnatis, caulinis cordatis sessilibus Gron.
Oner. 14.

Habitat in Graecia. Libano.

Planta tenuifolia. Stola radicalis pinnatifida, lyrata, serrata; caulina lanceo-
lata, subunciformis, serrata. Calyces sinibus reflectis, germen obtegentibus L. f.
L. C.

canariensis ^{l.} capsulis quinquelocularibus, foliis oppositis hastatis dentatis petiolo
tis her. s. v. p. 2094

Campanula canariensis regia s. medium radice tuberosa, foliis sinuatis ciliis
adnatis emulis ternis circum caulem ambientibus, flore amplo pen
dulo: colore flammeo nitillante Plukn. alm. 76. 8. 276. fig. 1.

Campanula foliis hastatis dentatis, cauli determinate folioso Hort. Cliff.
65. t. 8

Canarina Campanula

Habitat in Insulis Canariis 4

Descriptio in hexandro ad Canariam habetur

Standa P. Capsulis obtectis, foliis hirtis; caulinis lanceolatis serratis, caule simplicis
limbo, floribus sessilibus Lin. Spec. pl. p. 230* L.V. p. 209
Campanula orientalis, folio oblongo rigido apereo, flore fusco spectante Tournes.

Carol. 3.

Habitat in Syria, Palestina.

Caulis squamulis, simplicis spinosus, hirtus. Folio radicalia cordata serrata, oblon-
gum pedicellata serrata, utrinque hirta, petiolata. Caulina alterna, remota, sessilia,
lanceolata, obtusa, serrato-dentata, hirta basi angustiora. Flores axillares soli-
tarij, sessiles, erecti. Calycis hirti, germen sinubus vegetibus Lin. Spec. l. c.

hesperifolia C. foliis lineariibus utrinque attenuatis scabris obsolete denticulatis floribus ^{racemosis} paniculatis quinquepartitis

Rapunculus orientalis hesperifolia Cournef. Corol. p. p.

Habitat in Armenia

Plantae palmarum erecta vix latiusculis. folia alternata angusta bis: tripolliciana, basi in petiolum angustata, remote vix denticulata, foliolum subangulata mucificatione. pedicelli pubescenti; nudante bractea nuda ad pedicellum. floe parvi. germen per thazonum calycis lacinis lanceolatis vel lacinis corollae.

capensis C. foliis lanceolatis dentatis hispida, pedunculis longissimis, capsulis trigonis Lin. S.V.

Campanula africana annua hirsuta, latifoliaeque foliis, flore magno violaceo Com. hort. 2. p. 69. t. 35.

Habitat in Cap. b. p. C.

Caulis erectus simplicissimus, superne in pedunculos duobus longissimis unifloris apophyllis ^{adpressis} inferne petiolor. folia inferna oblonga superna attenuata longiora sequiquilibrata canna hispida: Calycis lacinae lanceolatae, angustae aliquot in margine ciliatae. flor. erectus parvus medicinis

dentato undulatis

unifloris

perfoliata L. caule simplicii, foliis cordatis dentatis amplexicaulis, floribus
sespilibus aggregatis Lin. l. V.

Campanula pentagona perfoliata Monf. hist. 2. p. 457. f. 5. t. 2. fig. 23. Bar.
var. 83. t. 1133

Habitata in Virginia ☉

Caules decumbentes, obscure angulati, vix pilosi, pedales
simplices. Folia pollicaria remota, striatoplicata serrata
80-dentata. Flores 4-5. in axillis parvis flore triplo breviori-
bus. Coracis calycis interdum 4-5 lanceolatis acuminatis

— axillis

clatres P. foliis cordatis dentatis pubescentibus petiolatis, caulebus prostratis, pedun-
culis capillaribus multifloris. Her. spec. pl. pag 240* All. fl. Ped. n. 422. t. 7. f. 2

Habitat in alpibus Europae australis &

Ramuli filiformes petiolata dentato-serrata, pubescentia glabra obtusa. Pedunculi
axillares capillares ap. lylli, pubescentes, saepe triflori. Calycis lacinae
cinereae longitudine fere corollae. Flores parvi

Hederacea & foliis cordatis quinquelobis, petiolatis glabris, caule cavo
L.V. fl. Dan.

Campanula Cymbalaria vel hederifolia Bauh. pinod. 34. Pin. 93. Mon. h. ed.
2. p. 456. f. 5. t. 4. fig. 10. Plukn. phyt. 23. fig. 1.

Habitat in Anglia, Gallia, Hispania, locis umbratis humidiusculis
Caulis feliiformis erectus, glaber, uti tota planta, ramis
rami axillares alterni elongati. Folia petiolata unguiculata
angulis acutis, saepe densi minutis in axillis angulorum
pedunculis axillaris et ex apicibus ramulorum, solitarii polli
cari uniflori. Calycis laciniis fetaceo flore brevioribus. Corolla
narrow

erinoides Campanella caulebus diffusi, foliis lanceolatis subserratis, decurrentibus
linea sicata, floribus pedunculatis solitariis Mant. 44 *: L. v. p. 210
Campanula minor africana, erini facie, flore violaceo caule ^{bus} erectis. Germ. Lugd.
no. t. III. ?

Habitat in Africa.

Similis Lobelia erinoides - Caules ramo sumi. Folia alterna, lanceolata, vix mani-
feste serrata, decurrentia utrinque: margine minimeo, aculeis ciliato. Flores
ramulos terminant solitarii, pedunculati, erecti. Germen laxe, stylus trifidus
Lin. M. l. c.

heterophylla Campanula foliis subovatis glabris integerrimis, caulis diffusis L. V.

noy. 210*

Campanula saxatilis, foliis inferioribus bellis, ceteris nummularis Tournef
cond. 3. itin. 1. p. 243. t. 243.

Habitat in oriente 7. herb. Vall.

Folia obovata, integerrima, pubescentia, apice undulata. Caulis cetero
ramosus. Flores penduli, caulescentes hain. L. V. t. 1.

Caulis asperus, palmatus

varietas? cum synonymo sequenti. Camp; hirsuta foliis crenatis ac
velute rugos.

erous & caule dichotomo foliis sessilibus: superioribus oppositis tridentatis lina

N. p. 2107

Rapunculus minor foliis incis. Bauh. pin. 92.

Alpine oblongo folio serrato, flore conico Bauh. hist. 3. p. 367.

Enri s: Rapunculi minimum genus Colum. phytob. 122. t. 28.

Campanula caule quadrangulo patulo scabro, calycibus sessilibus axillari-
bus corolla tubulosa aequalibus Loest. N. 1274

Habitat in Italia, Gal. Kart. Hispania Barbana ^{et ceteris decurrentibus}

cauli erectus palmatis simplex superne semel ^{et ceteris decurrentibus} vel bis ^{vel tripliciter} bifidus, pubescen-
tilloso ^{hirsutus} ^{olei} oblonga extrorsum primum dilatata obtuse vel acuta

serrata, obtusa scabripula villosa inferiora basi in petiolum
attenuata, superiora sessilibus, alternis, suprema in ramis opposita

^{incis} 3 dentata ^{incis}. flores in dichotomia et in apicibus
ramorum subsessilibus solitarii terminales tres; calyces fere typhi-

nubantes, lacinae calycis late lanceolatis, flos parvi longitu-
dine calycis

Interrupta ④

L. H. H. H.

pedunculata C

L. Hervey

actiflora C

L. Hervey

crippa C

L. Hensley

nota ©

L. H. H. H.

Speiulum ♀. caule ramosissimo d. flexo, foliis oblongis crenatis, floribus solitariis
cappulis prismaticis Lin. t. v.

Onobrychis arvensis f. *Campanula arvensis* erecta Bauh. pin. 215.

Habitat inter pylos Europae australi

glaber. Folia semplexia cauliculis floralibus lanceolata acuta
superne dichotome divisis, flore solitarii in dichomia et latera
ramorum. Cappulae foliis pollucides. Calycis lacinis lanceolatis
corolla longioribus
venat caule simpliciore et ramosiore glabro vel villosa
~~foliis latioribus vel angustioribus~~

Speci —
glabra — undulatis
calycibus corollam excedentibus

pentagonia C. caule subdiviso ramoso sumo, foliis linearibus acuminatis Lin. S. v. p.

210

Campanula pentagonia, flore amplissimo, thraecia Tournef. F. R. H. 112.

Speculum veneni, flore amplissimo, thraecicum Raii h. 742.

Habitat in Thracia O

Folia inferiora bellidis. Pedalis ramosa, pubescens. radice alba
petiolata subintegra, caulina subsessilia obsolete crenulata
calycis patentes nec revoluti ut in speculo. L. Herbar

fol. ramosa foliis obovatis, ramis lanceolatis calycibus
nilosis corolla brevioribus

hybridam & caule basi subramoso fracto, foliis oblongis crenatis, calycibus aggregatis corolla longioribus, capsulis prismaticis Lin. spec. pl. p. 2397

Speculum venens minus Raj. hist. 1743.

Campanula arvensis minima erecta Monf. hist. 2. p. 487. f. 5. t. 2. fig. 22.

Habitat in Anglia, Gallia inter segetes.

Caulis ascendens simplex vel basi ramosus pubescens uti tota planta
fruticosa angulatus. Folia semiamplexicaulea unguiculata
obtusius undulato-crenulata. Florae superne axillares solitariae
vel plures, fessiles. Capsula pollicari. Calicis lobis lanceolatis
Corollam squantibus

hybrida & ^{villoso} caule basi undulato crenatis calycibus
basi subsolitariis corollam squantibus, capsulis prismaticis

non vid.

fruticosa. C. capulis colummatis quinquelocularibus; caule fruticoso, foliis lineari-
subulatis, pedunculis longissimis Lin. l. v. p. 209
Campanula africana, ericifolia, flore coruleo ~~pediculis~~ Herm. afr. 5.
Habitat ad Caput ~~B.~~ p. 7.

non vidi nisi ^{ex} est quam C. Burm vocant

fruticosa Q.

