

Campanula

Campanula uniflora hispida Dedit Richard

Campanula

Campanula orientalis, folus incisi, flore minimo multiplici Tournef.  
Cor. pag. 4

Habitat in Iberia

Caulis erectus, crispis pennis an sereno, tenuis, villosus, superne ramosus: rami  
simplices canescentes. Folia radicalia et inferna petiolata, oblonga, basi atten-  
nuata, infima dentato-fimbriata, sublyrata, lacina terminalis oblonga, uti-  
folia reliqua inaequaliter crenata, simpliciter venosa, venis utriusque petiofili  
superiora lanceolata, omnia fimbriata. Pedunculi superne in ramis et  
caule, bi-<sup>triflori</sup>. Flores nutantes, C. rotundifolia parvis minoribus. Calycis obtus:  
fructiferi nutantes: lacinae ovatae, margine hispida

Campanula

Habitat in oriente herb. mus.

Radix fusiformis. Caulis erectus, ramosi, <sup>nervi</sup> teretes, subangulati, glabri. Folia  
radicalia basi attenuata, petiolata, bipollicaria, uncinata, obtusa, glabra  
obsoleta dentata. Flores parvi, aggregati vel solitarii. Calycis lobis  
subulatis



Campanula

Campanula foliis subrotundis Bauh. prod. 35 cum fig.

Habitat herb. mus.

Caulis angulatus, vellosus, sulcatus. Folia caulina subsessilia, ovata, venosa, vix pollicaria, grosse serrata, basi attenuata, acuta, utrinque venis subvellosis, floralia lanceolata, remote serrata. Pedunculi superne, alterni, racemosi, triflori. Flores magnitudine @. stund. folio. Calyx glaber: laciniis subulatis.



gracilis Campanula

Doster

Habitat herb. maj.

Caulis plures, herbacei, sesquipedales, subramosi, angulati, venosi, pilis ad-  
spersi, superne hirti. Folia pollicaria, inferne approximata, superne re-  
ta, sessilia, lanceolata, subundulata, avenia, subtus raris pilis, dentibus  
alterove remoto, margine penna ciliata. Pedunculi superne pauci, uniflori.  
Calyces parvi, glabri, non obtusi: lacinae subulatae.

tomentosa Campanula

Campanula foliis profunde incisus fructu duro tomentosa Tota Lintana Tour  
nef. Cor. pag.

Habitat herb. mus.

Tota villosa subanescens, statim a basi subramosus. Rami simplices. Sola  
crenata serrata, in petiolulum attenuata. Pedunculi in ramis axillares  
et terminales, uniflori, breves

Campanula

Habitat herb. Rusf.

Caulis herbaceus, erectus, simplex, raris pilis, superne subangulatus. Folia radicalia petiolata, sesqui-pollicaria, cordato-ovata, venosa, glabra: caulina sessilia, 2-3 pollicaria, basi attenuata, inferiora oblonga, superiora lanceolata, inaequaliter remote serrata. Pediculi axillares, solitarii, uniflori, dyphylli. Folia semipollicaria, remote serrata. Calycis lacinae lanceolatae, inter gemmas, glabrae, pollicares. Corolla nudans, sesqui-pollicaris. Capsula obteeta.

valde affinis Camp. viola folia.



amplexicaulis Campanula

Habitat herb. Rusf.

Caulis erectus, teres, simplicis, pilis raris adpressis. Folia ut pollicaria, cordato-lanceolata, semiamplexicaulis, acutiuscula, glabra, margine villosa et scabra, subvenosa, venis  
lanceolatis, crenatis una alterare. Pedunculi axillares, superiores, alberrimi, bif. triflori  
Flores nutantes, magnitudine rotundi-folii. Calycis glabri: laciniis linearibus,  
attenuatis. Bracteis alternis, parvis, linearibus.

macrostachya <sup>sessilibus</sup> Campanula foliis <sup>superio</sup> scabris inferioribus undato laciniis  
<sup>lanceolatis</sup> <sup>superioribus</sup> <sup>cordatis</sup>  
lat <sup>me</sup> caulis pedunculis lateralibus racemosis caule simplicis

Simo

Habitat in Hungaria Putaibed.

Caulis simplicis simus, tri vel quadripedalis in spicam com-  
positam elongatam decurrens, pilosus teres, <sup>vellosi</sup> folia radica-  
lia petiolata, elliptico lanceolata <sup>in</sup> <sup>pedicellariis</sup> <sup>vellosi</sup>  
obsoleta serrata, <sup>minori</sup> <sup>segra</sup> <sup>obtusa</sup> <sup>caulis</sup> <sup>sessilibus</sup>  
<sup>infra</sup> lanceolata basi attenuata uti in frequentia basi  
<sup>nonnullis</sup>  
dentibus <sup>3</sup> <sup>4</sup> serrata, basi reflexa exorsus integerrima, superiorum  
<sup>semia</sup> <sup>plexi</sup> <sup>caulis</sup> <sup>acuta</sup> <sup>basi</sup> <sup>reflexa</sup>, <sup>semit</sup> <sup>reflexa</sup>  
cordata acuminata <sup>et</sup> <sup>conca</sup> <sup>integerrima</sup> <sup>florea</sup>  
a medio caulis, ped. peduncul. <sup>in</sup> <sup>pedicellariis</sup> <sup>inferioribus</sup>  
superiores 5-7 flori, flores subpedicellati bractea ad basin  
singuli. Corolla semipedicellari lineis quinque elevatis  
lacinis oblongo acutis glabris. calycis <sup>5</sup> lacinis linearis  
conciliato



<sup>70</sup>  
aphylla U. sicani ~~puberiflora~~

Utricularia aphylla: fl. albo-quadri flori squamis totidem apice furcato  
fl. Per. l. n. 20 tab. 1. fig. 5.

Habitat in inundatis et humidis limbo

Radix utriculi reni formibus, magnit. id. in fere semicircum linearis. Si apus  
litarius, nudus, bi. / 4 flori, bi-quadrisquamatus, filiformis, glabres, piquetal  
mani, simplex, apice bifidus. Squama vitata membranacea, integerrima  
amplexicaulis. Corolla lutea, necitans concavo pubulato: Labrum superius  
5-5: inferius 4-4

ab alpino hanc adesse adesse



*Longifolia Campanula*

Habitat in Pyrenaeis herb. Desfont.

Caulis pedalis vel humilior, caespitè pennis antheris, subhirsutus, simplex.  
Folia sessilia, bipollicaria, lanceolata, attenuata, subserrata, villosa.

Pedunculi axillares, triphylli, uniflori. Calyx obtusus, subhirsutus - Corolla magna, Camp. media

argata Campanula

Habitat in Syria Billardiere Herb. Desfont.

Caulis erectus, striatus, pedalis, basi <sup>nudus</sup> ramosus: rami teretes, glabri, albida  
dura et striatura caulis. Folia radicalia, petiolata, sesqui-pollucaria  
lanceolata, basi attenuata, apice obtusa, arena, anerva, inaequaliter  
dentata. Flores statim fere a basi caulis, sessiles, gemini parvi



heduacea Campanula

Habitat in Syria herb. Desfont. 4

vel semipedales

Caulis plaris, herbacei, laxis, simpliciter, palmares, diffusi, ubi tota planta  
glabri. Folia longissime petiolata, inferna subreniformia, tubulata: lobi  
laterales subtrifidi vel integri, subferrati, vel integerrima, venosa, remota;  
suprema ovata, in specimine majori semipollicaria, in minori minor  
subrenosa. Pediculi ex axillis supremis et superioribus, alterni, filiformes  
mei, uniflori, sesquipolliares. Strobili unguiculares. Germen globosum gla-  
brius. Calycis lacinae setosae. Petali interdum tripolliares.



*Leucifolia Campanula*

*Campanula orientalis sax. atlii. leucifolia Tournes. Cor.*

Habitat in Oriente herb. Desfont.

Cespitosa. Caulis palmari, erectus, simplex, filiformis, pubescens. Folii  
plurima radicealia, vix unguiculata, cuneata, acuta, integerrima, inae-  
na, arena: caulina remota, linearia. Pedunculi superne laterales et ter-  
minales, pauci trifidi: pedicelli uniflori. Calyx non obtusus

numula Campanula

Habitat in Syria herb. Desfont 24

Caulis plures, filiformes, digitales vel palmares villosi, unicani, uti tota planta.

Folia cuneata, radicebus petiolata, unguiculata et rosetum serrata

*hispida Campanula*

Habitat in Oriente herb. Desfont. O

Caulis herbaceus, erectus, basi ramosus, scaber: rami ascendentes altitudini caulis, filiformes, uti tota planta pubescenti. Folia sessilia, semipollucina, lanceolata, integerrima. Pedunculi superne, 2.3., alterni, uniflori, patentes, inferiores superne folio uno alterove. Calycis obtusi, hispidi: laciniis subulatis. Corolla minor quam in *Q.*, obtusa, flosca, squarrosa: laciniis lanceolatis, obtusis



Campanula Basone

Habitat herb. Desfont

Caulis herbacei, ascendente, simpliciter, rigidus, glabrus, pedalis. Solia pollicana, lineana, rigidiuscula, integerrima, glabra. Pedunculi alterni remoti; biflori s. 3 flori, pollicares, medio folio parvo. Calycis lacinae setosae. Corolla Comp. rotundifolia

Scheuchzeri Campanula

Habitat

herb. Les font

Caulis adscendens, glabris, ubi tota planta, palmares vel ultra, 1-3 flori. Calice  
pelticaria, lanceolato, sessili, integerrima vel medio obscure remote serrata. St.  
magnitudine C. rotundifolia nitens



Campanula

Campanula hispanica folus incisii flore oblongo

Habitat in Hispania herb musci

Caulis sempredalis, erectus, ramosus, villosus: rami frequentes, alterni, simpliciter erecto patenter. Pedunculi axillares et terminalis, solitarii, dupli-  
ci, 2 in flori

Campanula

in Campanula foliis profunda incisus tomentosa incana Tournef. C.

Habitat in oriente herb. mus.

Caulis pedalis, uti tota planta, tomentosa, incana; crassitie pennis asperas  
superne parum ramoso. Folia radicalia pinnatifida: pennis oblonga  
2-3 pollicibus, obtuse dentato-angulata: terminalis oblonga, inaequaliter  
obtuse serrata. Dentato serrata subincisa: caulina sessilia ut pollicibus  
vix, profunde serrata, crassa, ovata, basi attenuata. Flores axillares, pedun-  
culati, uniflori. Calyx obtusus: laciniis ovato, acuto, apice subulato.  
Corolla magna



Campanula

*Rapunculus leptanicus* flore erecto Vaillant

Habitat in Lusitania herb. Musci

Caules plures, ascendentes, rigidifculi, simpliciter, pithamoi, villosi, subangulati. Folia radicalia lanceolata, semipollicaria, crenata: caulina frequentia, semipollicaria, lanceolata, inferiora obtusa, obsolete crenata, superiora acuta, integerrima, ope lentis margine pilosissima, ceterum glabra. Flores superne axillares & terminales, solitarii, sessiles, magnitudine *C. rotundifolia*. German adpressum squamis albis, in setam densiter albidam reversam: lacinis glabris, longitudine corollae, linear-lanceolata, dente uno altero notato. Corolla subquinquefida

Campanula

Campanula <sup>supina</sup> cretica, caulibus supinis, foliis flae oblongo Tournef.  
Cor.

Habitat in oriente herb. mus.

Caules plures, pythamoi, laterales simplices, intermediis subramosis



Campanula

Campanula indica, caulibus ~~pluribus~~

rigidula Campanula

Habitat in Syria herb. Desfont. 4

Caulis plures, erecti, villosuli, palmatis, rigidi, subramosi. Folia sessilia, lanceolata, radicalia basi versus attenuata, acutiuscula, rigidiuscula, inter gemmas, villosa, scabra: caulina unguiculata. Costis terminalis, solitaria basi folioli duobus. Calyx non obtusus, villosus: laciniis lanceolatis. Corolla Campanul. totandifolia minor, 5-fida: laciniis lanceolatis.

*penurana Campanula*

Habitat in montibus limo herb. fus. et Penurca collebus.  $\odot$   
Caulis erectus, simpliciter spinosus, semipedalis, teres, subtripedatus. Solia sessilia, unguicula  
lana, cordata, acuta, vena una alterave, superiora integerrima, areola.  
Flores axillares, solitarii, sessiles. Capsula oblonga, hispida; calycis bracteae  
coronatae lacinis quatuor.

*Campanula biflora* Caputis Inlorulambus, foliis ovatis sessilibus, crenatis,  
floribus bracteis axillariibus sessilibus. Fl. Penur. 2. pag. 55 Tab. 200 fig. 6.

~~Campanula~~

Caulis solitarius rarius 2-3. filiformis. Flores axillares, gemini. Calycis  
3-4-5-partitis. Corolla calycis longior. Capsula Inlorulambus



*filiformis* Campanula

Campanula filiformis; capsulis bilocularibus apice dehiscentibus; foliis  
lineariibus; inferioribus denticulatis, floribus terminalibus ternatis fl.

Penn. 2. pag. 55. Tab. 200 fig. 1

Statuta Chili loco andis B

caulis. Caulis plures, filiformes, erecti, graciles, teretes, striati, paucum  
mori, pedales. Folia disticha, linearia, erecta sex siliqua, superiora denticu-  
lata, superiora integerrima. Pedunculi terminales, ternati, uniflori. Calyx  
corolla triplo brevior. Corolla albo coerulea. Stigma bipartitum. Capsula  
biloculari, imperforata, apice in duas valvulas dehiscenti. Semina  
numerosa. H. Penn. L. C.

caulis & caulibus unifloris, foliis ovatis glabris integerrimis subsiliatis Linn  
Spec: pl. pag. 1669. All. fl. pedem. n. 395. Tab. 6. fig. 2.

Campanula plerumque multicaulis uniflora, foliis ovatis sessilibus in  
tegerimis 4.

Campanula Allionii foliis radicalibus obovatis ciliato-serratis, caule uniflo  
ro, radice repente Villars

Habitat in <sup>summo</sup> montis Penisi 7

Radix repens alternatim emittens ramos terminatos foliis radicalibus  
caules simplicissimi pollicari, filiformes. <sup>subsiliatis</sup> Colia radicalia plura  
caules <sup>conferta</sup> s. obovata, caulibus linearibus pinnatifidis obtusa.  
Peduncululus terminalis solitarius, uniflorus. Flor. ratione planta  
magnus. Calyx hirtus laciniis lanceolatis

— radicalibus obovatis



uniflora Q. caule unifloro calycis corollam aequante Lin. fl. Lap. PS. t. 9. p. 5. 6

Habitat in alpebus Lapponicis 4.

Tota glabra Caulis 3 vel quadripollicaris ascendens simplex & semis, ~~totus glaber~~  
<sup>glaberrima</sup>  
Folia inferiora oblonga unguiculata infer attenuata, obtusa superne detrita  
vix altera, ~~glabra~~, superiora remotia lineari subulata cartilaginea  
sensim minor. ped unculis terminali semunquiculatis. Capsula obovata,  
laevia calycis lanceolata

inferioribus oblongis  
foliis caulinis lineariibus



pulla  $\odot$  cauliculis unifloris, foliis caulinis ovatis crenatis, calycibus carnis.  
L. Spei: pl. p. 231/4 Gaey. obf. 30. t. 10. fl. austr. 3. t. 205.

Campanula alpina latifolia, flore pulli Bauh. prodr. 33. pen. 93.

13. Campanula foliis subrotundis Bauh. prodr. 34. t. 35.

Habitat in Austria.

nili rarispmi adpresus

Caules simplicissimus palmatis ascendens glaber tereti inflexus  
foliis petiolata inferiora suborbiculata superiora ovata crenata  
obtusis, ovatis, unguiculata. Pedunculus terminalis elong.  
gatus uniflorus, flore nutans lacinis calycis subulatis Calyx  
glaber

— inferioribus subrotundis

13. videtur diversa planta

47-48. Cochlearifolia Campanula foliis inferioribus petiolatis subrotundis dentatis, superioribus lan-  
ceolatis sessilibus subintegerrimis

Campanula minor alpina foliis cochlearis Barcl. icon. 454.

¶ Habitat in Openis. Communicant Dr. Carolini Neapolitanus Cultor Historiæ  
matutalis et inis

Tota glabra semipedales

Caules debiles superne ramosi. Rami simplicissimi, patentissimi

Folia alterna; inferiora petiolata, subrotunda, grossè dentata, dentibus utrinque  
3. acutis, basi integerrima, crassifucula, ovata, semiunguicularia;

superiora lanceolata, sessilia; subintegerrima, dente interdum uno  
alterove

Stipes in apice ramorum solitarii; ante florescentiam cernui.

Calyx glabri; lacini lanceolatis subulatis, corolla longioribus.

Capsula lineari trilobis de elevatis decurrentibus, in locis alans

¶ Cochlearifolia caulibus simplicibus unifloris, foliis radicalibus  
cordato subrotundis crenatis longis simpliciter petiolatis, caulinis subpatulatis  
acutis flora cernua. La Marti Encycl. no 4

Campanula longica radicata Pactano herb. Bonon  
in biblioth. Luj.



rotundifolia C. foliis radicalibus reniformibus, caulinis linearibus Lin. S. V.

Campanula sylvestris minima Dod. pempt. p. 167.

Campanula <sup>minor</sup> rotundifolia vulgaris Bauh. pin. 93.  
com. Sed. Tab. fl. Dan. Tab. 189

Campanula <sup>23</sup> minor <sup>2</sup> rotundifolia alpina Bauh. prodr. 34. V. 34.

Campanula <sup>pin. 93.</sup> foliis radicalibus cordatis, serratis caulinis linearibus Hall. herb.  
Campanula <sup>702</sup> alpina <sup>702</sup> linifolia conulea Bauh. pin. 93. Magn. mon. pel.  
47. V. 46.

Habitat in Europa paucis &

Caulis ascendens, simplex teres pedalis, glabrus. Folia radicalia  
petiolata crenata, obtusa, caulina remota, acuta, integerrima,  
glabra, lacinia bipolliciana floris terminatis interdum uni  
cui interdum plures in pedunculi ramosi. Calycis lacinae  
lineares

B. Caulis digitalis foliis radicalibus subrotundis caulinis lanceolatis <sup>Stolatis frequentibus</sup>  
oblongis obtusis integerrimis, floris unius <sup>et duo</sup> <sup>paucis</sup> parvis.

V. hoc gaudet caulibus ascendentibus palmatis inferne hi pedunculati  
foliis radicalibus <sup>partim</sup> <sup>acutis</sup> serratis, inferentibus caulinis petiolatis  
lanceolatis <sup>et</sup> <sup>in</sup> <sup>sequenti</sup> <sup>caulis</sup> <sup>linearibus</sup>



lanceolatis pedunculis superne alternis remotis interdum subramosis floribus  
majoribus quam in *β. Campanula cespitosa Scop.* ad hanc varietatem  
evolveri posse videtur

α.

Bellardi *C.* foliis ovatis acuminatis <sup>sub</sup> serratis, caule simplicis simo gemifloro  
flore erecto.

Campanula Bellardi All. fl. Pedem. n. 396. Tab. 85. fig. 5.

Habitat in alpebus Sabaudia 4

Planta digitalis vel palmaris facie Campan: rotundifolia var.  
cujus forte varietas tota glabra & caulis adscendens folia  
inferne frequentia, petiolo bipollicari, utraque acuta,  
avena utraque serratis 2.3. remotis minutis, unguem  
longo. ~~folium~~ folium supremum lanceolatum caulis superne  
aphyllum. flori unius cordis. lacinis calycis subulata  
Corolla Cam. rotundifolia ~~aut~~



refula P. caule unifloro subnudo, foliis ovalibus dentatis calyci busque  
glabri All. fl. pedem. t. 7. fig. 1

an varietas lotus



pyrella Q. foliis omnibus serratis: radicalibus cordato ovatis firmi  
nitidi: Caulibus remotis alferni

Scheuchzen J. 4. p. 454. fig. 4

*Concha rotundifolia*

Aspidotropa L. frutice angulata, foliis emi ovatis serratis glabris, germi-  
nibus Delavoni fl. Dan. Tab. 109

vantis G. v. v. v.



Boissoni Cradice crassa multicauli, foliis radicalibus serratis acutis  
caulinis lineariibus Gmel. p. 3. t. 33

non d.

Scheuchzeri. C. foliis lanceolatis linearibus subfalcatis, flore  
pendulo. Vall. fl. Delph. 2. 1. 10

amido





gramineifolia C foliis linearibus subulatis, capitulo terminali Lin. l. V. p. 200 x

Campanula alpina, Tragopogonifolia Bauh. pin. 94.

Trachelium Tragopogonifolia, montanum Col. phyt. 2. p. 25. Bauh. hist. 2. p. 802.

Trachelium minus gramineum condeo violaceum Barr. ic. 332.

Habitat in Italia montibus, Aprutii Salmone vicini &

Planta caespitosa Caulis ex adscendens, palmatis spithameis, simplicibus  
superne leviter vellosis canescentibus. Folia  
radicalia copiosa caulina pauca, omnia linearibus  
basi ciliata satnque glabra bipollicaria. Pinnis  
plexis caulibus basi prope latera. Capitulum terminale  
involucratum. Involucris basi dilatato ovatis in acumi-  
ne capitulo longiora attenuata basi membranaceum  
nervosum <sup>sub</sup> margine valde vellosis incanis. ~~Folia~~  
Calyx <sup>partibus</sup> lacinis calycis lanceolata ciliata corolla duplo  
breviora <sup>partibus</sup> corolla condeo dorso et margine  
5. 6 in periglo capitulo lacinis margine uti corolla  
longitudinaliter vellosis canis. Squama nectanifera  
ciliata. Stylus pubescens simplex. Stigma emarginatum  
involucrato



capitulae caespitosa herbacea erecta, foliis filiformibus glabris, panicula terminali,  
floribus alternis lin. suppl. p. 139. 1. V.

Habitat in C. bono p. 1.

~~capitulae caespitosa herbacea erecta, foliis filiformibus glabris, panicula terminali,  
floribus alternis lin. suppl. p. 139. 1. V.  
Habitat in C. bono p. 1.  
Caulis palmatus filiformis, erectus simpliciter  
glabris. Folia frequentia unguiculata, superne panicula retrorsum  
pedunculata <sup>sub</sup> dichotoma divisa, spatium sub ramificationibus  
terminalibus in angulo pedicello parvo.~~

integris glabris

calycibus

lobis

non vid.

*Lespedeza C. prostrata*, foliis lanceo-subulatis integris, floribus axillaribus  
solitariis sesquibus Lin. Suppl. p. 139 L.V. p. 210  
Habitat ad Cap. b. h. e.

glabris, ramis cernuis

non vidi



patula  $\odot$  foliis pinnatis: radicalibus lanceolato-ovalibus, panicula patula  
Lin. 1. V. fl. Dan. t. 373.

Campanula minor rotundifolia, flore in summis caulis Bauh. pin. 93.

Campanula epuleata foliis, ramis et floribus patulis Dell. Elth. 68.  
t. 50. fig. 68.

$\beta$ . Campanula decurrens foliis caulinis lanceolatis serratis decurrentibus  
fl. ser. t. n. 178.

Habitat in Anglia, Hecia, Danis arvis  $\odot$   
lonulis rupumulo. Caulis bipedalis basi tetragonus pilosus superius  
glaber <sup>mitis</sup> panicula. Folia paucis remota serrata radicalia cuneiformia  
caulina lanceolata. Calycis lobis folioli superlati  
in unio specimine remota serrata  $\odot$ . flores magnitudine  
Camp. rotundifolia

~~descriptio secundum specimen adhuc ad glutinandum consistens~~

*Rapunculus* P. foliis undulatis: radicalibus lanceolato-ovalibus panicula coarctata  
Lin. Spec. p. 232. 4 fl. Dan. Tab. 855.

*Rapunculus* Dod. perempt. 165.

*Rapunculus* esculentus Baur. pin. 92.

Habitat in Helvetia, Anglia, Gallia &

Caulis erectus simplex vel ramosus sesqui-pedalis inferne velotus  
superne glabrior. Folia lineari lanceolata inferna utroque  
superiora superne attenuata villosa si abnupta bypelli  
cana & stantia; interdum plana. Pedunculi alterni, plerum  
que tres simul intermedium longior filiformis semiujioculari  
Calyx pentagonus glaber. Corolla calycis subulata corolla parum  
brevis basi calata. Flores parvi



Florida

*C. foliis dentatis obtuse serratis, inferioribus cuneatis glabris superioribus lanicollatis sub pilosis caule paniculato.*

Habitat in Africa boreali

Caulis erectus, fructus, Vires, stratus glaber inferne simplex superne in ramos florum ferus dispersus folia ~~parte~~ sessilia, lamina remote serrata, bipollicaria, superiora attenuata. flores in ramis racemosi, pedicello <sup>longo</sup> brevi folium subulatum ad basin singuli pedicelli. Germina pentagona ~~in~~ decemplex catum. Lacinia calycis setacea corolla parum brevior. Corolla profunda quinquefida lacinis lanicollatis mucronatis,

Species rapunculi

o rapunculo forte <sup>non</sup> diversus

persicifolia C. foliis radicalibus obovatis, caulinis lanceolato-linearibus subserra-  
tis sessilibus remotis Len. l. v.

Rapunculus persicifolius, magno flore Bauh. pin. 93.

β. Rapunculus nemorosus angustifolius, magno flore major Bauh.

pin. 93.  
Habitat in Europa septentrionali aperi 4

Caulis erectum simplicissimus saepe bipedalis e lineis decurrentibus e  
basi foliorum decurrentibus angulatus, glaber uti tota planta. Folia  
radicalia basi attenuata extorsum dilatata ciliatis crenulatis  
caulina pauca remota, linearia tripolliciana superiore minima  
sed flores aliquot ad apicem caulis alterni pauci interdum  
plures nati sunt magni. Calycis lacini lanceolato attenua-  
to



Linarioides Campanula fruticosa glabra foliis linearibus integerrimis floribus terminalibus.

Campanula linarioides caulis virgatus apice ramoso paniculatis, foliis linearibus grassis exaequalibus, floribus erectis terminalibus La Mart.

Caules erecti virgati teretes striati, glabri super ramulis nonnullis floriferis

Folia sessilia basi grassa linearia, integerrima glabra obtusiuscula  
avenia unguicularia. <sup>manus parva</sup> ~~refecta~~ <sub>2. 3.</sub>

Pedunculi ad apicem ramulorum solitarii uniflori foliobun-  
lanceolatum ad basin  
calyx glaber laciniis lanceolatis

*Triphylla* ♂ foliis ternis linearibus, floribus verticillato-ternis Thunb. fl.  
Cap. 57 + L.V. p. 211.

Habitat in Japonia

Caules herbaceus, erectus, totus glaber. Stipulae sessilibus acutis, integra  
margine reflexo, glabra, patentia, pollicaria. Flores pedunculati.  
Peduncululi capillares uni flori, ramus divisi, foliis triplo longioribus  
Thunb.

non vidi



Lineari Camp. herbaeae, erecta, foliis linearibus integris glabris, floribus cernuis, capsulis hispida Len. Suppl. p. 140 \* L.V.

Habitat in Cap. bonoppei

Differt a Camp. capillacea capsulis hispida, calyceque longitudine corollae hinc

paniculata Camp. herbae caule paniculato, ramis divaricatis, foliis lanceolatis in  
tegni; floribus terminalibus solitariis. Lin. Suppl. p. 139. L.V  
Habitat in Cap. boreo spec. fulbo missi Thunbergii pedales

Caulis basi et superne ramis teretibus striatis tenuis rigidus  
levis vix nisi oculo armato. foliis <sup>plena</sup> vix angustulana margi-  
ne incrassata inferiora opposita superiora alterna peti-  
ola patula oculo armato denticulata altera  
sanat caule foliis, glabris. Venisve vel ~~magis~~ angulatisve

~~sub nomine Campanula paniculata plantam missi  
Thunb. cum differantia epi minime congruent  
cum Lin. <sup>vero</sup> fol. hebe an Thunbergii diversa plant  
C. paniculata foliis lanceolatis undatis hirti caule  
angulato hirsuto, floribus racemosis Thunb. prodr  
fl. Cap. pag. 401~~



gracilis P. foliis linear-lanceolatis obsolete serratis, caule dichotomo  
floribus plerisque terminalibus. Hoff. prodr. no 84.

Habitat in nova Zelandia et nova Caledonia <sup>rarè</sup>  
Caule herbaceo angulato glaber. Rami superne leviter pilosi  
uti folia subtus. Folia sessilia sequipollicaria, acuta  
integerrima vel dente uno vel altero ~~ut~~ notabili.  
Pedunculis elongatis glaber. Calyx turbinatus glaber  
laciniis lanceolatis acutis longitudine corollæ

prosa Camp. foliis lanceolatis lobatis, caule erecto sursum punctis porofo hinc supple

p. 142 \* S.V.

Habitat in Cap. bono frui

Caulis teris erectus, pedalis: ramis numerosis erectis brevibus, in meo elongati

Folia lanceolata, superiora linearia, lobis integerrima. Racemi  
terminaliter erecti. Flores parvi <sup>racemi</sup> minoris quam in rotundifolia.  
Rami supreme adpressi, fructu foliaceo. Lacinia calycis lanceolata  
attenuata. Seta planta poro, via oculis raris perspicua, qui non  
obscure sed sursum cauli cadunt.

radicalibus obovatis, caulibus  
floribus racemosis



Lobelioides Camp. glaberrima, ramis summa, foliis lanceolatis serratis <sup>et</sup> pubes, paniculis terminalibus secundis, corolla infundibuliforme Len. Suppl. p. 140 \* S.V

Habitat in locis latetibus Madag. O

Planta habitu Lobelia, ad eam tenera eodemque modo divisa, etiam in flore sentia. Perianthium superum trif. pentaphyllum, foliis ovatis, obtusis persistens. Corolla minutiflora, albo purpurea sentes, calycis duplo longiores infundibuliformes. Tubus cylindricus, sensim ampliatu. Limbus partitus: laciniis cretis. Capsula bilobulari Len. Variat calycis 3 et 5 partito, corolla limbo 3 et 5 quepartito, etiam stamini bus 3. f. s. L.

Lobelioides C. cauleculis teretibus fructis glabris, foliis linear-lanceolatis dentatis <sup>et</sup> latis, corollis subinfundibuliformibus trifidis quadrisfidisque Hort. New. 1. p. 219.