

Camphorosma

monspeliaca & foliis hirsuta

Camphorata hirsuta Bauh. pin. 486. Boerhaaf. in Act. Parif. p. 313. Bauh.
cent. 1. p. 18. Tab. 20. fig. 1.

Camphorata monspeliensium Bauh. hist. 3. p. 379. Lobel. adv. 174.

Habitat in Hispania, Narbono, Tataria arenosis &

Caulis pedalis inferne indeterminate ramosi, procumbentes
tomentosi cinerei. Folia subulata brevia in glomerulis aggregata
glomeruli distincti distincti. Florae ovata acuta concava. Ovis axillaris confert
in spicam oblongam spicis laterales alteras.

Pteranthus *P. ramosissima*, pedunculis ensiferonibus dilatatis, bracteis infra
Linn. Mant. 41. + S. V. p. 166

Pteranthus *Eorh.* Desf. pag. 36

Habitat in desertis harenis et Maribus. O

Tota glabra caules semipedales ^{inferna junctura} decumbentes, articulati articulis prolicianibus
vel ultra ^{inferna junctura} ~~trif.~~ ^{trif.} trichotome ramosis, tot tetragonis angulis punctis
elevatis. Folia verticillata 5-7. inaequalia pollicaria ~~verticillata~~
lineana, carnosa. Flores pedunculati flores in dichotomia et ter
minales plures subsessiles laterales subsessiles pedunculati,
intermedi sessiles in receptaculo ovato compresso, villosa
flutato, ad marginem utrinque truncato apice florifero
induracuo. Flores 7 in singulo. Flores mediis compressis cordatis
^{marginibus} ~~Petala 4 villosa~~ ^{phyllis} con villosis foliola duo extensa in alam
verticalem verticalem margine hyalino apice emarginata
cum hamo. Duo interiora minora hamo compresso termina
ta

Loucheia d'Herter

paleacea C. Indico, ramis fructiformibus paleaceis pilosis Lin. Suppl. p. 120.
f. v. p. 166

Habitat in Cap. b. p. i. t.

Erubescens pedalis, determinate ramosa. Rami alterni, testis paleis,
hirsutis foliis floribusque, imbricatis mixtis. Palea membrana
cis alba, minuto. Stigma minuta elliptica, lora, sessilia
~~Calyx 4-ph., flus ad reliquos~~

acuta \odot foliis subulatis rigidis glabris

Anthyllis altera Italorum Tabern. herb. 57. Lobel. Ic. 404. Dalech. herb.

1150,
Camphorata altera Tabern. herb. 57.

Camphorata congener. Bauh. pin. 486 (vans.)

Habitat in Italia, Tatania 2

Caulis in meo lignosus glaber flexuosus, prostratus, ^{vellosus} procumbens, glaber.
Nervi alterni breves frequentes pollicares. Olea conferta
vellosi canescentes solitarii pubescentes, distincti. Pappi

glabra *Camphorosma foliis subtriquetris glabris inermibus* Lin Ana. Acad. 1. p. 393. S. V. 166.
Chamopescis et camphorata minor Lugd. 1174
Camphorata glabra Bauh. Pin. 406

Habitat in Helvetia 2

Rami ~~sesse~~ ^{superne villosi} glabri decumbentes. Folia subulata ~~grafa~~ ^{in ramulis}
~~conferta. flores in axillis in ramulis axillaris solitarii, alterni~~
~~pediculis villosi canescentes~~

Two *Camph.* cy nota in herb

non vidi

Asplenium *Camphorosma?* foliis linearibus - lanceolatis floralibus calycibus
hirsutis villosis

Habitat in Sibiri

Caulis prostratus erectus proaplexa superne villosa folia alter-
na sessilia unguiculata d. spatiosa, acuta villosa, fasci-
culi foliorum in axillis. flos superne axillares scapulis
hirsuti, rari

Salsoloides Camph. ? foliis linearifoliformibus glabris

Habitat. In Schumacker

Caulis teres glaber. folia filiformia unguiculata distantia
sagittuli foliorum in axillis. floris superne axillaris
lesplei in lophopuli

Tomentosa Campf. incano tomentosa, foliis ovatis

Habitat in regno maroccano Schoubor

Caules lignosi pedales ~~ramis~~ ^{ramis} fraxi tomento incano uti tota
planta seki. folia sessilia ovata parva parva cum rudimentis
ramulorum foliaciis in axillis
flores non habet. habitus vero ex parte reliquorum