

Panna

Sicutammodo cum res gygnandis sunt, scylas cum pler vel minus cum filamentis
connatur vide in Philof. bot. et Richard. Bot. bot. Tab. 68. Deque a Monan
Dni separanda et cum conjugenda cum gygnandis

angustifolia *Canna* foliis lanceolatis petiolatis nervosis L. Spec. pl. pag. 1. & ib. pag. 1675 & S. V. p. 30

Amudo india florida *angustifolia* Moench. h. 3. p. 250. f. p. 14. fig. 6

Albana f. *Pacifica* Trautv. bot. 213. fig. bona

Habitat inter Tropicos Americae: umbrosis frons grossa.

Petala interna una emarginata, uti in *C. latifolia*: horum petalorum alterum laterale ita flectitur, ut intermedium evadat. Speciei vix distinguenda a precedente, quamvis humilior et angustior, qui ita que pro varietatibus utramque assumunt, vix errant. Lin

non idem

arundinacea Cinna. Linn. Spec. pl. pag. 7 *

Habitat in Canasa 4

flosculi lanceolati, viridi pergrassantes; anota brevis infra apicem
in altera calvula corolla herb. huj. spec. a Linnæo misera

as ~~ex~~ ~~grasso~~ ~~speciar!~~

gramen sub hoc nomine desit hinc

indica C. foliis ovatis utraque acuminatis ciliatis Willd.

arundo indica latifolia P. Aub. pin

Kratu bala Rheed. Mal. 11. p. 85. t. 43.

Cannaionis Rumph. amb. 5. p. 177. t. 71. fig. 2. ^{'nervosa'}

Canna indica foliis ovatis utraque acuminatis angustatis

lin.

a nubra flore toto rubescente, foliis ellipticis ovatis H. Kew 1. p. 1.

arundo indica flonda f. Canna indica Monf. h. 3. p. 250

f. P. t. 14 fig. 1.

B. lutea petalis interioribus erectis luteis, nectarii laciniis revolute
sa lineis rubicundis inornata, foliis ovato ellipticis
H. Kew l. c.

arundo indica flonda angustifolia Monf. h. 3. p. 250

f. P. t. 14 fig. 6.

V. cochinea petalis interioribus erectis cochineis, nectarii laciniis
revoluta lutea lineolis ^{rubicundis} rubris inornata, foliis ovato
ellipticis H. Kew

D. patens petalis interioribus reflexis cochineis, nectarii laciniis
revoluta lutea lineolis rubris inornata, foliis lanceolato
oblongis H. Kew

Habitat inter tropicos Africa America 4

Canna indiflora foliis ovatis acuminatis, laciniis tribus corolla interioribus majoribus flor. Penur. 1. pag. 1.

Habitat in Penuria 2

Radix fistulata fibullosa. Culmi plures, 3 ulnae, erecti, teretes, articuli lati. Folio alterna, petiolata, ovata, acuminata, acuminis subspeciali nervosa, lineata, supra nitida, glabra, subtus lanata, albicantia. Petiolus culmum vaginantis, margine superiori plicati. Nervi gemini, bipartiti. Peduncululi compressi. Pedicelli curvati, uniflori, nutantes, sub pediculis bractea spatulata, ovata, minima, filura ad basin siguli pedicelli, interdum duo, subulata lineare, saepe bipartitum. Bractea spatulata lanceolata convoluta. Calyx triphyllus, persistens. Corolla infundibuliformis: Tubus calyce triplo longior. Limbus sexpartitus: laciniis 3 tribus exterioribus brevioribus, lanceolatis convolutis, erectis equalibus perspicuis: interioribus 3 tribus oblongis, majoribus, laciniis patentibus, rubris. Nectarium petalordicum bipartitum, figura et longitudine petalorum interiorum, basi variegatum: laciniis 2. Anthera unida, lanceolata, convoluta, altera longior, bifida, reflexa. Stylus longior formis basi vaginatus. Capsula oblonga, trigona maxima, muricata. In fl. Penur.

Canna paniculata foliis ovatis subtus lanatis argenteis, petalis internodiis
brevioribus fl. Penn. 1. pag. 1. tab. 1. fig. a.

Habitat in Pennis horti et fylva 4

Radix ramosa, fibrillosa. Culmi plures, erecti, tergyales. Folia alterna
petiolata, ovata, lineata, nervosa, subtus lanata. Petioli semisagittati.
Panicula terminalis, patens. Bractea lanceolata, concava marcescentes
Petala 6. coracina: 3 extenora majora equalia: interna inaequalia
Capsula ovata, oblonga, ciliolata, magna. Semina globosa fl. Penn

angustifolia C. foliis lanceolatis petiolatis costatis Wild.

Alban. f. Pauciflora P. f. bras. 213.

Cana angustifolia foliis lanceolatis petiolatis nervosis
Lin

¶ abstat in America locis umbratis spongiosis &
procedente humilior angustior. Petala 3 interiora emar-
ginata ut in C. india horum petalorum alterum laterale
ita flexibus ut intermedium evadat.

glauca L. foliis petiolatis lanceolatis glaucis subtus enerviis Wild.

Cannae omnis glaucophyllar ampliore folio flore,
in d. palustris facie Dill. Elth. 69. v. 59. fig. 69

Canna glauca foliis petiolatis lanceolatis enerviis
Linn.

Habitat in Carolina aequos 4

glauca. C. foliis lanceolatis, corolla limbo interno albo
laciniis glaucis internodiis majoribus Salisbury

4 c. p. 3. t. 2.

Habitat in

non videtur varietatem glauci facit Willdenow

penicillata Solis linearibus nervosis Petz. off. 11. p. 9.

Habitat in China

Solis linearis graminea nervosa nervi 5que elevatio
nibus basi vagrantia. Scapus vagans plurimis lan-
ceolatis paucifloris. Corolla parva obscure rufa
pericarpium mucicatum Petz.

non vidi

minus A. Cappula ~~pylobosa~~ tripulca conacea evalvi
Gortn. de fruct. P. 1. 1. 22.