

Cantua

Capsula 3 loculari. Sem. a lata. Corol. infundibuliformis.

Pereskia fl. Peruv. hujus generis

flexuosa Cantua

Periphragma flexuosum foliis lanceolatis acuminatis, floribus corymbo
p. 86. Penn. 2. pag. 17. Tab. 131.

Habitat in Penna versuni 5

Trinax Tricoryali. Caulis erectus, teres, ramosis ramis: rami inferiores reflexi
tenari pubescentes. Folia sparsa breviter petiolata, lanceolata, oblon
gata cum acumine parvo, supra nitida subtus pubescentia, prope
et aequalia juniora e medio ad apicem serrata, serram integerrima.

Flor. Vermiales at ex axillis superioribus, corymbosi. Corymbi multi
flori. bractea subulata, decidua. Calyx striatus, ad curvaturam a ter

Corolla alba curvata, calyce triple longior. Filamenta corollae duplo
longiora flexuosa Pl. Bar. l. c.

foetida Cantua

Periphragma foetidus folus lanceolatis glabris, pedunculis subtis-
tis. Fl. Per. 2. pag. 17 tab. 132.

Habitat

Foetidus. Rauli fruticosus, oxygale erectus, ramosus. Ram. var. 2.
Folia conferta, sessilia, lanceolata oblongaque, integerrima, glabra, nit.
da supra, secunda. Pedunculus ⁱⁿ solitarius, ⁱⁿ ramulo gemmae
terminali bif. Inflor., geniculatus, a geniculo usque ad caly-
cem nigrum. Calyx violaceo nigrescens. Corolla pallida nitens
lobis limbi lanceolata. Dux villis clausa. Filamenta corolla
longiora. Stigma capitatum obsolete bifidum. Capsula biloculari,
interdum triloculari. Fl. Per. 6. c.

perifolia Bonpl.

Habitat in Peru herb. Fusf. 5.

Rami teretes, glabri, cortice rimoso, alterni, crassitie fere penno colum-
bina. Folia tuberculo insidentia, petiolata, alterna, six pollicana,
solitana, oblonga, subovata, glaberrima, subtus venosa, mucronata,
integerrima. Corymbi ad apicem, simplices: pedicellum ad basin caly-
cis. Calyx trifidus, glaber. Corolla semi pollicari.

Confer cum *Cast. Depend.*

Dependens: Cactus

Periphrasmos dependens: foliis obovatis acuminatis, venis, ramis de-
pendentibus, floribus: Cymbaris & C. Peruv. 2. pag 10. Tab 133.

Habitat in Peruvia vers. uni &

Paulis fruticosus, inoxyalis, erectus, Vero, undique ramosus & semis. Ran-
conferti, penduli, superne foliis Vero pubescenter. Folia sparsa sub
per filia, obovata vel oblongo-obovata, integerrima cum acumin-
minimo, obsolete venosa, subconacea, nitidiuscula, patentia:
venosa leviter pubescentia. Flores terminaliter, 3-9. Cymbaris
penduli. Calycis hirsuti, oblongo-ovati, pentagoni; Decem & nat.
altero latere purpurascens. Corolla purpurea, calycis triple
Congruo. Tubus incurvus, basi luteus. Stigmata 3. Capsula inear
sa. Semen agra, ala membranacea alba cincta & C. Peruv.

pyrifoliae C. foliis ovatis petiolatis glabris, flore subcampanulato, staminibus
exsertis La Mart. Encycl. 7. 106. fig. 1.
Habitat in Pont.

non vidi

laxifolia Cantua

Habitat in Peru herb. Tuss. 5

Rami inferne teretes, ^{elevati} superne angulati, et punctis fibrinis sculi, fraxi, villosi.

Folia aggregata, alterna, lanceolato-oblonga, unguiculata, mucronata, basi attenuata, acuta, aserna, enervia, utriusque villis raris, etata glabriora, tuberculo ^{vuloso} infidentia. Pedunculi superne et ex apice, triflori, villosi, breves. Calyx tubulosus, striatus, villosus, canescenti, ut semi-pullicari, plani dentatur. Corolla tubulosa, bi-pollicari, globosa.

buxifolia! Q foliis ovato-lanceolatis, serratis, subtus pubescentibus, flore
tubuloso, staminibus inclusis La Mart. p. 4873. Tab. 106. fig. 2.
Habitat in Peru 5

non vidi

Pantua ovata Cavon. eadem
ac *Periphragma uniflorum* foliis obovatis inte-
gris, nonnullis 2. 5. fido dentatis floribus soli-
tariis 2. 5. 10

rebra & foliis pennatis linearibus, floribus racemosis pendulis Lin. f. V. p. 2047
Quamoctis pennatum erectum, floribus in thysum digestis Dill. Cat. 321. f. 241.
fig. 312.

Polemonium rebrum Sprei. pl. p. 231

Habitat in Carolina citrensis arenosis

Generis Dubii. Caulis suffruticosus, rectus: Calyx monophyllus tubo brevi, dentibus
subulatis tubo calycis longioribus. Stamina Corollae tubo medio inserta absque
valvulis. Planta non lactescent Lin.

pennatifida Cartua

non id: