

# Cappans

x pinosi

1. pinosi C. pedunculis unifloris solitariis, sepulis pinosis, foliis subrotundis longioribus; sepulis pinosis
2. zeylanica C. pedunculis unifloris subsolitariis foliis brevioribus; foliis ovatis acuminatis, sepulis pinosis
3. lorrda C. pedunculis unifloris supraaxillaribus subternis; foliis oblongis mucronatis, sepulis pinosis
4. syriaca C. pedunculis umbellatis umbellis axillaribus pedunculatis, foliis ovatis emarginatis, sepulis pinosis
5. <sup>obovata</sup> pubescens C. umbellis terminalibus pedunculatis, foliis oblongis emarginatis, sepulis pinosis
6. pinosus C. floribus racemosis, foliis ovato-lanceolatis, ramis pinosis

7. frondosa C. pedunculis umbellatis, foliis lanceolato-ellipticis, rasim conferti  
 9. ferruginea C. pedunculis umbellatis, foliis lanceolatis subtus tomentosis, flori-  
 bus octandris
8. Badulla C. pedunculis unifloris foliis ovato-oblongis determinate  
 conferti nudis
10. longifolia C. pedunculis foliis lineari lanceolatis, subtus  
 laninosis-punctatis
11. Sonulosa C. pedunculis subbifloris Verticibus terminalibus, foliis lanceo-  
 lato-ovalibus, subtus albedo punctatis, siliquis Verticibus lineantibus
12. Cynophallophora C. pedunculis multifloris terminalibus, foliis ovalibus  
 sonulosis obtusi, glandulis axillaribus
13. puleherima C. pedunculis racemosis, foliis oblongis obtusi, fructibus  
 ballatis.
14. linearis C. pedunculis subracemosis, foliis lineantibus
15. grandis C. corymbis terminalibus, foliis ovato-acutis glabris, fructu  
 globoso
16. Breynia C. pedunculis racemosis, foliis oblongis, calycibus pedunculis  
 isque petalisque subtus tomentosis



17. *hastata* C. pedunculis multifloris, foliis hastato lanceolatis  
18. *filicoides* C. pedunculis multifloris compressis, foliis lanceolatis  
oblongis acuminatis subtus punctatis, petalis squamosis  
19. *multidatula* C. foliis ovato lanceolatis attenuatis glabris

erythrocarpon

Capparis pedunculis solitariis unifloris oblongis obtusis pentacar-  
piciis hexagonis, aculeis stipularibus geminis rectis

Habitat in Guinea ~~Piedt~~ Thonnois, 4, 5, 6, 7

Rami teretes, glabri. <sup>versus apicem vellosuli</sup> aculei stipulares, gemini, recurvi. Folia, ovata, basi  
qui polliciana, oblonga, emarginata, obscure venosa, utrinque glabra. Pedun-  
culi terminales, pollicares. Capsula magnitudine Cerasi, oblonga, lineis  
elevatis costata

# vel obtusa cum mucrona brevissimo



*Diversifolia* Copponi <sup>6 7 8</sup> foliis ovatis simplicibus <sup>9</sup> ternatisque, <sup>pedunculatis</sup> floribus axillaribus  
<sup>3</sup> ~~unifloris~~ <sup>4</sup> terminalibusque <sup>racemosis</sup>  
Habitat in Guinea Aest 5

Inermis, tota glabra. Rami teretes costae pallido. Folia petiolatis, ova-  
to oblonga, inferiora ternata, superiora simplicia, remota, tripollicia  
na, lobis viridia, venosa, acuta. Flores pedunculati, axillares, soli-  
tari, terminaliter racemosi, approximati: Pedicelli bipolliciares, uni-  
flori. Calyx membranaceus: foliola ovata, acuta. Petala lanceolata,  
stamina copiosissima, corolla longiora. Germen oblongum. Stigma  
planum.

2. Zeylanica & pedunculis unifloris solitani; stipulis spinosis; foliis ovatis utraque  
acutis. Fl. zeyl. 210 Spec. pl. pag. 720+

Cappani zeylanica, duplicatis spinis, foliis acutis Bot. mus 625

Cappani spinosa foliis oblongis Burm. zeyl. 53.

Habitat in zeylona &

Rami teretes superne pubescentes. Soli breves petiolata acin-  
minata venosa bipollicaria, ~~stipulis~~ glabra integerrima.  
Pedunculi axillares, gemini, unguiculares, pubescentes  
utriusque calyx. Stamina longitudine invollo. germen mi-  
nutum ovatum acuminatum.

solitani, foliis brevioribus unifloris  
foliis ovatis acuminatis



Cappari foliis ellipticis glabris floribus caesemose

Habitat ad N. Matham. No 40.

Rami teretes glabri superne purpurascens. Folia petiolata  
parva venosa 5-6 pollicina superne minus obtusifera  
ca cum mucrone. Racemus terminalis flore parvi parvi  
glabri germen lineare oblongum

Frustrum sub nomine Edechi Loefling. a West.

Pedunculus <sup>seor</sup> triplon intermedius primum floris foliis laterales sessile  
Calyx superus pubescens lacini ovato  
Corolla monopetala hypocrateriformis limbo profuso lacini oblongo  
obtusis tubo duplo plus longis  
filamenta ut ulla superne in tubo. Anthera 6. lineari parum ultra  
funicem pro apicibus prominentis.  
Stylus 1. tubo longior stygia simplex obtusum

Capparis sub nomine capparis

Reliquos

Calyx 4 phyllis foliatis oblongo subrotundis  
Petala 4 ov oblonga obtusissima semipollinaria, obtusissima  
Stamina filamenta numerosa corolla longiora, anthera lineari  
erecta.  
Stylus feli formis longitudine staminum apice gl. clara ob  
longo

Calyx perianth. 1 phyllem superum campanulatum lacini ovato

Corolla <sup>acido</sup>

filamenta 10 calyce longiora anthera subrotunda  
Stylus bilobatus acutus longitudine staminum receptaculo pilos



*Jupax axillaris* Cappari

Habitat in India orientali herb. Tuss. 5

Rami teretes, uti tota planta glabris, pallide siccatis. Spicae duo, stipulae  
res, rectae, breves, apice fusi. Stipulae petiolatae, ellipticae - lanceolatae,  
4-5 pollicariae, venis pinnatis venosa, acuminata brevissimis terminata. Petioli  
unguiculares. Pedunculi quatuor, supra axillares, alterni unguiculares  
uniflori. Calyx glaber. Foliole oblongae. Germin oblongum  
prope cordum collocatur

*peyriifolia* Cappani

Habitat in India orientali herb. trusf.

Rami teretes, canescentes: aculei 2 ftipulares, parvi. Folia petiolata,  
bipollicaria, ovato-oblonga, attenuata, glabra, subtus obsolete tomentosa  
venosa. Pedunculi axillares, solitarii vel terni, petiolo longiores, uniflo-  
ri tomentosi uti calycis



1  
Speciosa Capparis enormis, foliis lanceolato-oblongis, floribus racemosis subumbellatis, fructibus globois

Habitat in Ceylona King herb. Royenii

Eructus hemine usque altior. Rami teretes, superne oculo armato leviter tomentosi, perperam  
rascens. Folia petiolata, sesquipolliciana, avenia, anevia, glabra, obtusiuscula.  
Petioli unguicularer. Peduncululi ad apicem ramorum lateralem, 5-6, alterni  
approximati, pollicares, uniflori. Calyx concavus: foliola subrotunda. Flores mag  
ni speciosi. Eructus magnitudine pomi Borsdorffiani majori

rugosa Cappari

Habitat in India occidentali herb Desfont

Rami teretes, glabri superne leviter villosi. Folia petiolata, bipollicaria, oblonga, obtusa, venosissima glabra, subtus canescentia, siculo armato margine denticulato scabra. Racemi axillares, multiflori, breviter pedunculati. Flores parvi. Calycis foliola lanceolata. Stamina circiter 14. Pedicelli gemini, villosi. Capsula globosa, villosa, acuminata brevi obtusa.



*Corymbosa Cappari*

Habitat ad Senegal herb. Araf. 5

Rami teretes, glabri, crispè penna anserino: ramuli patentissimi, apice villosuli.  
Folia petiolata, pollicaria, ovalia, glaberrima, subcoriacea, integerrima, emarginata,  
supra arena, subtus nervo-venosa. Aculi stipulares, gemini, recurvi  
apice nitidi. Petioli brevissimi canescentes. Pedunculi axillares et terminales  
solitarii, unguiculares, vespi florem incusati, intarsi. Calyx totus tomentoso  
fuso. Filamenta purpurea. Germen globosum, glabrum.

*Corymba Capparis*

Habitat in insula St. Thome West. Ind. Desfont.

Racemi ex axillis supremis solitarii, terminaliter gemini, pollicares, flexuosi.  
Pedunculus rigidus, glandula fulva sub pedicello: pedicelli unguicula  
res glabri. Pedicellus fultus purpureus, tri vel 4 pollicaris. Siliqua bipollicari  
ni, crassitie digiti minimi, obtusa, cylindrica, subtriloba



cod. folia Capparis

Habitat herb. La Martini 5.

9 nervis. Rami teretes, glabri. Folia petiolata, sesqui pollicaria, cordata, glabra.  
Pedunculi axillares, uniflori, longitudine folii. Flores magni fere Cap: pinnati

221 La Martini

*pinnifolia* Capparis

Habitat herb. Tusf.

Rami teretes, pulverulento-ferruginei. Aculei stipulares, recurvi. Folia  
subovato-oblonga, supra nitida, subtus stellato-subvellosa, juniora et novae  
ferruginea vel cinerea tomentosa, bi-*f.* tripollicaria. Flores supra axillares  
satis non diversa a *Cap. heroda*.



*Divaniata* Cappari

Habitat herb. Quif.

Rami Dichotomi, teretes, glabri, flexuosi, divanitati. aculei recurvi, subai-  
culares, patentissimi. Folia petiolata, pollicaria vel parum ultra, ovato-  
cuneolata, angusta, glaberrima, obscure venosa.

*Tomentosa Cappani*

Habitat ad Senegal Leb A. w. f.

Rami teretes, tenuissimi fructu, pubescentes. aculei stipulares gemini, recurvi, fusci, nitidi. Folia breviter petiolata, pollicaria, oblonga, emarginata, supra pubescentia, subtus tomentosa. Fructus globosus, magnitudine cerefi.



*Corymbosa* Cappari

Habitat ad Senegal herb. Guss.

Rami teretes, superne flavo tomentosi. Spinae duo stipulares, recurvae. Solae petio  
lata, bipollicaria, oblonga, integerrima, supraglabra, subtus tomentosa, subvirens,  
obtusiuscula. Racemi terminales, pollicares. Peduncululi, pedicelli et calycis  
tomentosi flavescentes. Stamina coriacea. Germen globosum.  
an eadem ac *enthocarpum* Gert.

*egyptiaca* Capparis

Habitat in Aegypto heb. Gusf.

Rami teretes, glabri. Spinae & pulvilli, raris, parvis. Folia subrotunda, subob-

riata.

Inter plantas Josephi adest



Cappari

Habitat in Domingo herb. fus.

Rami teretes, superne compressi, ferrugineo-pulverulenti, tomentosi. Folia petiolata, 2-3, pollicina, lanceolata-oblonga, utrinque obtusa, venosa, supra glabra, subtus ferrugineo cinereoque subtomentosa. Pedunculi axillares. Pedicelli umbellati, terni, pulverulenti, tomentosi, uti fructus oblongus, semipollicaris. Directus <sup>vs</sup> longitudine pedicelli

an C. jamaicensi Turqui

lineata Cappari

Habitat ad Rio Janeiro Lombey herb. Fusf.

Scandens? Rami teretes, pulverulento-tomentosi, canescentes: ramuli flexuosi.  
Folia petiolata, pollicaria, ovato-oblonga, acuta, juniora utrinque tomentosa, incana, adulescentia supra glabra, nitidiuscula, mucronata, secundum venas lineata. Pedunculi axillares, semi pollicares, petiolo longiores, solitarii uniflori, uti calycis incano-tomentosi



Amegdalina Cappari

Habitat herb. Guss.

Similis C. Breynii at folia supra nuda venosa, subtus squamulosa. Pedunculis axil  
lariis multifloris. Siliqua pedales, teretes, crispis fere pennis cygneis, ferrugineis

*Panduriformis* Cappari

Habitat herb. La Mantii 5

Inermis. Rami teretes, punctatis, glabri. Folia breviter petiolata, 2-3 pollicaria, panduriformia, integerrima, utrinque obtusiuscula, arenia. Peduncululi ad apicem alterni, unguiculares, glabri, uniflori. Stamina plura. Germen oblongum



10 *Baduica* P. pedunculis unifloris, foliis perennantibus ovato-oblongis determinate  
confertis nudis Lin. Spec. pl. p. 721. \*

*Baduica* Rheed. mal. 6. p. 105. t. 97.

*Capparis inermis*, foliis ovato-oblongis perspatia confertis perennantibus  
Hort. Cliff. 204\*

Habitat in India \*

Folia utrinque glabra venis obsolete reticulata, nervis

subtus  
e Madagascar. herb. Mus.

Inermis. Ramis teretibus glabris. Folia alterna simplicia vel ternata  
foliolo petiolata, bipollicaria, oblongo-ovata, submarginata. Pedunculi  
et apices breves. Hamulae copiosae. Pedunculus fructus, sesquipollicaris  
nervis glaber oblongus.

Racemi axillaribus

Ceyminosa Capparis inanis foliis ovatis acuminatis glaberrimis, fructu subsessili compresso  
arcuato  
habd: a Inf: Amer. merid.  
Rami tenues glabri, ~~longi~~ punctis densitate non siccis  
Folia breviter petiolata ovata sensu anteyemina acuminata, acumine  
emarginata, glaberrima venosa tripollicaria  
Flores axillares racemosi in 6 flori  
Calycis <sup>foliata</sup> corva oblonga, acuta crassa semianquiculana  
Petala alba calyce duplo longiora  
Filamenta numerosa Corolla breviora  
Trichium legumen, incurvatum, compressum glabrum, corva utrinque  
acuminatum subsessile stylatum  
differsa reliquis fructu



herba Cappari ten pedunculis axillaribus binis stipulis adnatis vix  
flexuosi, foliis ovato lanceolatis mucronatis glabris Syst. V. Sup. 264

Flores pedibus infra axillares per binos vel 3. fratis parvo a se invicem distan  
tes, pedicelli unguiculari villosi femineis  
foliola Calycina ovata villosa femineis  
germen globosum

Copenfis Capparis <sup>gemmae</sup> umbellatis, stipulis spinosis, foliis ellipticis perennantibus?

hab. in Cap. b. Spei

Rami teretes, divaricati, glabri

Folia alterna, petiolata, glabra elliptica, integerrima, emarginata, cuneata

<sup>pylloides</sup>  
Petiolus brevissimus

Spina utrinque brevis subcurva apice supra nitida

Stipulae cili umbellati teretes glabri versus apicem incrassati

Calycis foliola oblonga glabra margine tenuiora

germen pedicellatum globosum

valde affinis Sepuano 2 folia crassiora elliptica, Pedunculi Element

Pedunculi germinis multo crassiora in Sepuano capillares



1. *Junopis*  $\odot$  pedunculis unifloris solitariis, stipulis junopis, foliis annuis, capsu-  
li ovalibus. Lin. S. V.

*Capparis junopis*, fructu minore, folio rotundo Bauh. pin. 400

13. *Capparis* folio acuto Bauh. pin. 400

*Capparis* sicula duplicata *Junopis*, folio acuto Boerh. sic. 79. t. 42. fig. 3.

Habitat in Europa australi et orienti nederatis, munit  
& caulis procumbente ramosi, vesicis glabri, hinc inde spina  
una vel altera adpressa. Colea petiolata, alterna subro-  
tunda vel ovali indurissima, crassa nervosa 1. f. byol  
lae ana, glabra, stipula minuta petiologica utraque  
ad latera axillarum. Pedunculi axillares solitarii uniflo-  
ri folio longiores Petala ovata calyce longiora emor-  
ginata

folio subrotundo longioribus

zeilanica P. axil pedunculis axillaribus <sup>subsolitariis foliis brevioribus</sup> geminis unifloris foliis ovatis  
acuminatis, stipulis spinosis rectis

Capparis zeilanica, duplicatis spinis foliis acutis. Petw. mus  
mus. 625

Capparis spinosa foliis oblongis Burm Zeyl. 53.

Capparis zeilanica, pedunculis solitariis unifloris, stipulis  
spinosis foliis ovatis utraque acutis <sup>lin. fl. Zeyl.</sup> 210.

Habitat in Zeylona

Rami teretes alterni superne leviter tomento ferrugineo tomen-  
tosi. folia petiolata alterna saepe bipolliciana viti-  
germina supra glabra subtus nervis et venis pubescentibus  
valde acuminata. pedunculi filiformes plerumque gemi-  
ni pubescenti glomeri parvi. Stylus germinis capudlatis  
pollicari. petala vili nubescentibus hirsutis. germen  
globosum



3. *Lorrida* (pedunculis axillaribus binis, stipulis aculeatis, ramis flexuosis,  
foliis ovato-lanceolatis mucronatis glabris Lin. Suppl. p. 264. t. V. pag 480

Habitat in zeylona &

Rami teretes villosi cani punctis ferrugineis ad pectus & data  
et glabri. Spinae duo ad singulum folium apice nudo flavescen-  
tia, petiolata ovalia vel oblonga subretusa acumina-  
ta, venosa basi acuta bipolliciana et ultra inter-  
germina supra axillaria. Pedunculi supra axillares  
ternati unus supra alterum 2.4. tomentosi ferrugini  
pulverulenti aniflori calycis ferrugineo tomentosi  
petala villosa stamena corolla longiora. Germina  
oblongum

supra axillaribus subternis  
oblongis mucronatis glabris

foliis

myrtifolia

Q. pedunculis axillaribus geminis terminalibusque <sup>unciplois</sup> foliis  
oblongis emarginatis ~~res utraque~~ ramisque glabris spina recta  
Habitat in cap. b. p. et

Rami alterni teretes glabri. Folia alterna breviter petiolo  
sa subsessilia margine parum ciliata <sup>longe</sup> crispata glaberrima  
vires. Stipulae parvae rectae apice fuscae. pedunculi foliorum  
parum breviores, & supremi conferti ut fere umbellati  
calycis glabri petala lineari lanceolata intus et margine  
parum villosa.



4 *Spina* ♂ pedunculis umbellatis, stipulis spinosis, foliis annuis ovatis emarginatis  
Lin. Spec. pl. pag. 720 +

Arbustula baculifera scandens spinosa, foliis basi pallidioribus.

Pluken. mant. 24. t. 330. fig. 3.

Habitat in India

folia interdum  
elliptica herb

Royen

Rami glabri ramuli pubescentes folia <sup>breve</sup> petiolata pollicaria  
consistentia arenaria, nervia, integerrima spinosa aculei  
recurvi gemini ad singulum folium. Pedunculus axillaris  
brevissimus, quadriflorus. Flores pedicellati. pedicelli filii  
formes pollicares uniflori. Calyx glaber. Germen ovatum  
acuminatum

stellatis glabris  
subumbellatis, foliis oblongis emarginatis, stipulis  
spinosis recurvis

5 <sup>ramis</sup> pubescens <sup>3</sup> <sup>4</sup> <sup>5</sup> <sup>6</sup> <sup>7</sup> <sup>8</sup> <sup>9</sup>  
C. foliis oblongis emarginatis subtus villosis axillis stipularibus umbellatis  
Verminalibus; stipulis pinnatis

Habitat in Cap. b. p. e.  
Fraxi densis, villosi. Folia petiolatis, aterna, pallidana, inter  
dum ovata oblonga supra glabra. axilli gemini pauci. Pedun-

ovata ve

culi terminalis s. vel 6 unguiculari. Calyx glaber. Petala  
ovata. Pedicellus fructus pedunculorum paucis longior fructus  
globosus, peso major.  
varia foliis glabris

restitutus  
ignom.

Capanni ~~estri~~ folia spinosa, floribus ad apices ramorum umbellatis, foliis  
ovato oblongis glabris coracis ~~la~~ mark Encyclop. Tom. 1. p. 2. pag.  
599.



decidua C. pedunculis lateralibus ternis unifloris, foliis oblongis biplobus  
spenis stipularibus, floribus octandris  
Sodada decidua Forst. descr. pag. 81.

Habitat in arabia 5

Frutex diffusus, ramis alternis remotis, teretibus, glabris.

Folia decidua raro profertia. Spinae duo parva scita flavescens  
Calycis foliola folioli lanceolatis inaequalibus glabris. Pedunculi  
unguiculares

6 *Spinepenta* C. foliis ovato lanceolatis glabris, ramis spinepenticibus, floribus  
racemosis

Habitat in India orientali Dahl.

Rami cinerei folia petiolata alterna bis-tripollicaria  
subcoriacea. Pedunculis terminalibus erectis filiformibus pollicia-  
ris. flores minuti.

~~est~~ huius generis fide Dr. Dahl huiusmodi habitus mihi  
videtur alienus.



*Enydra arpos* C. pedunculata solitaria uniflora, foliis ovatis obtusis, perianthio hexagono, stipulis simplicibus. Gest. Schrift. bot. Naturf. 9. p. 334. Tab. 9.  
Habitat in C. L. prae 4

Dahi C. foliis bipinnatis, pinnis axillaribus

Cappari Dahi pinnis axillaribus duabus brevibus oppositis, foliis  
bipinnatis: pinnis subtinuis: foliolis sub novemjugis ovali  
oblongis obtusis Forst. Ceylon. pag. 213

Habitat in Arabia  
an hucus genens?



exstipulata Q. exstipulata, foliis subpeltatis ovato cordatis crispis.  
Siculis Forst. Desf. pag 100.  
Habitat in Arabia

mibi ignota an varietas speciosa

11. *Sonchifolia* C. pedunculis subbifloris verticillis terminalibus, foliis lanceolato-ova-  
libus; fultus albedo-punctatis; filiqui verticillis linearibus *Sonchifolia* Sw.  
prodr. p. 31.

*Bryonia* R. Brown. Jam. 246.

Habitat in Jamaica



7 frondosa & pedunculis umbellatis, foliis pinnatis confertis. Jacq. pl. rar. 1674.

Jacqu. herb. 7. 104.

Habitat in America

Rami teretes, uti omnia, glabri. Folia petiolata alterna  
ultima sub se in apice saepe congesta 3-4. lamina ovata ellipti-  
ca basi parum <sup>constricta</sup> rotunda cum sinu brevi, apice acuta integer-  
rima venosa pinnatis. Pedunculi terminalis erectus  
squamis nonnullis remotis adpressis paucis, quadripollicari  
pedicelli in apice aggregati. Calycis parvi rotundati

Cappani americana arborescens laevifolia fructu subrotundo  
flore albo Plur. herb. Mus.

elliptici glabri

tomosa & pedunculis mult. flori, coma subrotunda densa 4aiqu.

Am. p. 160

Habitat in america n.

non vide



5. *Samanea*  $\odot$  pedunculis umbellatis, foliis periphericis - lanceolatis subtus serratis  
sive, floribus octandris Am. acad. 5. p. 3984  
*Cratogeomys*  $\odot$  foliis singularibus oblongis utraque acutis subtus  
quasi villosis, floribus octandris, racemis comosis alantibus Brown  
Jan. 247. V. 20. fig. 1.

Habitat in Jamaica &  
Rami teretes subpubescentes. Folia petiolata sive acuta  
angulata basi subrotundata supra glabra aerea subtus venosa villo  
sa tri- sive quadrifloriana. pedunculi axillares  
vel terminales cum ramulo ulterius extrescente de  
mum axillares folio brevioribus pedicelli umbellati ad  
29 angulati. Eructus subglobosus canescens vix  
magnitudine cerasi

12. *Cynophallophora* pedunculis multifloris terminalibus; foliis ovalibus obtusis perennantibus; glandulis axillaribus Lin. l. V

*Cappani* pedunculis multifloris; axillis glandulosis; foliis oblongis utrinque nitidis Jacq. hort. 158. t. 98.

*Cynophallophora* n. sp. penis caninis cariborum arbor, foliis subrotundis clavos pulpiferos phalloides pro fleguis gerens. Pluken. alm. 126  
t. 172. fig. 4.

*Cappani* <sup>subrotunda</sup> arborescens laevi foliis oblongis obtusis Brown. pom. 246  
t. 27. fig. 1.

*Cappani* arborescens, laevi foliis, fructu Congressu Plum. spec. 7. id  
73. fig. 1.

*Cappani* inermis, foliis ovalibus alternis perennantibus Hort.  
Bluff 2044

*Monsonia* flexuosa am. acad. 5 p. 3904

*Cappani* flexuosa Lin. l. V

Habitat in America &

Rami & caetera glabri, recti vel flexuosi angulato ad  
folium solum petiolata & hypoleucana confertentia  
senescente, sicut emarginata, glaberrima supra nitida



<sup>interdum compactus</sup>  
Pedunculus terminatus, pedicelli alterni rigida unguiculares glabri  
basi articulati. Calycis foliola subrotunda glabra. petala oblonga  
obtusissima filamentis brevioribus. Stylus et pedicellus germinis elon-  
gatus. germinis linearis semiunguiculares

13 pulcherrima C pedunculis rae emosis, foliis oblongis obtusis, fructibus baccatis  
Sis. Spec. pl. pag. 1674. Jacq. hist. Tab. 106  
Habitat in America 5



tenuifolia & rariis erecti simplicibus; foliis <sup>ovatis</sup> ~~obovatis~~ nitidis  
Jacq. Am. Tab. 105  
Habitat in America

remota & pedunculis racemosis, foliis ovatis acuminatis coriaceis  
Saepe  
Habitat in America

non vid.



19. *gracilis* C. corymbis terminalibus, foliis ovatis acutis glabris, fructu globoso luteo

Suppl. pag. 263. & J. V. pag. 400

Habitat in Ceylona &

Arbor magna ramis et foliis conis eillis vix oculo armato  
videndis foliis <sup>ramis</sup> ~~textis~~. Folia petiolata int. cymma obtu-  
sa vel obtusiuscula basi et apice angustiora, supra glabra  
venosa bi J. In polliciana. Pedunculus terminalis flexuosus  
flore primum corymbosi demum racemosi. Calyx pube-  
scent. germen ovatum acuminatum. Fructus majores  
globosi

Subrotundo ~~ovato~~ oblongo

Euphorbia C. pedunculis multi floris, foliis ovatis acuminatis nitidis  
baccis glabris & aequ  
Habitat in America

naudi



sericea *C. pedunculata* mult. flori foliis oblongis acutis nitidis, basi  
sericeis Jacq. herb.  
Habitat in America

non vidi

Jamaicensis P pedunculatus multiflorus, foliis oblongis emarginatis  
peltatis tomentosis, corollis erectis. Jacq. Flor. Amer.  
Habitat in America

non vidi



16 Breynia  $\odot$  pedunculis racemosis, foliis perspetentibus oblongis, calycibus pedunculatis  
que <sup>umbellatis</sup> tomentosis, floribus octandris Lin. S. V. Faicu hist. Tab 103.

Breynia elaeagni foliis Plum gen. 40. Breyn. ic. 13. c. fig.

Breynia affinis arbor octandra Loefl. it. 2074.

Habitat in America

fructus siliquosa sed rami ita elongata folia subtus  
squamis albidis <sup>in summo & antum</sup> non vero ferrugineis, folia obtusa. Pedunculi  
axillares. Pedicelli subumbellati uti pedunculi squamis aequi  
teis et ferrugineis secti. Calycis multo brevior acuti. Corolla  
non sed utraque villosa tomentosa.

10 Soliquosae Q pedunculis multifloris compressis, foliis persistenibus lanceolatis-oblongis  
acuminatis subtus punctatis Lin. Spec. pl. pag 721.

~~Planta forte Platanus~~ 7. 327 fig 6

Habitat in Jamaica &

Rami & venter superne angulati adpressi uti petioli et  
pedunculi punctis confertissimis purpurascenibus. Folii  
petiolo alterna integerrima utraque acuta  
juvenia, enerviay supra et nitida, subtus argentea  
sive ut in Elaeagnis adpressa saepe squamis minutis ferrugineis  
Pedunculi terminaliter, angulati multiflori. Calycis  
foliola ovata acuta utraque cum intus villosa extus  
uti petala externe squamis argenteis. Stamina cordata  
longiora. Germen lineare ferrugineo squamifera



10 *Congifolia* *C. pedunculata* foliis linear-lanceolatis, subtus  
laninosis-pandatis Sw. prodr. pag. 81.  
Planta foete Plukh. tab. 327. fig. 6.  
Habitat in Jamaica

Plukh. t. 327. fig. 6.  
non vidi

14 lineari  $\varnothing$  pedunculis subracemosis, foliis linearibus Lin. ~~Sp. pl. pag.~~  
1674 Jacq. herb. Tab. 102.

Habitat in America

Solia angusta 4-6 polliciana supra glabra subtus uti rami  
elongati argenteo purpureoque squamosa attenuata



Capparis

8-9 Saligna Capparis foliis linear-lanceolatis inferne dilatatis utrinque obtusis glabris;  
fructu tereti tonulofo.

In insula St Crucis legit Dr. West G.

Rami teretes, glabri, cortice cinerascens, flexuosi

Folia petiolata, alterna, <sup>linear-lanceolata</sup> tripolliciana, ~~superne~~ <sup>inferne</sup> semperquam lata, basi  
versus latiora, rarius undique ejusdem latitudinis, integerrima, mucronata  
basi rotundata vel subcordata, venosa, glabra.

Petiolus brevis. Glandula sope in axillis foliorum.

Peduncululi terminales, solitarii bi. In flori. Pedicelli unguiculares

Calycis foliola rotundata, coriacea.

Filamenta numerosa, longissima, capellana, glabra

germen lineare-oblongum truncatum.

Bractea 2-3 polliciana, glabra, crassitie petiolo cygneo, <sup>inter singula semina coarctata</sup> obtusa ~~truncata~~.

Semina 2-5. ~~Pedicelli~~ Pedicelli fructu longior

Semina 2. vel 5.

17. *Rafanata* C. pedunculis multifloris, foliis hastato-lanceolatis Gaeyh. herb. 23. 7. 1744.

Fig. 56. Lin. 1. V

Habitat in Armenia

non vidi



oblongifolia <sup>Q</sup> pedunculis racemosis, foliis ovalibus longis acuminatis  
Fosk. <sup>Fl. arab.</sup> p. 99.

non vid.

14 ~~anthracinum~~ <sup>methnatica</sup> C foliis ovato-lanceolatis attenuatis glabris

Capnari methnatica foliis alternis, pendulis. lineari lanceo-  
latis Torsh

Habitat in Arabia

— tota glabra foliis superioribus angustioribus, diores in specimen  
non adfuit



Cantoneasi Cap. foliis ovatis acuminatis rugosis, stipulis spinosis raris  
axillaribus terminalibusque Lourei fl. Cochia pag 331

Habita prope Cantonea proanum

Folia in ternis, flores albi. vagina ovata. corolla pentapetala.

Cal. 5 phyllis

non vidi

*Dactylis P. spica* ~~*Dactylis*~~ *terminali sine convexa infula illius plana*  
*facq. pl. rar. ii. Musc. austr. pag. 74*



falcata Cap. foliis ternatis ovato-lanceolatis falcatis, racemis terminali-  
bus laxis laxis fl. Coch. pag. 33.  
Habitat prope Cantorem finium h  
inermi. Folia glabra petiolata. Corolla 4petala. Bacca oblonga

non vid.

magna Cap. foliis ternatis lanceolatis, corymbis terminalibus. Lour. fl. Coch. pag

331.

Habitat in Cochinchina 5

arbor. Rami inermes. Folia glabra Cal. 4phyllus Cor. 4petala. Baccis  
subrotunda

non vidi



panicula ~~Poa~~ panicula ramis subternatis remotis ~~filiformibus~~, calycibus bifloris,  
vaginis punctatis pelosi ~~Pet. obj. 3. p. 11.~~  
Habitat in China