

# Caprana

1. bicolor C. foliis alternis, floribus geminis
2. verticillata C. foliis ternis petiolatis, floribus pedunculis verticillatis.
3. humilis C.
4. crustacea C. repens foliis <sup>3</sup> oppositis ovatis subpetiolatis <sup>2</sup> cauloque <sup>cruciat</sup> villosis  
integris foliis & capsulis oblongis
5. grapholoides C. ~~foliis~~ repens, foliis ovatis petiolatis oppositis serratis, capsulis  
globosis
6. lucida C. foliis oblongis acutis oppositis argute serratis lobatis,  
petiolis alatis, pedunculis trifloris
7. lanceolata C. foliis lineari lanceolatis integerrimis oppositis, racemis  
terminalibus ternis
8. undulata C. foliis ovato oblongis integerrimis undulatis oppositis super  
ius subcordatis verticillatis, racemis quatuorformibus

aquatica Caprana ped foliis cordatis sessilibus, pedunculis solitariis foliis longioribus

Ponobea aquatica Aubl. fl. Guian: pag. 659. Tab. 250.

Habitat in Guayana, Surinamo.

Planta glabra Caule <sup>basi repente</sup> procumbente, tetragono, articulado, ramosis;  
ramis alternis.

Folia sessilia, opposita, <sup>co</sup> ~~co~~ <sup>heteris</sup> ~~co~~ <sup>subdentata,</sup> ~~co~~ <sup>undulata,</sup> ~~co~~ <sup>obtusis,</sup> ~~co~~ <sup>nervosa.</sup>

Pedunculi axillares, capitulares, foliis duplo longioribus, axi flori

Calyx quinquefidus: laciniis lanceolatis.

Capitula magnitudine seminis Conandri. Valvula capitularum bi

partita et in Capraria

ata

humilis Capraea pubescens, Capraea foliis oppositis ternisve ovatis serratis petiolatis,  
pedunculis axillaribus petiolo brevioribus Hort. Kew. v. p. 354.

Habitat in India Orientali König

Caulis <sup>herb.</sup> pubescens, decumbens, ramosus, pro subpithameus.

Folia subpithalata, semiuque ulana, ovata, in petiolum longitudine  
folii septemtia argute serrata,  basi integerrima.

Petioli longitudine folii, in folio dilatato

Pedunculi axillares, solitarii, brevi oppositi, brevi sumi.

Calycis laciniis subulato, capitulo duplo longior.

Capitula globosa, magnitudine seminis Conandri.

multifida Capronia

Habitat in Carolina Richard.

habes

*Lesfuta Capraria*

Habitat in Q. b. p. herb. Thaurini

Caulis teres, et tota planta pilosus. Solia subpetiolata, oblonga, utrinque acuta  
semi-pollicaria, opposita, extrorsum remote serrata. Pediculi axillares, solitarii  
uniflori, folio longiores. Calycis laciniis subulata

pubescens Caproni

Habitat St. Martha herb. Michxlii

Caulis, folia & costa marginis, uti et peduncululi pubescentes. Folia  
sessilia, pollinosa, lanceolata, basi attenuata, acuta, ex tropico  
ferruginea, nervi alterni, remoti. Peduncululi axillares, geminati,  
foliis breviores.

multifida Caproni

Habitat Fleonae juxta rivulos herb. Desfont. O

Caulis erectus, palmari, ramosus, pubescenti viscosus, uti tota planta: Rami  
simulicis, patentes. Folia petiolata, semipollicaria, pennatifida, opposita. Pa-  
dunculi axillares, solitarii, uniflori, folio duplo brevioris. Calyx squarrosus  
lobis: laciniis subulatis, superiores recurvatis. Corolla tubus brevis, colloca-  
tionem tubo: limbus squarrosus, irregularis: laciniis obtusis, superioribus labio inflexo  
bifido, inferioribus trifido. Filamenta 2 dynamica. Stylus brevis. Stigmata  
in laminata. Capsula bitubulari, polysperma Mutau



ovata Caprona

Habitat in Penn herb. huj.

Caulis erectus, acute tetragonus, glaber. Folia petiolata, vix pollicaria, ovata, glabra  
venosa, supra lineata, acuta, inaequaliter obtuse serrata. Pedunculi superne axilla  
res, solitarii: pedicelli umbellati capillares 1-2. flori, quinque. Calycis foliola lan  
ciolata, acuta, adpressae squamis nonnullis. Corolla unguiculata. Stylus longus, per  
sistens

biflora & foliis alternis, floribus geminis Lin. l. v. Gaertn. hist. t. 115:

gratiola affinis frutescens americana foliis cuneatis s. venosis serratis  
majoris Commel. bot. 1. p. 29. t. 40.

Lysimachia peruviana affinis americana procumbens, monochloris  
frutescens foliis singulis glabris Planch. 237. t. 70. fig. 4.

Capriana curasavica Herm. p. 110. t. 110.

Habitat in Curasavica, provincia ~~Carabobo~~ t. 5

Caulis herbaceus basi lignosus, pedalis vel tripedalis erectus, teres  
glaber foliis ramosis, folia cuneata lanicolata basi attenuata  
in sessilia sparsa glabra, inaequaliter serrato-dentata vix  
pollucana margine ~~ciliato~~ <sup>pub</sup> pubescentia. Ped. uniuersim atilla  
res gemini uniflori folio brevior. Olos albi. Taux corolla  
setis albi.

Descriptio partium fructific. v. in obs. no. 144



humilis P. foliis oppositis ovatis serratis, capsulis <sup>in</sup> globosis, caulis <sup>in</sup> de  
cumbentibus pubescentibus

Habitat in India orientali X O

Caulis herbaceus, ramosus rami oppositi, uti caulis pubescentes.

Folia petiolata angusta serrata. ut unguiculati basi perum attenuata  
et apice nervos, arenis, laeviter vix pubescentia. Flores axillares  
vel solitarii brevissime pedunculati. Calycis 5 foliola subula-  
ta angustissima capsula longior. Capsula magnitudine fonsae  
Bonardii

Capriana humilis pubescens foliis oppositis ternisve serratis  
petiolatis, pedunculis axillaribus petiolo brevioribus

Hort. Bot. 2. pag. 354

*Eriophaea* *Q. repens*, foliis oppositis ovatis subpetiolatis crenatis Lin. Mant  
p. 7. 4. l. v. p. 5. 67. Burm. ind. 133

*Paranastium* Rumph. amb. 5 p. 49. t. 170. fig. 3

Habitat in Amboina, China. <sup>Java</sup>

Caulis vellosus subtomentosus bifolius, filiformis. Folia petio-  
lata ovata <sup>hinc inde pubescentia</sup> ~~semper~~ <sup>subpetiolatis</sup> crenata remota. Peduncululi axilla-  
res pubescentes uniflori foliis longiores

vellosus caespitibus oblongis

aa Undernea

int. agn. folia. Lin. ? Folia lanceiformibus puberulis omnino petiolatis. Capsulis  
lineariibus axillaribus sessilibus

Habitat

Caulis decumbens ramosis subpubescenti. Folia opposita  
petiolata fernyrolliana, integerrima vel tubi renata  
vix pilosa. Calycis foliola linearia unguiculata pilosa. Capsu  
la calycis parum brevior glabra bivulva polysperma

an hucusque generis

Caprina

Caprina lanceolata, foliis lanceolatis serratis extrorsum serratis, pedunculis <sup>sub</sup> multifloris.

Habitat ad St Mattham von Rohr.

Caulis herbaceus, erectus, inferne teres, superne angulatus, ~~pubes~~  
ad sparsus pilis brevibus inferne rarioribus, superne frequentio-  
ribus

Folia alterna, frequentia, bi- sive tripollicaria, patentia, lanceo-  
lata, basi in petiolum attenuata, acuta, utrinque glabra,  
opae lentis margine ciliata, ab apice versus medium serra-  
ta, dein integerrima.

Pedunculi axillares vel terminales saepe lonum, vix unguicula-  
res, pubescentes, unis, bi, tri vel quadriflori; pedicelli alter-  
ni, approximati, brevissimi. Bractea linear-lanceola-  
ta, pedicello parum longior, ad basin singuli pedicelli.

Calyx persistens, quinque partitus: laciniis subulatis.

Corolla calyce longior, <sup>4</sup> laciniis quinque, linear-oblongis v. 212

# fundo villoso:

Stamina quatuor, duo breviora.

Stylus longitudine corollae, persistens. Stigma capitatum.

Capsula oblonga, calyce parum longior, bivalvia, bivalvis, tripartibilis.

Semina copiosa, minutissima; receptaculo lineari, libero affixa



gratioloides C. foliis petiolatis ovatis oppositis serratis glabris, pedunculis foli-  
tanis unifloris caule repente capsulis globosis  
Habitat in India orientali

Caulis herbaceus repens filiformis tetragonus ad centem usque  
villosus. Colea femineis qui ulnariis aucta serrata bapn  
ad centem villosa versus integerrima. Pedunculi oppositi longitudine  
foliorum. Calycis spatiosi longitudine capsula globosa

Sub nomine Columnea repentis mis. de Honig. nil vers  
cum Columnea commune habet forte cum capriana cru  
staera, cui satis similis, ad Lederneam amandanda  
unt

uniflora C. foliis oppositi cordati, floribus solitariis Burm. ind. tab. 14

~~fig. 7~~ pag. 133

Habitat in Java

mibi ignota

Lucida Capraria foliis oppositis oblongis acutis argute serrulatis coriatis;  
petioli alati, pedunculis trifloris Hort. kew. v. pag. 383  
Habitat ad Cap. b. p. c.

non vidi

lanicolata & foliis oppositis linearibus - lanicolatis integerrimis, racemis compositis terminalibus Hort. kew 2 p. 554

C. lanicolata foliis oppositis lanicolatis, composito terminali composito  
Lin. Suppl. p. 204. f. v. pag. 567.

Habitat in Cap. & f. p. i. 5

non vidi

undulata & foliis oppositis ovato-oblongis integerrimis undulatis: supremis  
subcordatis verticillatis, racemis pinniformibus Hort. kew. 2. p. 354

Capraea undulata foliis alternis ovatis undulatis, racemis secundis  
Lia Suppl. pag. 562 P4. RV. 567. L'Herit. bot. Angl. 1. 25.

Habitat in Cap. b. freit

~~Frutex ruga Prami teretes & lineis geminis tenuibus a basi petiolorum. densis  
ventibus. Folia sparsa breviter petiolata ovata, rigida~~

~~nervosa acuta pinnata vix unguiculata, fraxinea~~

~~Racemi ad apicem ramorum alterni approximati bypol~~

~~foto. Descriptio Lincari. floes nutantes bractea oblonga, longitudine pedicelli~~

~~retinet at laciniis calycis ovato acuto~~

~~Manuleam~~

~~Dubito valde num mea Lincari vel si Capraea species~~

~~amem quam vis asperit de Bahl. reced. Lincari enim omnino~~

~~a differentia in Hort. kew. nec laciniem habet Capra~~

~~ea. Flores dependunt in specimenne Adoyne vel certi futurum~~

~~valeo~~

C. und. foliis sparsis inaequaliter approximatis ovatis integris subundulatis.  
racemoterminatis subsimplicibus L'Herit

non vid.