

Pongora

aculeata

rami teretes glabri. Folia impari pinnata 3-4 puga. Foliole
oblonga, mucronat, glabra, alterna Stipula parva setosis

Aetaea (Robenia) Canyana pedunculis simplicibus, foliis quaternatis sessilibus linearibus

Habitat in Sibiria Herb. Mus.

an eadem cum pygmaea? glabra, cortice inequali. Spino terne patentissimo, unguiculaver lateralium minorer. Foliola semipolluciana, linearia, ^{extremum papum dilatata, ut pinguacuta} angusta, mucrone terminata. Pedunculi axillares, foliis breviores. Calycis glabri, ~~colorati~~, lobes, ore villosi; dentibus subtilati

Specimen Rob. pygmaea a Demidoffio Musi: cum hoc musum gaudet foliis
Cuplo minoribus, absque mucrone pungente

7 Robinia R. ^{subtrigynis} edunculis simplicibus, foliis abrupte pinnatis, ^{folioli lanceolatis} stipulis petiolisque
acutis ^{sub} pinnatis Lin. Mant. 269. N. p. 668

Robinia pinnatifida Lamour. in Act. Petr. 1770. p. 558. V. 30. fig. 4.
Habitat in Libani montibus are nosi sic affinis ?

Frutex ultra humano altitudinis ramis cortice purpureo rasente
et lineis a basi stipularum decurrentibus sulcato-angulatis.

Petioles ~~simpliciter~~ ^{sempiter} pinnatis pinnatis pollicares uneresi aque
purpureo-rasentes. Foliola ⁶⁻⁸ 4 opposita lance basi versus parum
angustata, glabra, opposita subsessilia pollicaria, mucrona
rigido terminata. Petiolus in pinnam depressus. Stipula lanceo-
lata medio linea elevata, rigida, spinosa. pedunculis axillares
breves uniflori. Calyx tubulosus. Legumina cylindrica

^{septa} Robinia flora Pall. fl. Ross. Tab. 44. Desc. 1. p. 1667

ferox. ramuli pinnatis foliis angulatis folia 4. 5. pinnis
ad latur: foliola lancea basi versus sensim angustata, mucronata
hab. Russ.

Chamaejasme ^{unifloris} *pedunculis* ^{similibus} *subsolitariis*, foliis abrupte pinnatis
bis ^{foliis} ^{angulatis} *trijugis*, petalis *stipulisque* *spinescentibus*. *Herb. Prop. n. p. 161.*

Tab. 177:

Habitat in China;

Rami *superne angulati*, cortice *purpurascente*. Petali ^{senescentes} *perpetua*
terf spinosi rigidi purpurascetes. *foliola* *calcolato cuneata*
nucronata glabra exteriora duo majora unguiculana opposita
lesilia. Petalus *in setam rigidam depresso*. *Stipula* *subula*
to erecto rigida spinosa linea utraque per rami de
currentes. *Pedunculus* *axillaris solitarius, uniflorus filiformis*
sesqui-pollicaris superne articulato sub flore craspor.
Calyx *cylindricus subulo tubuloso, ventricosis glaber*

11 pygmaea R. pedunculis simplicibus, pet foliis subquaternatis. foliis lineari
hipidula.

Apalathus frutescens minor angustifolius, Cortice auro. Amm.
nith: 282. 435.

Robinea pygmaea pedunculis simplicissimis, foliis quaternatis
sesquipedibus. Lin. Spec. pl. pag. 1044. Pall. fl. Ross. tab. 45.
Desf. 1. pag. 168. *

Habitat in Libani

Ramuli grisei, gemmis creberrimis bipinnosis. Spinae exiles
aciculares in senescentibus ramis de cibus. foliola saepe sena
in frontanea, subsessilulata. Pedunculi solitarii articu-
culati. Calyx subpeloso campanulatus. Legumina vix
compressifolia nigra, mucronata.

10 frutescens R. pedunculis simplicibus; foliis quaternatis subpetiolatis
petioli stipulisque praesentibus folioli cuneati
Appalachi frutescens latifolius, cortice aureo Am m. Pauth p 166

n. 283.

Robinia pedunculis frutescens pedunculis simplicibus; foliis quater
natis subpetiolatis, terminatis spina inermi Lin. Spei. pl.
pag 10444 Fl. Ross: Tab. 43. Desf. pag 164

Habitat in Siberia 51

Rami teretes, purpurei, juniores se lineis decurrentibus subaequali
si cinerei. folia e gemmis 2-3. breviter petiola. foliola quatuor
approximata sessilia ut seminaqueiculana glabra, obtusa, micro
nata - duo parva minima. Petiolus seta brevi rigida terminatus. stipula
minuta. Pedunculi 1-2-3. supeme articulati uniflori. Calyx
glaber campanulatus legumena cylindrica griseo testacea
Cotyled. 2

a Solandro et Banksio pro varietate culta pygmaei habitum.
Pallasius vero qui ~~ant~~ ^{non} speciem tam cultam quam spontaneam
vidit distinguitur, retinetis igitur usque dum observationes alio has
duas conjungere praesent

Memula articulata

culta

q Halodendron R. racemi axillaribus trifloris, petalis persistentibus, foliis ternatis petiolatis: folioli cuneiformibus spinosis cuspidatis hinc duplo
pag. 666 330. L. V. p. 666.

Robinia halodendron Pall. t. vol. 2. p. 741. Y. W. fl. ros. f. Tab. 46 deto.
i. p. 170

Habitat ad Salsuginosa ad Fortm conuolte

Rami glabri teretes cortice cinereo purpurascetes, juniores tomentosi
fo. hinc. folia ^{pinnata} petiolata uni f. bipinna: foliola petiolata
interdum tripinna ^{utrinque} opposita, polliciana basi attenuata obtusa, mucrone rigido
terminata pinnata. Petiolus semiquadratus vel parum lon-
gior in spinam deflexus. Ramuli folia et pedunculi et axillis
spinosum. Spina e petiolis persistentibus rigida canescenti
purpurea. Pedunculi solitarii pollicares apice bif. 3 flori
pedicelli semiquadratis. Calyx campanulatus
sequens breviter inflato ventricosa dura
hal: Rob pedunculis subtis floribus, petalis persistentibus di. f. tetraphyllis
folioli cuneiformibus spinosis mucronatis.

4. *Paragane* R. pedunculis simplicibus, foliis abrupte pinnatis, petiolis inermi-
bus. Lin. Spec: pl. p. 10.44. foliolois oblongis

Appalathus arborescens, pinnis foliorum crebrioribus oblongis
Ann. neth. 205.

Althayansa fl. Rosl. 60. t. 42. Desf. r. 1. p. 161. *

Habitat in Libia

- 5-6

Rami cinerei glabri. Folia 4 juga: foliola oblonga mucronata
subtus pallidiora vellis nonnullis adspersa, unguis ulana pube
qualia. Petiolus filiformis pubescens pedicula terminatus. Stipula
rim apertae spinescentes. Pedunculi cincti per gemmae prodeunti
anni cum foliis, pube fientes, sesqui pollicares ad medio articulo
si. Calyx campanulatus glaber.

6. nervosa R. pedunculis simplicibus, foliis abrupte pinnatis, folioli obcordatis
nervosis glabris, stipulis pinnis stipularibus patentibus
Robinia caragana Albazano sancta Pall. fl. Ross: descr. 1. pag

164.
Habitat in Siberia Pallast

Rami teretes glabri grisei. folia 3-7 juga. foliola seminauculata
apice subretusa immo rigido mucronata, e pili ad prespi vix nisi
oculo armato videntur pallida, subaequalia opposita, utroque con
coloro, nervosa. Petiolus seta rigida terminata. Spino gemine
ad fragulam gemmam patentem purpurascens, seminauculata
pedunculi axillares gemma patenti anni plenum gemmi vel solitari
articulati pubescentes. Calyx subtubulosus pilis raris et
suis ore villosus s. dentatus

omnino uti speciei distinguere me pudice