

Parex

cernuo C

michi ignota

bifurca Q

michi ignote

torfaceo G

michi ignot

panicea C. spicis pedunculatis erectis remotis. foemineis lineariibus, capsulis
obtusiusculis inflatis lin. 1. V. 8. L. Dan. tab. 261. Leers fl. herb. 172. tab
15 fig. 5.

Cyperoides foliis canophyllois spicis e ranoibus et dumedionibus repis
Compositis micr. gen. 61. tab. 32. fig. 11. Pl. h. n. phyt. t. 91. fig. 7.

Carex spica mare una plantagine, femineis pedicellatis erectis, capsulis
raris maximis ovato. Iniquetis bidentatis Hall. herb. 1405

Habitat in Europa uliginosis. 4

est Carex pro
est La Mant
herb. Ven.
Culmi struthamoi vel pedales erecti inferne foliosi, teri usculi, glabri. Folia
lata uscula, subtus glauco viridia culmo breviora margine et canna
retrosum scabra. Spica mascula terminalis in glandibus rollianis
squamis oblongis obtusis, fuscis margine albis o membranaceis
foemineis solitariis vel geminis remotis teretibus bracteis spicula
perum longior. Squamis ovatis acutis dorso linea rudi capsulis brevioris
Capsula paucis, inflato subglobofo mucrone brevi
interdum pedunculus ex infimis foliis capillari Culmo panum
breviore flombus inferioribus remotioribus, interdum spica foemineis
superioribus androgyna

vagina infima submediata, superioribus subaequantibus.
spicis erectis remotis, capsulis inflatis obtusiusculis distan
tibur Gooden in A. soc. lin. 2. p. 179.

Depauperata *C. vagans* plarquam dimidiatis, spicis foemineis remotis paucifloris, capsulis ovatis inflatis rostrato-acuminatis Godden in Aust. bot. Soc. p. 101. 4

Cyperoides sylvatica angustifolium caule terlatere, spicis parvis capsulis variis dispropti obesi Michx. gen. p. 56. t. 32. fig. 5.

Carex ventricosa fl. Lond.

Habitat in sylvaticis 4

Radix fibrosa. folia radicalia ad basin nuda, Culmo brevis
ra. Culmus erectus, sive bipedalis obtuse triquetris. pinn
mascula linearis, squamis ovato-oblongis acutiusculis flavis

Cyperoides repens siccitibus dorso vandi. spicis foemineis remotis, longe
pedunculatis, erectis paucifloris, flores 3-6. florea laxe
dispropti. squamis ut in mare, mucronate capsula
fere dimidiis brevioribus. folium vaginans ad speculam
foliolum vaginale culmo sive altior. Capsula oblongo
-ovata subtriquetra erecta, acumine indiviso.

Cyperoides repens siccitibus dorso vandi. spicis foemineis remotis, longe
pedunculatis, erectis paucifloris, flores 3-6. florea laxe
dispropti. squamis ut in mare, mucronate capsula
fere dimidiis brevioribus. folium vaginans ad speculam
foliolum vaginale culmo sive altior. Capsula oblongo
-ovata subtriquetra erecta, acumine indiviso.

Carex michx. spica mascula obovata, femineis pedunculatis
altissimis quamvis anostatis, culmo presente prostrato Host. Synop.
pl. Austr. pag 307
michi cynost

Inflora Carex spica sicuti distincti erecti, macula unico foemi
neo remotis in flori, capite ovato ventricosi bifido Willd.
phyt. pag 2. tab. 1 fig 2.

Habitat in oriente?

Solum glabra, floralis spica Conzou

michi ignota

Diffrans C. spicis remotissimis subsessilibus, bractea vaginali, capsulis angulatis
micronatis Lin. Spec. pl. pag. 1307 + Fl. Dan. tab. 170 1049.

gramen cyperoides palustre, spicis tribus subrotundis vix aculeatis,
fratris diffrantibus Monf. l. 3. p. 343. f. 10. t. 12. fig. 10

Carex spicis parvis longis diffrantibus Leuch. ag. 431

Carex spicis brevissimi petiolatis diffratis Hall. bot. 1482.

Habitat in Europa australi in paludibus 4

inferior pedum ^{rudis} fibrosa. Culmus erectus acute triquetus
culo parum brevior foliolis sive pedalis et ultra. Folia pallide viridia margine
vixum picula carinaque scabra culmo sive breviora. Spica masculi
2-3plo longior ea lineares vel subulatata obtusa interdum pollicis
Capsula ovata ^{acuminata} nervis squamis oblongis obtusi ferruginei margine albis
vixis foeminea 1-2-3. oblonga exserta breviter pedunculata
valde remota squama ovata acuta fissis carina
to foliolum vaginans ad singulam piculam squama 12

Diffrans squama infima fere dimidiata: superioribus subquadratis
spicis oblongis remotissimis, capsulis acutis Goden. in A. f. Lin. 2.
p. 170.

~~aliter Syn. Monf. a Lin. affertur~~

fusca Carex spicis terribus pedunculatis erectis distantibus
Capsulis oblongo subrotundis obtusis glabris

Habitat in Europa australi. ♂

Culmo subtriquetro spica teribus macula terminalis
lineari pollicari. 2. fovea apice mascula fusca
vix pollicari femina quadrifariam imbricata. Squama
ovata acuminata capsula longiora in spica macula
lineari oblongo obtusa bractea sub spica filiformi
culmo altior

non ed. stantem

Cure

[Faint, illegible handwritten text, likely bleed-through from the reverse side of the page]

[Faint handwritten text at the bottom of the page]

brachyflachys C. spica terminali mascula, media androgyna super
ne mascula, inferioribus foemineis sterilibus, capsulis ovato
• Iniquetis Hall. bot. fr. no 1307

Carex obovata All. fl. Pedem. no 2330

Cyperoides alpinum humilium, spicae spadiceae virentibus
brevioribus et crispioribus Schenck. Agr. p. 420.

Habitat in montosis Helvetiae.

mibi ignota

argentea C. spicis teretibus laxis acutioribus glumis bracteae
nerviis latiore acutis foliis erectis Hall. bot. fr. p.
gramen sylvaticum angustifolium, spica alba Bauh. pin. 4. prodr. p. 22.

Scheuchz. agrop. 4. 10. fig. 3-5

alba C. spicis pedunculatis erectis albidis, feminea supra marem elata
capsulis coribus, culmo tereti nudo Scop. Carn. 2. p. 216. Fairqu. coll.
Ton. p. 81. All. flor. ped. 2. p. 269

Carex spicis foemineis raris, petiolatis teretibus, acutis marem
opacantibus Hall. bot. fr. no 1377

Habitat in montanis sylvaticis austriis, Styria. 3
Gramen cyperoides exiguum, femineis bullatis Pluk
p. 120. tab. 91. fig. 2 fig. male
Franos La marck

argentea Villars herb. Vent

non vidi

nemorensis C. spica mascula obtusa, foemineis erectis tenuis pmi
latis glumis alteris remotis Hall-herb. p. no 1379

~~Cyperoides sylvaticum, angustifolium, caule terlatro, spica parvis, cippi
li rarius oppositi obesi, in angustis collum ut una parte ob altera
vero magis bifidam coarctatis Michel. gen. p. 50. tab. 32. fig. 5~~

~~Carex pilosa culmo Inquetro spica erectis remotis foemineis linea
ribus, folio proprio longioribus Scop. fl. Carniol. no 1162.~~

~~Carex pilosa Allioni fl. pedem.~~

~~Carex michelii spica mascula obovata, foemineis ^{pub} pedunculatis aeternis
glumis anatis, culmo senescenti prostrato Host Synops. plant
austri. pag 597.~~

Habita in collebus, pratensibus, montanis sylvaticis

Cyperoides latifolium, hirsutum, spica tenuis pmi Schenckia Agrost
p. 412

sermo

*Q. spicis foemineis longe pedunculatis erectis: semotis squamis
retusis mucronatis* Host Synops fl. Aust pag. 509

Haller hist. stirp. no 1387

Habitat in alpebus austriacis

Schemka. 10 fig. 11. *Facund.* Haller affinis *caespitosa*

nisi ignota

Michxlii ~~Et spica macula obovata, femineis subpedunculatis alter
nis: glumis aristatis, culmo senescente prostrato Host. Synop. plant
Austr. p. 507~~

~~Peperoides sylvanum, angustifolium, caule teretibus, spicis parvis
capsulis la~~

Scheuchzeri C. culmo folioso, foliis retrosum hispido, spicis gracilibus
foemineis minoribus ~~et~~

Scheuchz. agra. p. 413. t. 10. fig. 6.

Hall

~~Carex~~ spicis femineis geminis longe pedunculatis remotis
capsulis longe rostratis bifidis Hall. hist. stirp. no 1389
et Carex 1390.

Habitat in Helvetia

4409. ad Parnem saxatilem refert Hall. et spicis foemi
nea in illa fo. filis

michi ignota

pendula C. vaginis longis subaequantibus, spicis cylindricis longis
pendulis, capsulis confertis seminis orbatis acutis Gooden in A. f. lin.
2. p. 160. &
gramen cyperoides spica pendula longiore Monf. hist. B. p. 242.
f. D. T. 12. fig. 4. flor. h.

se-hond.

Et habitat in sylvis et segetibus frequentius 2

pulla *C. dygna*, fructu ovato, inferiori pedunculata, capsula
ovato mucronata, mucrone bifido Gooden. Gen. Transact
V. 3. p. 70. tab. 4
Habitat in montibus scoticis 2

non videtur an varietas globulifera

varna C. ~~Spica conferti erecti subpedunculato (ramis), capsulis
ovato-triquetris Hall. hist. prop. no 1301
Gramen canyophyllo foliis, spica divulsa Baud. theat. 46
Cyperoides alpinum canyophyllo foliis, spica tenuibus, a foliis
resistentibus Schreb. p. 433
Habitat in helvetia~~

videtur esse procerum

Japonica & spicis monociis pedunculatis erectis; foemineis pedunculatis
ovatis: masculo terminali lineari Thunb. fl. jap. p. 304. l. V. p.

845

Habitat in Japonia herb. Royen.

Culmus foliosus, trigonus, erectus, debilis, glaber, striatulus. Folia al-
terna, vaginantis, glabra, erecta, superiora culmum superantia, in-
feriora culmo breviora. Spica monociis, foemineis duo vel tres, peduncu-
latis, erectis, ovatis, bracteatis, masculo terminali lineari, longior
differt a C. Lemna cui affinis spicis erectis, glumis viridibus ma-
gisque acutis Thunb.

Culmus acute triquetrus, bipedalis inferne foliosus. Folia glabra
linearia, angusta. Spica foemina unica, pedunculata, facie
C. sesuviano, pollicari crasso. Bractea ovata, antea terminata
semina ovata, acuta, bractea longiora. Spica mascula solitaria
cylindrica. Squama lineares, foemineae.

colliculata & spica terminalibus pedunculatis: mascula foemineoque, capsulis
subulatis longitudine spicae Lin. Spic: pl. pag. 1307
Gramen cyperoides marianum, tamansia belgarum penicarpis ad in-
ter vallum calami glomeratis Pluk. mant. 9 b. t. 419. fig. 1.

Habitat in Canada

Culmus & noster bipedalis, vestitus foliis angustioribus. Spica termi-
nalis mascula, oblonga, pedunculata. In eadem alia spica foemi-
nea ex capsulis & o. conico-subulatis, longitudine ipsius spicae, in
fundo semine foetis, patulis. Lin.

pro folia culmo altiora uti et vagina foliaceo
spiculo tres ovata alternis, pedunculi vaginis lon-
gior panna distantes. Capsula ovata attenuata
multo ^{toriato} majores quam in reliquis ^{specie} bifida unguin-
tosa. Squamae ovatae attenuatae

hallexens & spicis pendulis: naspula erecta foemineis oblongis ^{ovatis} ~~obtusis~~ im
 breatis: capsulis confertis obtusis in Fl. v. 852 & L. V. herb. fl. 47-72. 15
 43-4
Cyperoides polytachyon flavicans, spicis brevibus prope summitatem caulis
 Monf. herb. 3. 247. J. O. t. 12. fig. 16. Pluk. alm. 170. t. 34. fig. 5. Michx
 gener. 61. t. 39. fig. 13.

Cyperoides non
aculeatum capi
tulo brevior
Tournef. J. r.
h.
herb. Tournef.
remota

Carex spicis foemineis pendulis, capsulis ovato-conicis Hall. herb. 1393.
 Habitat in Europa paludibus

Pedalis culmo In quatuor debili basi folioso, glabro uti tota plan
^{interdum 3 inferior}
^{reliq} ^{2 3}
 folia plana. Spico quatuor ad apicem folium inferius
 florale. Culmum ad squante. Naspula foemineis erecta
 foemineis primum erect. demum nutante oblongo sermo
 quiculares viridi-flavescente. Pedunculi breves capillares
 Squama ovata acuminate. Capsula subrotunda inflata

Floa Dan. 1050

C. vagans abbreviatissimi, spicis foemineis subglandosis
 fructiferis pendulis, capsulis oblongis obtusis Good. in Act
 sci. An. 2. p. 106

Spadicica *Spica* *mascula* ovata obtusa: foemineis minoribus paucis flo-
ris, ^{inferior} ~~suprema~~ ^{pedunculato} ~~approximata~~ minima ^{sepi} ~~sepi~~ ~~reliqua~~ ~~at illanibus~~
capsulis bifidis Hall. bot. N. no 1300
Cyperoides alpinum angustifolium *Spica* *laxa* *Spadicica* *viridi*
bis Schenck. *Agg.* p. 416
Habitat in montibus *Valepari*.

Carex *fragosa* *Allion.* *flor.* *Padem.* no 2331

Folia *canophylla* *rigidiuscula* *frequentia*: *ad* *basis* *culmi*
recurva *longitudine* *digiti* *minimi*. *Culmus* *palmaris*
Spica *mascula* *solitaria* *squama* *oblonga* *obtusiuscula* *fusca*
marginis *albidis*. *Foemineae* *duae* *suprema* ^{sepi} *prope* *masculam*
inferior *pedunculata* *pedunculo* *vaginato*. *Squama* *ovata*
canesolata *fuso* *carina* *viridi*.

Cimosa \varnothing spicis ovatis pendulis: mascula longiore erectiore, radice repente
Cl. Dan. Tab. 646

Gramen cyperoides spica pendula minus Bauh. pin. 85
Cyperoides spicata pendula brevior: squamis a prodiectis: fusione
tillante viridibus Scheuch. gram. 443. t. 10. fig. 13.

Carex spicis femininis pendulis, capsulis ovatis compressis Hall.

hist. 1392.
Carex elegans spicis pendulis, mascula erecta linearis; Lemnibus geminatis pendu-
lis, capsulis distinctis acuminatis, squama minoribus Willd. fl. Berol. 104. t. 1. fig. 4

Habitat in Europa frigida paludibus sylvaticis &

Radix tomento ^{sa} Culmi pedales triquetri basi foliosi glabri, basi ^{folia} complicata, ^{radix} superne plana
margini deorsum striatissima spica plerumque ternis ^{radix} distans gemmas
402 infima remotissima. mascula terminalis tres erecta pallide
viridinea femineae inferiores distincte penduli. pedunculis capillari-
bus foliolo sub inferiore subulato Culmum fere equante reliqui
breviores. Squama masculorum lanceolata acuminata, foemineorum
fusca nigrescentia infimo lanceolata superior ovata acuminata
fusco nigrescentia infimo lanceolata superior ovata acuminata

semine altero latere ^{convexa} carinata semine longiore, Capsula triquetra glauca, glabra
convexa ^{superculo} altero plana ^{varietatem in alpidibus legi. spicis paucifloris squamis masculorum}
obovato, foemineis obtusis. alicam spica foemineae ^{supremo}
addo Willdenow ^{legura} Cerpsi minime Cimosa ^{apice} masculi

cemosa *P. vaginis abbrevatissimis subnullis, spicis foemineis ovatis pendulis.*
capsulis ovatis compressis, radice repente Good. in A. J. L. 2. p. 1807

atrata & spicis androgynis terminalibus pedunculatis: floreatibus erectis; fructi-
fens pendulis Lin. l. v. fl. Dan. Tab. 150

Gramen alpinum pulchrum, foliis caryophyllois, spicis atris et tu-
mentibus Scheuchz. Agrost. 481. Tab. 11. fig. 1. 2.

Carex spicis ovatis petiolatis congestis, senescentibus pendulis Hall. hist.

Carex ¹⁷⁶⁹ ~~negra~~ all. fl. Pap. e mont. no. 2310

Habitat in Alpibus Europae.

gramen sesqui pedale interdum vix spithameum Culmo basi ^{inquetis} vix
foliis. Tolia plana teretia, margine vix si abra, atrata, vaginis radi-
calibus femineis spicis. Spica versus apicem tres vel quatuor oblon-
go & vix primam compactioris erecti, demum ^{inquetis} penduli originantes, ungui-
culari. pedunculi capillares longitudine spicarum foliolium sub
infera longitudine sive culmi, ovata ^{inquetis} aut subulata longitudine
pedunculorum sub reliquis. Flores masculi plerumque inferiores
in spica terminali reliqui foeminei. Squama ovata cancellata
femina ovata acuminata, mucrone bifido, glabra

vaginae subnulli spicis omnibus androgynis terminalibus peduncu-
all. all. latis: fructifens pendulis, capsulis ovatis acutiusculi Good.
in act. soc: Lin. 2. 1. 109

Fraxda

A. spicispedunculatis: Verminali androgynae superne mascula
foemineis difertis, capsulis longe mucronatis Allioni

Hall. hist. fl. no 1391

Carex helvetica Honkeny Synops. no 286

Islander

non in

oblonga C. specis oblongis: macula terminali sespli; androgynis
foemineaeque pedunculatis erectis fl. tub. p. 286.

michi quata

inopialū C. spica mascula sessili, androgyna media inferne mapulo
erecta foemineaque subnutante pedunculatis fl. Tubing. p. 289

nihil ignota

capillaris & spicis pendulis: mascula erecta, foemineis oblongis distinctis, cap
sulis nudis acuminatis H. Su. 851. * Cl. Dan. t. 160
Pyreoides alpinum spicis feminiferis pendulis: pinis in summo caule
Segu. veron. 3. p. 83. t. 3. fig. 1.

Habitat in Europa boreali praevalens humidis
gramen saepe vix palmarum inter eadem altior, copiosissima. Radix glaber
Stemmus glaber verticillatus aphyllus. Folia plana culmo
vetera. Spicis ^{linearibus} quatuor vel quinque versus apicem foliolum
subulatum culmum aequante sub infima, minus distincta quam
in limosa. mascula erecta foemineis brevior squamis obtusis.
foemineis distincta tenues distincta squamis membranaceis albidis
Capsula limosa longitudinaliter squamata oblonga acuminata. Style minus
velosi quam in limosa

— Cavis fructiferis pendulis
pendulis capillaribus, capsulis acuminatis Gooden in A. J. Her.
2-p/100

Stingosa & vagans longis subquadratis fructis filiformibus latius pedunculis
capsulis oblongis subinquetris acutis Gooden. in act. bot. Lin. 2 p. 169. t. 20 fig

⁴⁴ Carex *leptostachya* Erhart her. Supp.
Flor. angl.

Habitat in sylvis et pratis ?

^{mem} Caulis tenues, triquetris sesquipedales vel 2 pedales angulis acutis
Combris. Folia lata, marginibus ciliisque fibris. Spica
mascula erecta linearis. foemineo 5-7. bipollicares. Bractes foliaceae
basi vaginantes fructu inferiori fructu longioribus supremo
brevioribus. Squama lanceolata. Capsula oblonga obliqua
re triquetra acuta profusa

Sylvatica specis pedunculatis pendulis: mascula erecto; foemineis filiformibus
latis pedunculo brevioribus, capsulis ovatis aristatis fuscatis
Hudf: fl: angl: 411. St. Bar. tab. 404

Gramen cyperoides sylvanum tenuius speciatum Bauh. hist. Mon.
hist. III. 243. f. B. tab. 12. fig. 9.

Carex specis foemineis pendulis raris prolongis, capsulis rostratis
Carex Dymeca Erb. bifida Hall. hist. 1395
Habitat in sylvis &

Carex repiana
N. Linn
Culmi plures adscendentes, glabri, inqueti. Folia lata marginem
retrosum fixa bra. Spica pedunculata plures remota, graciles
patentes ^{paucis remota} ~~masculi~~ ^{sempollinari}. pedunculi capillares
solitarii. Bractea foliaceae subinfimis ternis Culmo aetherei
squama denticolata, acuminata. Capsula collo longo aristata

Carex patula Poll.

Sylv.
reiter vagans abbreviata, specis filiformibus laxis pendulis, capsulis
ovatis aristato-rostratis Good. in art. f. Linn. 2. p. 103

sinensis

P. spicis erectis: foemineis quaternis, capulis acuminatis

Retz. obs. 3. p. 42.

Habitat in China

non vidi

prostrata ~~C. spica foemineis ad praesepi glumis maximis, capsulis subdi-~~
~~spicatis, calamo se respiciente prostrato Hall. bot. fl. n. 1379~~

~~Schembe-ayr. Tab. 10. fig. 1. 2.~~

pendula & spicis subsessilibus pendulis: mascula erecta, foemineis cylin-
driceis longissimis; capsulis subrotundis acuminatis Hall: fl. Angl
411. Curt. fl. Lond

Carex Aya *harbyi* En Suppl

Gramen spica pendula longiore et angustiore Bauh. pin. 6. Theatr.

Carex mutabilis Os. Hist. 11. p. 497.

Wilden fl.

Gramen cyperoides spica pendula longiore Monf. hist. 111. 242. f. 8.
tab. 12. fig. 4.

Bord

Carex spica femininis pendulis longissimis, capsulis mucronatis
ovatis Hall. hist. 1396.

Habitat in luco sylvis et sepebus humidis &

Carex maxima All. fl. Pedem. 2341.

gramen altiss. tripedale, glabrum Culmus triquetus. folia
lata. spica 6-7. ^{palistagm} distantes superiores breve pedunculati
teretes 4 vel quinque pollicares. bractea lanceolata & ac-
uminata margine serrata. folia floralia inferiora vaginata
culmo altiora. Bractea breviora parum latiora quam
in pseudocypero spica triplo longiora

~~Carex mutabilis~~
Wildenow. vix
inversa. 109

vaginae longae subaequantibus, speciei cylindricae longissimi pendulae
capsulis confertissimis ovatis acutis Gooden. in a. f. L. a. p. 163.

recurva & spicis confertis pedunculatis cylindricis suppendulis: mascula
terminati, capsulis imbricatis obtusiusculis Hudf. fl. angl. 413 x
fl. dan. tab. 10. 51.
Gramen cyperoides nemorosum, spica subnigra recurva Monf. h.
III. 243. f. p. t. 12. fig. 14.

Carex glauca Scop.
Carex spicis masculis una pluribusve, femininis pendulis, capsulis
ovato-triquetris confertis Hall. herb. 1400

Habitat in pratis, pasuis ericetis & spica masculis linearibus
Culmus erectus triquetris, superne nudus; Calyx obtusiusculus atro-
fuscus. Capsula obtusa, pallide herbacea, variat spicis ma-
sculis duabus, foemineis cylindricis.
Lolium ^{var. patra}
Carex lanosa Less herb. var. p. tab. 15. fig. 3.

Carex vagans abbreviata, spicis foemineis subcylindricis pendulis
capsulis ~~fo~~ rotundato-ovatis, radice repente Gooden. in a.
f. lan. 2. p. 104.

Carex glauca Schreb.

maritima C. specis foemineis teretibus remotis pendulis, squamis
anistatis mascula erecta Act. Soc. Hist. Nat. Hafn 2 p. 1. p. 4

13.
Carex maritima specis pendulis masculis pluribus
calycibus anistatis fl. Dan. tab. 704
Habitat ad littora maris Norvegiae

obtusangula ~~Calce~~

Habitat in ~~Galie~~ Dosis Danis

semidis repens et cum ea confusa similibus illa diversa
Culmi inferne angulis obtusis lobis fere verticillatis versus apicem
foeminea subtriqueta. folia angustiora subtus convexa supra
longiora et culmo altiora. Spica foeminea tenues 7 sem
lenatis -

Culmus inter spiculas triquetris angulis spica foeminea fr
3. brevis pedunculata erecta bipollicaris - mascula
3. - folium sub inferne spica mascula. Spica deest
capsula inflata apice bidentata

Strucka C. Digna, vaginis nullis, spicis subsesquipedibus cylindricis acutis
masculis subduabus, foliis erectis striatis Gooden. in A. J. Lin. 2. p. 196.
tab. 21. fig. 9. *

gramen cyperoides palustre spica pendula Loef. pruss. p. 116. 830

~~Carex~~ asperiflora fl. angl.

Habitat in palustribus & Danis Timmaris anglis

Radix repens. Stipulae glaucescentia erecta rectissima, cum

mo breviorum margine carinaque scabris. Culmus pedalis
bipedalis et ultra, acute triquetus. Spica masculo plerum
que gemina triquetra 1-2 unciali, squamis oblongis acutis
stulis nigri nervi dorsali vidi. Spica feminea tri-

erecta subcylindrica 1-2 unciali infera brevis
pedunculata, ^{longiore} floribus masculis terminata. Squama

oblonga, acuta. Capsula octofariam imbricata. bractea folia
cea subspiculis, inferior culmo parum brevior junior

superior auriculata. Capsula compressa ovata acuta glabra

apice indurata

heredes fructus P. foliis cespitosis triangularibus calms longioribus
specieis mapulis lineantibus, foemineis fessilibus; inferioribus
subterraneis Vill. fl. Delphin. 2. p. 227. no 43. v. 6.

Cyperoides vesiciana humile locustis densioribus Tournes. 4. v. 6.
herb. Mus. A. Tournef.

Red. de font

meliacea Q. spici's mapulis Vermenalebus cylindricis, foemineis ova
tis: inferioribus subnatis, superioribus subseptatis

gmel. fl. Siber 1. 7. 30. fig. 1.

Habat in Sibina

non vidi

humilis C. prica mascula oblonga: foemineis feminibus remotis
tripedunculatis paucifloris, culmo foliis brevioribus
fl. Hall. 045

Schenck 2. agrofl. tab. 10. fig. 1.

Debilis Carex ^{nae} fructis ~~foliis~~ cylindricis, ^{foemineis, pedunculati} foemineis ~~squamis~~ capsulis
rostratis bifurcatis, rostro recurvo

Carex Debilis Forst. prodr: 1

Habitat in nova Zelandia

Culmus triquet. ~~folia~~ folia sub fructu foemineis culmo
altiora. Spica quatuor vel saepe in 3 masculis supremis
distinctis simplicibus tenues bractea foliacea nulla supremam
subtripollicinari a basi ad medium foemineis, reliqua
pari masculis, squama lineariter lanceolata pallide ferruginea
apice serrulata. Spica foemineis 1. 2., pedunculo
lato ~~e vagina~~, pedunculo vaginato. Squamae
capsularum recurvae squamae lanceolatae serrulatae striatae
capsula triquetra ~~subtripollicinari~~ striata 1. 5. 1. 0. Longitudine
superius capsula, glabra.

inflata @ ~~spicis remotis subpedunculatis erectis: mascula erecta can-
colata, capsulis ovatis acuminatis calycis duplo longioribus Hudf.
fl: ang. 412.~~

~~Cyperoides sylvanum angustifolium, caule trilobato, spicis parvis,
capsulis variis dispositis oblongis, in angustum collum vix ab una
parte, ab altera vero magis bifidum coarctatis. Mu. h. gen. 56. t.~~

~~33. fig. 5.?~~

~~Habitat in Europa palustribus &~~

~~Affinis Canic. diffant. Spica mascula frequentissima Solitaria
rarsissime duo.~~

vesicaria a Hudf.

causa ampullacea Gooden.

ripana Carex spicis oblongis acutis; muscularum squamis lanceolatis: fo-
mularum aristato-acuminatis, capsulis ovato-lanceolatis apice per-
cato-dentatis Radex in a. ph. 2. p. 200.

Cyperoides aquatica maximum squamis in aristas longius pro-
ductis, capsulis oblongis, bifidis Mart. nov. gen. p. 57. t. 32. fig. 6-7.
gramen cyperoides latifolium spica nuda caule triangulo Monf.
hist. 3. p. 12. fig. 1.

Carex acuta var. a Hud. flor. angl.

Carex riparia Curt. fl. lond.

Habitat ad ripas fossarum fluviorumque &

Radix repens. Folia lata erecta supra pallidiora, subtus
nigro-viridia glauca margine carinae asper nervis ^{et} ^{exterioribus}
Culmi rugosus inferne reticulato venoso Culmus erectus
firmus acutissime triquetris tripedalis et ultra. Spica
^{vel quatuor approximato}
trio mascula oblonga, acuta triquetra. Squama lanceola
fusca nervo viridi. Spica foeminea 3. oblonga cylindrica
remota apice mascula inferiori pedunculata superioris
foepe sessilis. Squama ovato attenuato fusca capsula longior
bractea ad inferiori culmo foepe longior vaginans ulla
Capsula suboctofanum embriata oblongo-ovata acuminata venosa
apice bifurcata