

Carex

montana ^Q species foemineis sessilibus subglabris ovatis masculo approxima
tis, Culmo nudo, capsulis pubescentibus Lin. Spec. pl. pag. 1385 *
fl. jac: 845 * Less fl. heb. t. 16. fig. 6.

Carex encictomum <sup>Pyperoides alpinum saxatile, capillaceo folio, caule rotundo trique
tro, specie feminali nigricante plerumque unica Mut. gen.
Palluh.
Carex ~~encictomum~~ 64. t. 32. fig. 3.
vel</sup>

vana ^{speculor} Habitat in Europa montani apicis & basi nuncupata
foemineis, unico ^{radice fibrosa}. Folia longa viridia, tenuia culmo breviora
4e ^{subtus} vel ^{maro}. Culmus debilis incurvus, decumbens acute triquetus
Anno 1372 Specie mascula squamis oblongo-ovatis, acutis fuscis, margine
Hall. 1370 huius albedo. Coemmes 3. approximata oblongo maturitate rotunda
persistere videtur bractea brevi foliacea ad duo inferora. Squama per uter
differt modo squamis mascula pallidioris. Capsula subrotunda subtomentosa minus
multo colorationibus brevi obtusiusculo terminata apice indivisa

specie femi ^{Carex pilulifera Spec. pl.}
neo juniores <sup>Gramen cyperoides tenuifolium, specie ad summam caulem sessilibus globu
Cenari oblongo ^{conum omuli Palluh. 4. 91. fig. 0}
pilulifera: <sup>ovariis nullis, specie mascula sublineari, foemineis subro
tundis, sessilibus confertis, culmo debili Godd. in A. f. Lin. 2. pag. 190</sup>
Flor. Can. Tab. 10. 40.
~~Flora aff. t. 446 et fl. 449 cap. et montana Hudsoni~~</sup>

Culmi ^{fileformis} sept capitosi inferne obtuse ^{mitis} Inquetri ^{mitis} superne acute plerumque
basi purpurascens glabri basi foliosi floriferi ^{mitis} erecti ^{mitis} fructiferi ^{mitis} decum-
bentes palmarum toris apice ^{mitis} scabriusculi foliis conferta
medicabilia, culmo brevioribus glabris, margine cava
spiculae superne simplicis foemineae 13. mastulis unius fascis
approximatis florentes lineari-oblonga fructifera subglobosa inferna
11 floris saepe sequentes glomeris paucis. Antheris ultimis ad basin spiculae
mastulae foliorum subulatum sublingulo et inferioribus infimam
spiculae longius sequenti ^{mitis} aequant spiculam bracteis ovato ferrugi-
nea acute dorso linea vnd. longitudine fere capsula capsula globo-
lo mucronato ore lenti pubescentes. Mastula lineari fascis ^{mitis} termi-
lis ^{mitis} obtuse acutiuscula unguiculatae squami lineari-oblongae acutius-
simalis. Margine parum membranaceis ^{mitis} danna vides

procox C. vaginis basibus subaequantibus, pedis approximatis: macula
subtilarata: foemineis oratis; capulis subtundio pubescentibus
Good. in Act. Sci. Lin. 2. p. 170.

Carex montana Hed.

Carex procox Jacq.

fl. Dan.

Habitat in pratis et collis aridis

Radix repens. Folia culmo breviori carinata margine et canna
fiabra. Culmus erectus bi-5 pollicari obtusius inquetet. Spicu-

Hall. 1301

la mascula oblonga ~~subtil~~ ^{subtilarata} ~~foemineis oratis~~ ^{foemineis oratis} ~~capulis subtundio~~ ^{capulis subtundio} ~~pubescentibus~~ ^{pubescentibus} ~~macula~~ ^{macula}
oni. Squama oblonga ~~acuta~~ ^{acuta} ~~in hujus~~ ^{in hujus} ~~foemineis ad basin~~ ^{foemineis ad basin} ~~mascula~~ ^{mascula}

lineari oblonga ^{approximata} squama ferrugines margine albidis ~~in~~ obtuso imbricata
foliolum vel bractea vaginans brevi pedicellum brevissimum equan-
Capsula ovata subinquetet acutiuscula. Tomentosa, mox neyrina
apice integro

Carex ericetorum Willd.

Carex montana Pollack

nuderals ~~Urtica foliis oppositis alternis cordato-ovatis obtuse serratis, paniculis
axillaribus divaricatis-corymbois soft prodom.~~

Habitat in pietatis Insula

Caulis fruticosus ramosus rami glabri

Folia petiolata pollicaria, nuda, acuta

Petiole filiformes longitudine foliorum

Pedunculi axillares solitarii bifidi ramis divaricatis, cymulis 2 vel
3 in singulo ramo & floribus subdistinctis

tomentosa & spicis foemineis subpedunculatis, capsulis subglobosis tomentosis
Mant. 123 * S. V. p. 844

Gramen spicatum angustifolium montanum Vauh. pin. 4. Theat. 47.

Cyperoides montanum vernum, foliis angustis superna parte
pilosis, caule tenuissimo rotundo triquetro, spicis parvis atris,
squamis obtusioribus, medio nervo tanquam in arista prolonga
to, capsulis oblongis crasporibus subhirsutis unilateris tur
binatis Muhl. gen. 64. n. 68.

Cyperoides angustifolium montanum, folliculis seminum villo
sis Schenk. agr. 423.

Carex angustifolia, spicis sessilibus teretibus approximatis,
capsulis hispidis Hall. hist. 1373.

~~Carex montana Hudf. p. 407. *~~

Habitat in Europa pratis et encetis alpinis &

Sacris C. panicis Culmi triquetri. Folia angusta. Spica mascula ter
minalis oblonga, pallidissima - feminea 2. alterna, oblonga
erecta, brevis, pedunculata. Bractea longitudine culmi superioris.

Folliculis capsula globosa, s. subovata, vix alaminata, notabile
tomentosa pilis brevissimis mollebus quasi mucronata. Semina glabra
subglobosa cum corio protuberantia spicis an.

non vid.

~~non vid. praeter Schenk ad montana~~

villarpi C. specis ternis approximatis: macula feliiformi; foemineis
puberulis superne echinatis Vill. fl. Delph. 2. p. 211. no 27
Habitat in Delphinato
Cares globulari Willd.

non vidi

vilulifera C. spicis terminalibus congestis subrotundis. involucra oblonga Lin.
L. V.

Gramen cyperoides tenuifolium, spicis ad summitatem caulis
lespilibus glaberrimis amulis Plukh. alm. 170. t. 91. fig. 8.
p. 3. Gramen cyperoides spicis brevibus congestis, foliis molli. Raj. synopsis.

p. 421.

Habitat in Europa praevis humidis

eodem cum montana

vilulifera Lin. a Solandro lecta est forte
Baron oed. fl. Dan. tab. 403

globularis P. spica mascula oblonga, foeminea spili ovata folioflorali brevior
approximata Lin. V. Fl. Dan.

Carex spica mascula a foeminea in ala folioli remota fl. Lapp.

336.

Habitat in Europa frigida et y

Radix repens. Culmi pedales striati teretibus basi tantum foliosus
glaber uti omnia. Folia erecta culmo parum breviora consisten-
tia rigida subulata. Spica plerumque bis est raris tres-
mascula terminalis tres unguiculans squamis lanicolatis
obtusiusculis nigricantibus, foeminea oblonga remota interdum
ovalis brevior pediculis suspensata erecta foliolo subiecto
spicula triplo longior. semina subglobosa longitudine squama
rari. Capsula mucronata

Filiiformis & spica mascula oblonga, foemineis seplibus oblongis: inferiore
foliolo proprio brevior Lin. L.V.

Cyperoides sylvaticum tenuifolium, spicis parvis venibus gradibus
viridibus Scheuch. gram 425. t. 10. fig. 11.

Habitat in Europa nemoribus paludosis

Inleoda Carex Capriaripa Ehrh.

Wildenow. Culmi bipedales, tenues, obtuse triquetri, ubi folia parum altiore
tab. 1 fig. 2 folia filiiformia subtus convexa margine scabra rigida

in norvegia alpebui varietate terminalis longior bipollicari, inferior brevior tenues
taten spica uniuersa squama caricolata ferruginea margine alba bractea
masculi et foemineae foliacea nullo foemineis duo remoto superior brevior
interdum oblonga folioli brevi spica tamen longior seplibus
superiore apice masculi inferior longior sub brevipedunculata foliolo altitudine
culmi bracteata. Squama ovata acuta fusca dorso margineque

Corea tomentosa Lightf. fl. Scot. vides. Capsula oblongiuscula
bifido subtriangula acuminata acumine

Filiiformis C. vagans brevibus subaequantibus, spicis masculis
subduabus: foemineis ovatis remotis, capsula herti Good. in
A. fl. Lin. 2. p. 172. tab. 20. fig. 5

convoluta Carex spica festilibus confertis macula lineari, capsula oblonga ^{supra} ~~infera~~ ^{aperta}
strigata glabris & tuis

Habitat in Europa australi

Culmi ~~erecti~~, pedales, inferne teretiusculi, folia convoluta
nymphifolia nonnulla, culmo aliora spica ^{erecta} ~~supra~~ ^{infera}

Hec macula lineari squamis oblongis obtusiusculis foemineis
vix longior squamis duobus supra antea ad maculam
inferioris inter sedens, inferiorum partem remotior, oblonga squama obovata minus
quam appropinquata longitudine capsula. capsula patentiuscula triquetra
onata ^{inter} ^{duo} ^{remotior} strigata folium sub foemineis teleforme ^{erectis} ^{capulis} ^{nullis}
affinis flava cit capsula non patentibus collo recto

proprietat

cernua *P. specis* ~~prolongis~~: androgynis foemineisque ^{sub p/pletus}
pendulis, capsulis ovatis mucronatis Hall - ~~herb. p.~~ 1396
mon. f. ~~herb. 3. 4. 12. fig. 4~~

clandestina. C. bracteis membranaceis subophyllis vaginantibus, spicis foemi-
neis remotis vaginam exsuperantibus.

Cyperoides montana humile angustifolium, culmo veluti folioso
spicis obseis Schleich. - Gran. 407. t. 10. fig. 1. Mart. Gen. 63. t. 32
fig. 0.

~~Schleich. tab. 10. fig. 1~~
Scrib. spec. n. 1013. C. ar. humilis.
C. ar. prostrata Gmelin

Habebat in sylvis prope Bristol &

Folia tenuia culmo triplo longiori canaliculata. Culmus erectus.
Verticillifolius, hinc planiusculus glaber. Spica mascula
terminalis ^{acuta oblonga terminali septima} ~~foliis~~ ~~trifloris~~ ~~remoto~~ ovata oblonga obtu-
sa margine lato albo membranacea dorso linea viridi. Spica
foeminea triflora remota oblongiuscula pauciflora, pedunculata
bractea membranacea ad singulem spiculam solum ap-
plicata, sinu solum spiculam ipsam et pedunculum fovens
interdum foliolum brevissimum asperum. Capsula ovata
trigona, acuta, apice indivisa. Stigmata tria Gordon.

non vidi

Citizens Carex fructus oblongis sesquibus distantibus, capsulis oblongis
obtusis velis incurvo

Habitat in alpibus et in maribus paludosis

Culmi et folia ^{pallide viridibus} ~~viridibus~~ adspicenti foliis pithamoi.

Folia carnata ponum margine scabra pallide viridia
velis alba. Spica ^{terminalis} ~~terminalis~~ ^{terminalis} subtervata
squama pallide ferruginea oblongis obtusis pilis. ~~foeminae~~
plerumque 3 - raro duo masculo duplo breviori squama
ovata obtusis pilis auro ferruginea infima mucronata
foliolum interdum sub infima spicula ponum longior
trigyna

post millefolium

proprie ~~paucis~~ ^{paucis} ~~centem~~

torfoice Q. piceis foemineis teretibus pendulis, capsulis conicis
rostratis bicornibus Hall. hist. p. n^o 1409

trigona *P. spica* remotis, foemineis ^{ovatis} fessilibus Trigoni All. fl. pedea
no 2325. Feb 89. fig. 4

Habitat in paludosis

Culmi filiformes triquetri striati glabri foliosi, folia lineana striata, culmo breviori. Spica mascula lineari squamis proadiceis obtusi. Spica foeminea tri. bractea foliacea sub infimo culmo altior. Vaginae nulla. spica foeminea suprema saepe adnata

tristachya & spicis monoclis tubis sessilibus linearibus, mascula longiora Thunb.
fl. jap. 38. & S.V. puz. 845.

Habitat in Japonia

Folia unicum vel duo, in culmo alterna, linearia, glabra, reflexa, breviora
& utriusque nigra, capillaris, striata, glabra, erecta, palmata. Spicis termi-
nales, ses, sessiles, lineares. Semina inferiora duplo breviora; mascula
longiora. Bractea monophylla, spicis brevior Thunb.

non vidi

aspera C. spica mascula solitaria longe pedunculata a linearibus
munci remotio subternatis oblongis, capsulis squamis nigris
culmo retrorsum hirsuto Wild. fl. Ber. no 002 tab. 1. fig. 2
Habitat in germania

michi ignota

Tripastata P

Carex spica Terminali *Tripastata* Hall. Hort. no
1356. All. fl. Pedem. no 2290. Tab. 92. Fig. 57

Habitat in alpebus

Carex Oed. fl. Dan. tab. 403.

Carex norvegica Retz.

Carex Halleri Gunn. fl. Norv.

non vidi

Saxatilis & spicis tubus ovatis f. plebis alternis; mascula oblonga L. S. V.
gramen caryophyllato foliis, spica divisa Bauh. pin. 3. Theatr.

^{46.}
~~Cyperoides alpinum saxatile, caule cubitali rotundiori. Inguetro
nido, spicis brevibus binis s. ternis congestis nascentibus,
squamis obtusis mucronatis Mich. gen. 63. t. 32. fig. 4. ? det~~

Parex spicis manibus ovatis, seminibus gracilibus erectis, capsi-
to triquetris conicis Hall. bot. 1406.
Habitat in Europa alpebus.

Michx. Syn. ad. n. q. dam Good. ~~amantibus~~ michi ignota

triceps *P. spica* macula ovata Verminali major, foemineis contiguis
quibus obtusi

Schrank - Agrost. VII. fig. 9. nasci flori, capsulis ovatis laxis.
^{foliis corymbosis}
Carex spicae per plebes approximatis ovatis Hall. herb. stir. no

1372
Habitat in montosis Helvetia

Carex conglobata All. fl. pedem. no 2314

Synonymum Hall. ad montanam refertur a Welden in
Horskeny

Caryophylla C. specis approximatis ovatis, ulmo Inguetra nuda
Holl. hist. Mus. n. 1371.

Scheuchz. agraph. t. 16. fig. 10. et t. 11. fig. 12.

Habitat in montibus Helvetiae 4

Carex approximata All. fl. pedem. no 2313

Secundum Willdenow in Honkeny Carex globularis vix credo

mihi ignot

Ternstroemia C. spica multifida oblonga, foemineis seplibus minoribus Poir.

Al. p. 2. p. 254

Habitat in Barbani

michi ignota

junci-folia C. culmo superne nudo, fructu approximatis brevissimis,
margine paulisper longiore, glumis lanicolatis mucronatis

Hall. bot. r. n. 1374.

Habita in Helvetia

Carex gracilis Honkeny Syn. n. 272.

michi ignota

bulbosu Carex

Habitat in Europa australi

bulbosu folia rigida culmo alboro Ingueta margini
ne serrulata Culmus digitalis curvus. Spica foeminea
inasiula (deest) apud nona pene pollicis anis fissilis crassa
squama ovata fusca acuta capsulae primum longioris
Capsula subrotunda convexa acuta glabra

Prope rigidam

Semperverens C. foliis duris perennantibus; spicis atro fuscis: macula oblonga,
foemineis binis brevioribus latioribus pl. Delph. 2 p
214. no 31.

Habitat in Delphinatibus
Carex variegata la Martre

an Carex nuda Gooden.

~~multifida~~

Caperis l. foliis conduplicatis ensiformibus: caule superne nudiusculis,
vaginis praethalio ^{suppl} ~~l.~~ Mont. 293. pag. 407. l. l. 819.
Habitat in C. bono spec. 7

glauca Carex spica axillariis subsessilibus remotis oblongis, capsulis
compressis bracteis aristatis brevibus subquartibus

Habitat in Finmarkia

Caules pedales erecti acute triquetri striati pall glauci vnde

Folia canna glauci vndia culmo breviora superiore magi
ne scapula spica mascula terminalis oblonga saepe suprema

spica vix foeminea basi macula raris tota macula squama lanice
unquiculis lata in arista depressa fusca dorso vndis foeminei inferi remoti
brassa infima interdum remotissima, pedunculati suprema sessilis

plerumque 3. raro gemina folium sub pagula culmo altior
sub suprema longitudine spica. Capsula oblonga vndis
trigyna. facies canis cespitoso ad eadem diversa

prope cespitosan

bifurca C. Culmo erecto Inguetro, spicis gracilibus aequalibus, femi-
nariis erectis, capsulis rostro bicornis Schrankii bayesit. fl. 1p. 304

compacta & spicis erectis cylindricis ternis subsessibus. Mascula terminali,
 culmo triquetro Lin. L.V

Gramen canyophyllum angustifolium, spicis sessilibus
 brevioribus erectis non compactis Monf. herb. 3..243.

Carex spicis masculis duabus, femininis sessilibus, capsulis ovatis
 brevis sive mucronatis Hall. herb. 1400.

Habitat in pratis pascuis et nemorosis humidis 4

Culmi compacti, erecti palmares et ultra, triquetri glaucis viri

Carex melanocephala Desf. Solia ^{interim} canadota culmum via sequantia. Spicula 3 vel
 Thuiller. se. Paris quatuor, ~~sepe~~ ^{raro nullum} diebus masculis terminalibus.

Desvosa spicis longioribus in fenum caule albis. ~~Spicula~~ ^{Spicula} squamae foemineae

lycopodium pollicantur, ^{superioribus} ~~oblongo obtuso~~ ^{oblongo} ~~superio~~ ^{dorso} ~~linea viridi~~ ^{linea viridi} ~~interum~~ ^{interum} ~~una~~ ^{una} ~~cum~~
~~bus~~ ^{apice masculis} ~~capitulum~~ ^{capitulum} ~~compresso~~ ^{compresso} ~~totum~~ ^{totum} ~~negro~~ ^{negro} ~~capsula~~ ^{capsula} ~~ovata~~ ^{ovata} ~~trivittis~~ ^{trivittis}

varietatem spicis foemineis subulosis vel ovatis brevibus
 hanc non nisi varietatem esse arunde ceteris sum quod specummo
 vidi unica spica globosa reliquis cylindricis interdum omnes arde

Digno, vaginis nullis spicis subsessibus subcylindricis
 obtusis, foliis erectis mollibus Good. in Act. bot.
 Lin. 2. p. 195. tab. 21. fig. 10

Synon: Desf. a Lin. e Monf. ~~caetibus~~

Duo alio in alpebus norvegiae legi, ulmo foliis que lactis speciei
3-4. multo tenuioribus quam in fr. cespitosa et longioribus alter
speciei f. superionibus sessilibus inferiori pedunculata alter
speciei foemineis androgynis an. Hall. 1390. alter solum modo
foemineis coeternum similes deoque ut nisi varietates quod
enim alter genit speciei androgynae eas non separat haud
enim non infrequens est in variis canibus invenire speciales
foemineas androgynas vel saepe tantum foemineas, u. canis
cespitosa ut diversis credo cum in eadem cespite speciei foemi-
nae omnibus sessilibus - vel etiam cespitosis - vel tenuioribus
infima sessilibus

Disfructus C. specis foemineis sessilibus: una pedunculata, glumis perangis
Ho Hall. hist. stirp. no 1304

Cyperoides specis viridibus brevibus, e squamis angustioribus
compositum. Scheuchz. Agr. p. 435

Habitat in montosis Helvetiae

Carex foliosa All. fl. Pedem. no 2320

Carex viridis Honkeny Synops. no 274

prope Caspitolan

non vid.

perica

*P. spica mastula formicis Longoie, semineis tubulosis
tubis remotissimis, culmo triquetro, capsulis bifidis glabris*

Scopol. fl. car. no 1163.

*Cyperoides angustifolius caule et spica floriferi triangulari
tubis etc: Mich. Gen. 5^o. no 19*

~~Scopol. *P. spica remoti* motu subpeltata Longoie, spica
nisi geminata orbi capsulis bifidis Longoie, spica
bracteis longiformis Mich. fl. car. no 103.~~

flavida Q. ~~spicis~~ masculis erectis foemineis pendulis, capsulis ovatis
~~obtusis~~ bacula brevioribus Schreb. spec. fl. herb. app.

Barrel. Don. 113. fig. 11

forte nihil aliud quam *Casahuate* ^{reivosa} an *Car. glauca* diversa
mihi ignota

Lernaeaceae C. *specis erectis canaliculatis: capsula terminali pedunculata; foemineis remotis tenuioribus* Roth. fl. germ.

l. p. 400 no 40 Scop. carn. 2. p. 225

Cypripedium angustifolium, alpinum, spica radice tenuiore
Scheuch. Agr. 413. Tab 10 fig. 6

Habitat in montibus Tyrolis Carniolis
ab Hallero conpingitur in append. in Scheuch. Agr. cum
numero 1489

an carex e Lapponia affinis cespitosa. ?

alpina Q fructu erecto pubescentibus: inferioribus axillaribus ma-
joribus teretibus elongatis, capsulis ovatis breviter mucronatis
Hall. hist. stirp. n. 1370.

Cyperoides angustifolium, fructu radice vix minus,
alpinum, fructu longioribus Schaeub. t. 6. p. 450

Habitat in montosis Helvetiae

michi cognita

Chizantha G. spica minuta pauciflora: foeminea superiore fistili: infero
more pedunculata radicali, capsulis torquetris elongatis Hall
herb. no 1305

Habitat in montosis Helvetiae

Carex ^{alpestris} ~~falcata~~ All. fl. pedem. no 2329.

Carex Halleriana Honkeny Synop. no 200

Waldern. hinc revocat Carex fl. arag. 922. V. g. fig. 2

prope Cesputum

mibi heri nota ~~Carex Halleriana~~

prope Cesputum

Gynobasis C. *species pauciflora*: foeminea inferior pedunculata, radice
li: superiore sessili, capsulis ovatis Hall. hist. no 1306.

Cyperoides alpinum angustifolium *species femineae Vesuvii*,
Juss. - *orientalis* Scheuchz. agr. pag. 416

Habitat in tuda alpium.

Carex *Pumila* Hoffm. & Heyn. Synops. no 201. qui huius refert
Scheuchz. tab. 10. fig. 12

michi ignota usitato affe.

rigida *C. Dymna* vaginā nullis, spicis oblongis subsessilibus, foliis sub
recurvis rigidis Gooden in act. f. her. 2. pag. 193. tab. 22. fig. 10
Cyperodes germanicum, foliis brevibus rigidis acutis Mich. gen.
p. 61. t. 32. fig.

Carex saxatilis fl. Angl.

Habitat in alpebus scoticis?

radix repens. Folia rigida, nigro-verenta, glaucescentia
superne margine carinaque scabra, culmo paulo brevior.

Culmus erectus, saepe incurvus $4\frac{1}{2}$ unciis longus, acuta
tranqueter, crispus rigidus. Spica masculina solitaria
rarius duo oblonga acutiuscula squamis nigris ovatis obtu-
sissimis margine membranacea, nervo dorsali abbreviato

vidi. Spica foeminea duo vel tres approximata inferos
remotiuscula oblonga acutiuscula inferos inter quod unum

lata, dense imbricata flore uno aeternove in spicis superio-
ribus masculis. Squama nigra ovata obtusissimo capsula
dimidio brevior. Bractea ad basin spicularum folia
cea utraque auriculata inferos spica longior et recurva
Capsula ovata glabra Gooden

Oed Fl. Dan. tab 159 hui pertinere videtur an modo varietas
Cancis saxatilis

Si mea Goodenof. varietate caule crassiore et tenuiore, spiculis an
gustioribus et crassioribus. Spica foeminea longa pedunculata
angustiore a basi culmi squama spica masculo interdum
angustior oblonga stolonos semper adhaerens foliis et adhaerens
Dentes: foliis interdum incurvis