

Parer

pedata & spicae foemineae sessilibus oblongis: inferiore axillari, foliis sessilibus  
foemibus Lin. Spec. pl. pag. 1384.

Gramen caryophyllatum numerosum, spica multiplici Bauh. pin. 4.  
theatr. 47. prodr. 22. Scheuchz. gram. 450. Mich. gen. t. 32. fig. 14.

Cetera spicae geminatae raris, marem adaequantibus, una petiolata Hall. h. 1375.

Habitat in Helvetia, Anglia Lapponia &

Folia pedata angustissima, rigidissima, inferne laevia. Culmus solidior  
laeviusculus, hinc rotundatus foliis longior. Spicae tres, sessiles. maxima  
terminalis, oblonga, geminata. Geminae duo alternae, sessiles ovato-oblo-  
ngae, fusco-geminae: superior absque subiecto folio: inferior ex  
ala folii, longitudine culmi. Glomelli minus ante imbricati.  
Capsulae obsolete pubescentes Lin.

~~Messum in hiis a Gasp. V. et potius digitata~~



glauca @ spicis confertis subsessilibus subrotundis: mascula linearis, capsulis  
acutis recurvis  
Coors fl. Herb. 714 Tab. 15. 1766

Gramen palustre echinatum Lob. ic. 14. B. hist 2. p. 497.

Gramen Cyperoides aculeatum germanicum vel minus Bauh. pin. 7.  
mon. hist 3. p. 243. t. 12. fig. 19

Cyperoides palustre aculeatum, capitulo brevior Sch. agr. 426.

Carex spicis foemineis pedicellatis erectis ovatis echinatis Hall. hist. 1300

Habitat in Europa palustribus

Culmus semipedalis Inguatim glaber. Folia Culmo altiora glabra

Spicula quatuor vel sex apicem mascula terminali pallide feminea  
foemineis sessilibus tertia a reliquis parum remota. Squama ovata can-  
nata dorso linea viridi. Capsula <sup>intra</sup> inflata <sup>et</sup> rostrato <sup>et</sup> patente <sup>et</sup> pma  
bractea in medio altiore

vaginis brevibus subaequantibus foliolo divaricato, spica ma-  
scula linearis foemineis subrotundis, capsulis rostrato-acumi-  
natis Good. in A. sci. Lin. 2. pag. 172.

fulva Q. vagina infima subdividata; superioribus subaquantibus, spici  
ci foemineis duabus oblongis acutis, capsulis rostrato acuminatis  
Gooden in Act. Soc. Lin. 2. p. 177. Tab. 20 fig. 6.  
Habitat in Anglia 7

radix repens, folia erecta, angusta, margine cannaque  
scabra, culmo breviori. Spica masculina pubescenti  
Qulmo aculeo triquetro femineali acutiuscula squama flavescens margini  
scabra  
albido foeminas oblonge obtusiuscula. Spica foemi  
neo saepe remota, ovato-oblonga acuta, inferior pedun  
culata, superior subsessili. Squama oblonga acuta aciu  
triuscula. bractea vel folium vaginans ad basin spica  
rum foeminearum inferior erecta culmum aequans  
superior subdividata culmo brevior. Capsula  
subtrigona nervosa fenestrata oblonga rostrato acuminata  
squamas oquantibus, patentes apice curva

non vid.

varietas canis flava

Cedari *C. spicis subquaternis seplibus, ca ppilis glofosis acuti*

Pret. progr. no 1035

Carex <sup>guyana</sup> flora Dun. 3 71.

Carex mucronata Wild.

Habitat in paludosis arenosis

: Non nospideo

mutabilis *C. pinnis cylindricis*: capsula nutante longipennis, capsulis  
squamis longioribus Willd. fl. Berol. n. 109

michi ignota

extensa *C. vagans* brevis fimo oquantibus foliolo sub-reflexo, spicis conferti,  
foemineis subrotundis, capsulis ovatis acutis Gooden in act. sci. Angl. l. 2. p. 123  
tab. 21. fig. 7.  
*Carex flava* var.  $\beta$ . Hudf. flora Anglica p. 407

Habitat in palustribus 4

Folia radicalia subangusta, culmo breviora, superne margi-  
ne caninaque fimbria. Culmus pedalis et ultra obtuse tri-  
quetus. Spica mascula rarius duo, duo lineari squama  
oblonga obtusiuscula. foemineo 2. saepe 3. ad basin maxi-  
la confertiuscula, inferior aliquando remotiuscula  
ovata superiore subionica breviter pedunculata squama  
ovato fusca nervo vix in mucronem depressa capsula  
duplo brevioribus trajecta foliaceae ad basin squularum  
inferior culmo altior omnes demum reflecto  
Capsula glabra subtrigona nervosa ovata acuta, mucrone  
brevis fimo bifido

nihil ignota

enracina C. feminebus ovato-Virgonis, anthesis uncinatis Cavanell. Ic. 5 pag 40  
Tab 464. fig. 2.

Habitat

Palmus Virgatus pedalis. Spica utra uncinata, modo brevior, gluma calyci  
non oblonga

Trifida C. fructis superioribus masculis, inferioribus foemineis, squamis truncatis

<sup>pagina intermedia anastata</sup>  
Trifida Cavan. ic. 5. pag 41. t. 465

Habitatio in silis Mactovranis

Culmus triquetris, bipedalis et ultra, glaber. Sola culmo longior, atate plana  
juniora canna, striata, margine scabra, pedalis, linearis duas lata. Spicae fructu  
axillares et terminales, sex vel septem, inferiores pedunculato, superiores sibi  
ter. Squama trifida, lacinae laterales latiores, intermedia brevior, costis filiformi  
bus, subreticulata, squama longior. Stamina tria. Anthera basi filamentis affixa.  
Germe ovatum, stylis simplicibus, trifidus. Semina ovata - triquetra

Stolonifera Carst  
Retz. prodr

mhi ignota

Norvegia Part

multivalens

Actini prodromus

multi spinosus

tenella Q.

Retzii prodronio  
fornitū canescenti

mechi ignota

*Dioica* & *Spica simplicis dioica* Lin. t. V. p. 81. Dan tab. 166. 369

*Gramen cyperoides maximum, spica simplicis casta* Monst. hist. 3.  
p. 244. f. 8. t. 12. fig. ult. 22. mai. fig. 36 foemina

*Cyperoides parvum, caulebus et foliis tenuissimis triangularibus,*  
*spica longiore capsulis oblongis* Mich. gen. 56. t. 32. fig. 1.

Habitat in Europa pratis humidis &

Culmi *Spithamei* cespitosi, inferne teretes superne triquetri.

Folia *scaberrima* culmo breviora. *Spica* *verminalis* *plethana*  
semitriloculari oblonga. *mascula* in distincto indivisus acule  
*liguans* *lanicolata* *acuminata* *liguans* *ovatis* *acuminatis*. *Capsu-*  
*lis* *longitudinaria* *liguans* *altero* *latere* *planiuscula* *altero* *convexa*  
*acuminata, patentiuscula*

— capsularum marginibus serrulatis

goden: in act. soc. lin. 2. pag. 139

obtusata Paret specia simplicia androgyna superne masculina capsula  
ovato obtuse trigonata, foliis planis lilioides in nov. Act. Holm.  
1793. pag. 60. tab 4

Habitat in arenosis Oelandia. 4

Culmus ascendens subtriqueter digitalis. Folia costae radia  
glabra pubescentibus 3-5. Specia terminalis masculina  
gluma blava ovato-lanceolata albo flavescens. Neitanum  
apice bifidum. lilioides

capitata & spica simplici ovata androgyna: superne masculina, capsulis  
imbricato-patulis. <sup>n.v.</sup> Lund. spec. pl. p. 1379. Cl. Dan. tab. 379  
gramen Cyperoides minimum, ranunculi capitulo simplici asperio  
rotundo Monf. hist. III. p. 245. f. 8. t. 12. fig. 36.  
Cyperoides parvum, caulebus et foliis tenuissimis triangularibus  
spica subrotunda Meek. gen. 56. t. 32. fig. 2.  
Habitat in Anglia Lapponia &

Culmi plures basi squamis ferugineo fuscis palmatis vel  
flammae ultri. Folia subulata culmo breviora, folium  
plenumque nullum versus capitulum squamo ovato an-  
to. Capsula acuminata.

puberani & spica simplicii androgyna: ovata superne mascula capis  
bis divaricatis retroflexis Lin. S. W. p. 88. Don. Tab. 166

Græna Cyperoides minimum, seminibus deorsum reflexis puber-  
formibus Pluk. phyt. t. 24. fig. 10. Monf. hist. III. 244. f. O. t. 12  
fig. 27. ~~mai. t. 12. fig. 36. foemina~~

Carex minima, caulis et foliis capillaceis, capitulo singulari  
seniori, capsulis oblongis utrinque acuminatis et deorsum  
reflexis Mich. gen. 66. tab. 33. fig. 1.

Carex spica unica teste, seminibus rostratis Hall. hist. 1350  
Habitat in Europa paludibus limosis &

Carex phyllophora Lin. Suppl. p. 413 spica simplicii androgyna  
superne mascula capsulis reflexis, seminibus testibus  
Lin. Suppl. p. 413

in act. fol. Lin. 2. p. 142

utrinque acutis gooden.  
~~deorsum~~ capsularum marginibus semulatis Good.  
in act. fol. Lin. 2. pag. 137

Desideratus

pauciflora C. spica simplicis androgyna, floribus foemineis subternis remotis  
scali patentibus; masculo subunico terminali Lightfoot fl Scot. 543  
Tab. 6 fig. 2. Gooden: in A. Sci. Len. 2. pag. 143.

Carex patula

Hadf.

Habitat in enceto montosis

Styli 3 observant Hadson Gooden folia et Culmibus triquetris

Carex leucoglossa spica simplicis androgyna, superne mascula  
capituli reflexi femineis triquetris Lin. Suppl. p. 413

~~in eodem se obtenta. Act. Holm~~

in herb. Danic.

Halleri P. - spica orata superiore & inferiore mascula, capsulis rotundis  
hirsuti Hall. hist. stirp. no.

Habitat in Helvetia

repens P. Spica simpliciter oblonga superne mascula, glumis foemineis  
ansatis <sup>foliis lineari lanceolatis</sup> Al. fl. Peden. no 1292. tab. 92. fig. 1

Habitat in summis jugis alpinis

Culmi ~~scapituli palmares squamis nigris~~ <sup>digitale</sup> ~~et basi~~  
aphylli. folia ~~altitudine cubiti angusta serrata~~ <sup>brevia linearis lanceolata</sup>

Spica unguiculans absque folio subiecto squama ovata  
foemineorum flocculorum acutiori. Capsula acuminata  
folia latiora quam in Bellard.

Bellardi: *C. spica* <sup>flosculi puberulus</sup> ~~varia~~ *strigosa*, culmo fere foliis capillaribus  
filiiformibus  
(<sup>varia strigosa foliis capillaribus</sup>  
All. fl. Ped. no 1293, Tab. 92. fig. 2.)

Habitat in alpebus Saleici & Islandica

Culmi palmares & pithae filiformes. Solena basi gem-  
mi lanceolatis magni ambitus. folia angustissima  
culmi fere longitudine. Spica unguiculari, flavo  
ferruginea nitida. Squama ovata acuta

Squarrosa <sup>Q</sup> fructu simplici androgyna: inferne mascula, capsulis imbricatis horizontalibus Lin. Spec. pl. pag. 1380\*

Habitat in Canada

Fructus oblonga, cylindrica, crassa, costata. Capsulis horizontalibus imbricatis, apice lineari longitudine ipsius capsulae prominentibus; inferne fructus paleis exaridis masculis tegitur. Inter Canices majores numeranda Lin.

hamata & spica simpliciter androgyna linearis, superne masculula, foemineis  
statis; aristis apice uncinatis equalibus Sw-prodr. pag. 10.

Habitat in Jamaica

folia plana culmo altiora. Spica terpollicario imbricata  
squamis ovatis

uncinata C. spica simplicis androgyna lineari superne macula, aristis  
foeminarum uncinatis, maculis muticis lin. Suppl. p. 413. \* t. v.  
pag. 243.

Habitat in Nova Zelandia

Pheleoides Cavon. 4c. 5. p. 40. tab. 464. fig. 1.

Distingueda ab Emica seminebus oblongis & angustis

*Hermaproditia* Caxx

*Carex hermaproditia*  
Faeq. Coll. 4. p. 174

Habitata in ins. Canear 7

culmi plures simplicissimi teretissimi nitidi glaberrimi aphylli  
bipedales. Folia radicalia supra quatuor velnum eriguntibus  
bipedalia retrosum scabra. Umbella terminalis radii gla-  
bri subtus convexi inaequali 5 pollicares centrali brevissimi  
Involucra polyphylla pedalia inaequalia. Spica cylindrica  
sesquipollicari solitaria bractea brevissima raris 3. 4.  
composita ex spiculis sparsi numerosi subulati acuti  
gratilibus 3-4 linearibus brevissimis radicalibus. Squama  
ovata imbricata inferius obtusa. germen teretissimum  
stigmata tria glabra faeq. ~~flor.~~ flosculi omnes  
hermaproditii

non vidi facies Kyllinga

reflexum Piper foliis quaternis ovatis obtusis reflexis, caule sulcato L.V. p. 75. 24.

Suppl. 91.

Habitat in Cap. & spei

foliis quaternis et reflexis refert Valantiam

non erde

Custa C. spiculis subsens ovatis remotis, spiculis nudis, squamis ovatis acutiuscula  
capsula brevioribus Gooden in act. sci. ber. 2. pag. 145.  
grumen cyperoides spiculis castis divaricatis Loef. p. 117. 8. 32.  
Carex bicoides - Huds. fl. angl. 406  
Carex canescens Lightf. fl. Scot. p. 550. Flou. dan. tab. 205  
Carex elongata Less. fl. heb. p. 197. tab. 14. fig. 7.  
Carex unerea Withenoy. p. 1033

Ita habitat in paludosis. 4

Radix repens. Folia pallide viridia, exata angusta, margine  
cannaque sic abro. Culmus pedalis vel altior, folio panem

longior in quibus angulis acutis asperiusculis. Spicula C.

Carex Nutt. 6. oblonga sessilibus alternis distantibus interdum bractea sub  
Thullus florum infima spicula. Squama albida nervo dorsali viridi  
parf. ovato acuta capsula paulo brevior. flores inferiores

masculi. Capsula ovata acuta dorso convexa (opere lentis  
punctula infima) apice integra

Gooden.  
non in mea

canescens @ Spiculis subrotundis remotis sessilibus obtusis androgynis,  
capulis ovatis obtusis  
Fl. Dan. 205

~~Gramen cyperoides spicis caulis divulsis Loez. pruss. 117. Tab. 32.~~

~~Carex nemorosa, fibrosa radice, caule exquisite triangula, hinc longa di-~~  
~~scissa seu interrupta, capitulis solitariis, proterquam ultimo Mich. gen.~~  
fig. 7. 23. fig. 10

Carex spicis ovatis alternis, supremis se contingentibus Hall. her. 1. 1360

Habitat in Europa

Canicem in Finmarthio paludibus quo forte Linnei canescens  
est. Culmi plures cuspidati inferne foliosi basi foliis  
albido-ferruginei texti, filiformes acute <sup>triquetra</sup> inquetri spithamei  
vel parum ultra folia carinata alia breviora alia culmo  
parum altiora. Spicula 4-5 approximata infima parum  
remota et pleneque foliolo subulato bracteata oblonga  
squama ovata par nitentes dorso ferruginei margine albi-  
do. Capula ovata acuminata

Loez. forte ad C. cunctam Good  
Synon. Michx. ad D. wulf. Good. - pestinet

*Coliaria* ♂ pliculis subovatis sessilibus remotis androgynis, capsulis ovatis vase  
siccis muticis divaricatis Lin. spec. pl. pag. 1302. 4  
Habitat in Europa septentrionali.

non vidi

strata

P. spiculis paucifloris remotis capsulis oblongis obtusis striatis squamis longioribus

legi in norvegia Walders

Culmi plures capillares pedales debiles foliis albis.

Folia angusta margine scabra. Spiculae 2-5 remotae

folium bracteiforme capillare plerumque sub infima

flosculi feminei 1-2. 3 raro quatuor squama ovata acuta

obtusis albidis dorso virides. Capsula dimidio brevioris

Capsula oblonga absque collo

intermedia C. Spica oblonga obtusa, spiculis plurimis: inferius terminata  
lique foemineis: intermediis masculis, culmo erecto Good-en act sci  
Len. 2. p. 154.

Carex disticha Haussfl. angl.

Carex spicata Polluch.

Carex arenaria Less fl. heb. tab. 14 fig. 2.

Habitat in paludosi 4

Radix repens. Folia erecta margine canaque scabru  
culmo saepe breviora. Culmus erectus triquetris angulis  
scabris. Spica composita ex 20 spiculis approximatis  
superum imbricatis ovatis, ceteris tribus inferius et  
terminali sub foemineis, ceteris sub masculis. Flores foemi  
nei inferiores. bractea ad basin spiculae inferiori in foliolum  
petac eum longiusculum depressis: ovata sub reliquis. Squa  
ma fusca ovata attenuata. Capsula oblonga acuminata  
apice divisa, orculo armato membranula laevia aucta  
affinis Car. arenaria

remota & spicis ovatis subsessilibus remotis androgynis, bracteis calicum  
aequantibus. fl. Dan. tab. 44. 370

Cyperoides angustifolium, spicis sessilibus in foliorum alis Planch  
alm. 170. t. 34. fig. 3. Lichen Monsp. herb. 3. p. 243. f. o. t. 12. fig.  
17. Scheuch. gr. 403.

Carex axillaris her. Spec. pl. pag. 1302.

Habitat in Europa umbrosis subhumidis 4

Radix fibrosa. Folcia radicalia angustissima, compressa  
margine aspera culms longiora. Caulina angustissima sub  
singula spicula duo infima culmum superantia. Culmus  
venis debilibus crectus triquet. Spica circiter 10 ovata axil  
lari solitaria remoti subsessili. flores masculi infimo  
rei. Squama ovata acuta hinc convexi nerv. vindi  
Capsula ovata apicem versus serrulato apice indiviso

remota spiculis axillaribus solitariis remotis subsessilibus, foliolis longi  
oribus, capsulis apice indivisis Gooden. in A. f. l. 2. pag. 156

Carex axillaris

prostrata

Culmis prostratis foliis, spiculis axillaribus soplebus  
glomeratis

Habitat in uliginosis India orientali König

Radix fibrosa Culmi plures simplices triquetri  
vaginae foliorum vixi digitales palmari vel pitham  
folia aeterna plana patentia 1-2 polliciana, vix  
semunquam lata a vagina tubulosa striata haerente  
unguiculari. Spiculis plures parvis oblongis glabris paucifloris  
squamis lanceolatis striatis viridis margine pallido acuminato

axillaris C. - spiculis axillaribus subternatis remotis sessilibus: foliolis longis,  
capsulis apice divisi Gooden. in Act. Soc. Lin. pag. 156 tab. 14. fig. 1. &  
Habitat in Anglia &

Radix fibrosa. Stipula radicalia angusta compressa culmo  
terreosa margine asperma <sup>sub spica infima folia longior ligno.</sup> Culmus erectus firmus, strabus  
Inquetus, angulis acutis 1-3 pedalis. Spica interrupta  
spiculis axillaribus infimis ternis, quandoque quater  
nis quinis oblonga floris inferioris masculi. Squama  
ovata acuta fuscentes membranaceo nervo dorsali uni  
des. Capsula ovata acuta apice in vespi margine  
semulato apice divisi Gooden

non vid.

elongata & spiculis oblongis sessilibus remotis androgynis, capsulis ovatis acutis

Lin.  
Gramen Cyperoides angustifolium, spicis longis erectis Bauh.  
pin. 6. theat. 84.

~~Gramen Cyperoides medium angustifolium, spicis teretibus erectis  
flavido-atis Monst. hist. 2. p. 242. f. 8. tab. 12. fig. 8.~~

Carex divergens Cyperoides polytachyon, spicis laxis paniculam veluti com-  
Thullus fl. Boiss. ponentibus Scheuchz. gram. 487. t. 11. fig. 4.  
Gramen cyperoides. Carex spicis ovatis, comis remotis, supremis congestis Hall.

palustre elatum

Spica longior  
Cata Boiss.

Monst. hist. 3.

244 sect. 8

tab. 2. fig. 23

hist. Boiss.

hab. Prop.  
Habitatio Europa

Radix

Specimen herbari Dubium gaudet culmis pediculis apophyllis  
marginibus scaberrime  
laevibus Inquetri folia cernata culmo altiora. Spicula

Spicula saepe octo oblonga remota sessilibus. Squama  
lanicolata acuta ferruginea dorso virens.

bipartita C. spicis geminis linearibus ophyllis foliis linearibus culmo  
tereti terribus

Carex bipartita culmis tereti nudo spicis binis Terminalia  
libris - suprema composita All. fl. Pet. pag. no 2301  
Tab. 89. fig. 5.

Habitat in Alpibus 4

Culmi caespitosi digitales vel parva culmi ultimae ophyllis, foliis  
retorsum margine scabra ciliolata angustissima. Spica  
vix unguiculata squama pallide ferruginea obtusa.

Curvula *C. specis* subgemini involucri monophyllo <sup>Congroup</sup> brevioribus foliis filiformibus culmo brevioribus  
Carex culmo foliisque dunis peria unia glumis an-  
tatis Hall. hist. no 1353. All. fl. Peden. no 2293.  
Tab 92. fig. 3.

Habitat in pennis alpinis Helvetiae et Sabaudiae et  
Planta cespitosa squamis pallida luvio ferrugineis. Culmi  
Inqueti filiformes basi vaginati foliis laxis folia filiformia  
Squamis peria semiunguiculatis squamis lanceolata  
pallide ferrugineo hirsutis acuta. involucrium interdum  
Dees.

aristata C. spicis ternis congestis glumis aristata Hall. herb. spec.  
~~p. n. 1367.~~

Gramini caryophyllato nemorosae spicae multiplici non multae  
disimile sed radice magis geniculata Bauh. prodr. 7.

Habitat in Helvetia n. 2.

nubi ignota

baldenfis. Cypripis ovatis Inquetis Ternis congestis. Vel menalibus & costulis  
bis; involucrio diphylo subaequantibus

Gramen panicum montanum, capite squamoso. Bauh. Theatr.  
pindr: 13 Feb 13. pin 6.

Gramen panicum ex monte baldo Bauh. her. 2. p. 509

Carex alpina, capitulis albis: squamis Inquetis et pulchre  
laesentibus. Seguier ver. 1. p. 125.

Habitat in monte Baldo

Culmus inferne foliopsis Inquetis stratis. folia canneti  
altitudine culmi cannae & cabnuscule. Involucrii  
foliolo lanceolata alterum parum angustior <sup>us</sup> & spica  
paululum longior alterum brevius parum latus.

Spica 3-4 in capitulo terminali squamis ovatis albis  
voss. pallide ferrugineis stratis

Scirpoides Car. spica composita <sup>retrosp. p. albus</sup> androgyni <sup>involucro monophyllo brevior</sup> oblonga, squaculis confertis, foliis  
laciniatis culmum <sup>retrosp. p. albus</sup> subaequantibus

Habitat Tuneti

Culmi <sup>retrosp. p. albus</sup> digitales vel subspithamoi <sup>inferne folios.</sup> in aere <sup>triquetri</sup> ~~folios~~

Folia <sup>retrosp. p. albus</sup> culmo plerumque breviora <sup>maxime laevi</sup> raro aequantia <sup>caninata</sup>  
angusta. Spica <sup>retrosp. p. albus</sup> oblonga e pluribus <sup>alternis confertis oblongis</sup> composita <sup>magnitudine</sup>

~~pauci~~ <sup>pauci</sup> squaculis ~~pauci~~ <sup>pauci</sup> squaculis <sup>ovata</sup> attenuata.

involucro <sup>retrosp. p. albus</sup> foliolum serrulatum scabrum glauci masculi

Tupet <sup>retrosp. p. albus</sup> ne folia <sup>retrosp. p. albus</sup> inferne

Cyperoides. Capitulo terminali subrotundo, floribus simplicissimis  
semi-fubulatis involucrio subtetraphyllo foliisque elongatis  
Carex bohemia

Schreb. Gram. t. 20. fig. 3.

Carex bohemia, aquatica, annua, cyperi facie, caulis  
mollis capitulis in glomeratam spicam digestis Michx.  
gen. p. 70 t. 33. fig. 19.

Cyperus minor, capitulis inflexis Buxb. Cent. 4. p. 34  
Tab. 61.

Habitat in silvis Bohemiae

Culmi pedales foliis triquetris. folia graminea culmo  
altiora margine scabrescunt glabra. Capitulum subglo-  
bosum magnitudine nucis compl. involucrium tetraphyllum  
capitulis long. multoties longior inaequale. flores sim-  
plicissimi pedicellati in umbella simplicissima  
<sup>scotuli</sup>  
~~scotuli~~ minimi angustis semi-fubulatis  
facies minime Carex

Poretii    *Q. spica* composita brevissima, pappi  
bis pubescentibus Poir. N. 2. p. 254  
Habitat in Barbana non

non

~~Habitat in~~ *Polypodiis*

~~Culmorum setaceis Villen. fr. Decph. 2. p. 194. tab. 6.~~

*Myosurus*    ~~*Q. spica* Linn. her. n. 103. p. 103. semina denudata. Poir.~~

~~foetida~~ C. spica composita ovata ~~obovata~~, foliis carinatis culmo  
altioribus culmo Ingueteo angulo scabris

Carex alpinum parvum, latifolium, spica subrotunda,  
fermynea Scheuch. t. VI. p. 450. fig. 10.

Gramen alpinum, node spica parva, subrotunda, fermynea  
Scheuch. agrost. p. 495. t. prod. IV.

Carex folidus, spica fusca, conglomerata Hall. hist.  
Styp. no 1355

Habitat in alpebus helveticis

Folia radicalia, asperosa, Carinata, canna retrospum  
scabra. Culmus nudus Ingueter. Spica composita  
& pluribus oblongis acuta. fo involucri duo, unum  
vel nullum. glume fissis nitida acuta. Semen acutum  
natum acutum

*incurva* Carex spica composita <sup>androgyne orata</sup> spiculis congestis androgynis, involucri nullo.  
foliis involutis Culmo <sup>in medio</sup> teretibus  
Gramen Cyperoides junifolium, spica simplici in summitate culmi  
atrofusca Scheuchz. Agraph. pag. 492. Tab. 11. fig. 7.

Carex alpina minima junifolia, caule teretibus Inquieto, spica in summo  
et de caulis atrofusca, squamis amplioribus plerumque bifidis, et  
limbo membranaceo tenui. Mich. gen. pag. 68. n. 6.

Carex spica unica subrotunda, glumis ovatis, brevis sine antheris  
Hall. herb. n. 1354. Flor. Dan. <sup>Tab.</sup> 432.

Carex incurva: spica conica spiculis congestis androgynis sesquipedibus  
composita, involucri nullo, culmo incurvo Lightfoot fl. Scotica  
pag. 544. n. 24. Tab. 24. quidem. Act. J. Lin. p.

Carex junifolia All. flor. Pedemontana n. 2296. Tab. 92. fig. 4

Habitat in Alpibus Helveticis Norvegiae inque littora maris Boticae  
Norvegiae prope Tinnmarkia orientali

Radix repens longe subaerana.

Culmi digitales vel palmari, erecti, interdum incurvi  
flos obse infer <sup>apice in vesp</sup> superne Inquieti inferne Ventriculi  
vel obtuse obtuse Inquieti vix foliosi

Folia plura <sup>rad</sup> plerumque <sup>sa</sup> omnia radice unica inferna  
in culmo <sup>sa</sup> vaginante subulata, in marginibus annulata

involuta, glabra, altitudine culmi. ~~Spica~~.

Spica ovata, semiunguiculans crassa e spiculis ovatis congestis.

Involucrum nullum

Glume ovato fusca, acuta nitida margine membranaceo.

Semina ovata <sup>abundante</sup> ~~multa~~ ~~ovata~~, glabra altero latere convexa altero plano  
longitudine squamam <sup>superiorem</sup> ~~superiorem~~ ~~inferiorem~~ ~~inferiorem~~ ~~intermittit~~

proleuca. ~~Spica~~

Lobata ♂. spica conglomerata

Rariss. Lobata spica conglomerata ex 12 sex spiculis  
atro fusis subantheris Will. fl. Delph. 2. p. 197  
Habitat in summis alpidibus.

non vidi

Cyperoides & Capitulis terminali subrotundo, floribus simplicissimis subulatis,  
in solucio longo den. Suppl. p. 413. x. S.V

Cyperus minor capitulis inflexis Barb. Cent. 4. p. 34. Tab. 61.

Carex bohémica, aquatica, a noua Cyperi facie, caule molli, capi-  
tulis in glomeratam spicam digestis Mich. gen. p. 70. t. 33. fig. 19.

Carex bohémica

Schreb. Gen. t. 20. fig. 3.

Habitat in Sibiria, Bohemia

Culmi erecti ut pedales - foliosi In quatuor vaginis foliorum  
nati. Ligula membranacea. Colori graminea culmo altiori

Capitulum terminale sessile inter foliola quatuor uno  
qualia sunt utraque foliorum

arenaria C. spica composita, spiculis androgynis. inferioribus remotis  
ribus foliolo longiori instructis Culmo Inguetro Cl. Soc. P. 35 \*

Cl. Soc. Tab. 425

Gramen cyperoides a monte Ballon simile humilium in arenosis  
nascenti Pleth. Alm. 170. t. 34. fig. 8.

Gramen cyperoides minus repens, spica Divisa Loef. p. 116. t. 31.  
Carex maritima humilis, radice repente, caule Inguetro, spica

spadicosa Meek. gen. 67. tab. 33. fig. 4.

Quere

multiformi <sup>Thunberg</sup>

Cl. Soc.

Gramen cyperoides

spica simplicis

composita

cha Razi Synonymis

Fuss: <sup>ad</sup> hum potius

disticta vel bi

indiderent

Habitat in Europa arena, propositum mobili 4

Radix repens. folia angusta margine carinaque siabra.  
Culmi 4-12 unciali Inguetro foliis longioribus. Spica

composita e spicis 7-16. oblongis inferne androgynis  
superne confertionibus bracteatis bracteis foliaceis inferoni

bus herbis in folium tenui firmum depressis, superioribus  
ovatis membranaceis. Squama ovata attenuata longitudine  
capitulo. Capsula ovata acuminata bifida apicem versus utraque  
membranula acuta uterque latere plano striata

spica foliosa oblonga acutiuscula spiculis plerumque  
masculis; inferioribus foemineis, Culmo incurvo Gooden. in act. sci  
Gen. 2. p. 153.

repens. C. spica disticha et bracteata spiculis oblongis sessilibus  
inferius foemineis supremis masculis Culmi ~~triquetri~~  
Bellard. ~~Cent. Append. fl. Ped. pag. 42.~~

Habitat in Italia

affinis Car. arenaria

Radix repens. Culmi triquetri striati basi vaginati et  
foliosi pedales folia carinata culmi priorum spicu-  
lo 6 - 8. oblongo lanicolato. Squama lanicolata  
attenuata pallida ferruginea dorso videri marginae  
perulato laevi Capsula lanicolata margine serru-  
to. foliolum saepe breve sub spicula inferiori

municata & spiculis subrotatis sessilibus remotis ad rogginis, capsulis acutis diver  
gentibus spiculis Lin. L.V. ~~El. Saent 284~~

Gramen nemorosum, spicis parvis apertis Bauh. pin. 7. Mon. hist.  
3. p. 244. f. 8. t. 12. fig. 27.

Gramen cyperoides spicatum minus <sup>spicis minoribus minusque compactis</sup>, ~~spicis~~ divulsa aculeata  
Scheuch. gram. 485. tab. 11. fig. 5

Carex nemorosa, fibrosa radice, angustifolia minima, caule  
exquisitè triangulari, spica brevi interrupta Mich. gen. 69.  
tab. 33. fig. 11.

Habitat in Europa nemoribus, humentibus &  
Carex spicata Hart. fl. angl.

Spica oblonga subdecomposita, spiculis distinctis, capsulis  
divergentibus ore fesso, radice fibrosa Gooden in act. soc. Lin. 2. p.

~~Chondosia~~  
Chondosia Opifera composita: fructibus approximatis superne  
morfibus, capsulis compressis per radice repente filiformi  
Erat

lobata C. Opifera composita, capsulis ventricatis  
natis 1740. 1358  
Caret tripartita Allioni. fr. No. 4. 92. fig. 5  
Albiter in Alcegetra

baldenfi & spicis <sup>9. us</sup> ternis congestis sessilibus ovatis triquetris androgynis, in  
volucro diphylo Lin. Am. acad. 4. p. 331. \* spic. pl. pag. 1300 \*  
Gramen junceum montanum, capite squamoso Bauh. pin. 6. prod.  
13. t. 13.

Gramen junceum a monte baldo Bauhe hist. 2. p. 509.

Pars alpina, capitulis albis: squamis triquetris & nullis luculentis

Sequ. Veron. 1. p. 125.

Habitat in Monte Baldo

in volucris altera valvata, spicis longior; altera brevior. Spicis <sup>subulata</sup> 3-4. <sup>lanicula</sup>

capitulis congestis, albo, oblongo, <sup>quam</sup> <sup>palis</sup> laniculatis <sup>floribus</sup>  
ovato albidis, <sup>me</sup> <sup>spiculis</sup> <sup>distinguentibus</sup>, ad eorum basi floriculi foeminei,  
gibbosi; stylo longo, tripartito. Lea.

Culmi triquetri folia carnata albidine fere culmi.

Heliconastis C. spica composita, spiculis appressatis superne  
foemineis capsulis imbricatis latentibus integerrimis  
Erhart

non vid.

*Disticha*  $\varnothing$  *Spica composita* *fridi* *frida*: *spiculis* *ovatis* *subembricatis*  
*androgyneis* *foliolo* *longiori* *in* *fructu*, *culmo* *triquetro* *Hudf.* *fl.*  
*Angl.* *p.* *403* + *Lib. ob. spiculez.* *63*

*Gramen* *cyperoidi* *ex* *monte* *Bablon* *simile*, *spica* *totali* *e* *pluribus* *spicis* *com-*  
*posita* *Plukh.* *phys.* *tab.* *34.* *fig.* *7.*

*Carex* *palustris* *elatior*, *radice* *repente* *culmo* *trilatero*, *spica* *spadicea*,  
*capitulis* *crispis*, *capsulis* *marginatis* *Muh.* *gen.* *67.* *tab.* *33.* *fig.* *3.*

*Carex* *spica* *in* *summo* *caule* *congesta*, *imifoliolis* *in* *dentibus* *Hall.*  
*her.* *1.* *1362*

$\varnothing$ . *Gramen* *cyperoides* *elegantis* *spica* *composita* *molli* *Plukh.* *phys.* *34.* *fig.* *4*

*Habitat* *in* *palustribus*  $\varnothing$

*Spica* *e* *spiculis* *a* *duodecim* *ad* *viginti* *composita*, *in* *senioribus* *remotionibus*  
*superioribus* *imbricatis*, *ovatis* *Hudf.*

*Carex* *arenaria* *Leersii*

*eadem* *cum* *intermedia* *Good.* *403*

Culmi pedales erecti. Inguetm angulis acutis retrosum striatis glabr  
inferne, foliis vaginatis. Folia culmo breviora ~~canina~~ <sup>lanceo</sup>  
cuneolata glabra spiculae superne approximatae lineari acumi  
natae al. alternis, unguiculato saepe quindecim acuto fusco  
ferrugineo & squarais lanicolatis acutis carinatis. folia in  
lanicolatum attenuatum longitudine spiculae latum fusco  
ferrugineum sub infima spica flores foeminei inferiores  
muculi saepe germina acuta, non in apice indurita.  
Capsula oblonga, acuminate bifida, oculo armato membra  
nula lacera acuta

capensis C. spica compressa: inferiorem bractea longiori instructa;  
culmo compresso. Thunb prodr. fl. cap. pag. 124

Habitat in Cap. b. spici

michi ignota

andragne

glomerata C. spica composita bractea longiori horizontali distincta,  
Culmo trigono Thunb. prodr. fl. cap. pag. 14.  
Habitat in Cap. b. spci

non vidi androgynum

microstachya © spicis approximatis linearibus terminali  
longior capsulis appressis Ehart. Hann. May. 1784  
13 Hall herb 1367

Habitat in Germania

Culmi pedales basi foliosi strati. folia culmo breviora  
angustata spicis 2-3 approximatis inferioribus brevioribus  
terminalibus reliquis duplo longioribus obtuse pallide ferrugineo  
neo. Squama obtuse margine albedo

foetida Carex. <sup>ovata</sup> spica composita, spiculis confertis androgynis culmo triquetro  
foliis planis in volucrio nullo

Gramen alpinum, enode, spica parva subrotunda ferruginea Schenck  
agrost. prodr. pag. 10. tab. 4.

Carex foetida spica, spica coramglomerata Hall. herb. 1355.

Carex foetida All. fl. Pedem. 2297.

Habitat in alpebus helveticis

Parum differt ab ~~procedente~~ <sup>in summo</sup> culmo et quippe triangulari foliis  
subrotundis planis spica magis nitida et saturate conferta, spiculis  
androgynis

~~Munoz. lingua lat. Torf. Spica foete androgyna patens confertior Hallen  
descriptio~~

brizoides C. spica composita disticha nuda, spiculis androgynis oblongis Conti  
quis, Culmo nudo Lin. L.V

Gramen cyperoides elegans, spica composita apertiore Moench

hist. 3. p. 245

Carex fibrata radice, angustifolia, caule exquisite triangulari  
Mench. gen. p. 70 t. 33. fig. 17.

Carex spica disticha teretibus repando Hall. hist. n. 1350.

Hall. hist.

Habitat in Europa

Culmi tranquilli retrosum scabri nudi. Folia longa retrosum <sup>16</sup> fimbria  
Spicae ut in Poa brizoides in summo caule <sup>16</sup> pteno, alterna. <sup>4</sup> Squa  
ovato-lanceolata acutiuscula Hal.

+ inferiores remanescunt. folium saepe subulatum sub  
spicula inferiora spica parum breviora. Spicula  
acuta squama oblonga obtusiuscula

nunc haud nota

stellulata C. spiculis subternis remotis, capsulis divergentibus acutis, ore in  
segro Gooden. in A. f. Lin. 2. pag. 144. \*

Gramen Cyperoides echinatum minimum Scheuch. Gram. 4. 85. t. 11

fig. 3.

Carex mucicata fl. Dan. tab. 204. Less. fl. herb. pag. 196. t. 14

Carex echinata fig. 8

Habitat in palustribus 4

Roth fl.

Gramen cyperoides echinatum minimum Mont. hist. Oxon

3. 344. f. p. v. 12. fig. 16

Solis exsertiscula patula margine cernaque crina  
Culmus foliis brevior iniquater angulis obtusis  
Spica composita spiculis subternis remotis ovatis  
sessilibus. bractea saepe ad spiculam inferoem  
basi ovata in foliolum setaceum depressa culmo.  
brevi. flores inferos masculi superiores formam  
plures. Squama ovata acuta capsula matura brevis  
res divergentes apice subintegra.

Clavata C. spicis simplicibus <sup>ob</sup> ovatis: inferionibus folio longiori in  
stratis, culmo Yngone Thurb. Prod r. fl. cap. pag 14.  
Habitat in cap. b. spici

non vid.

androgyna

Spicata & Speculis subrotundis androgynis contiguis, capsulis ovatis  
acutis Hudf. fl. Angl. p. 405. & Jam. 271.

Gramen cyperoides specis minoribus minusque compactis Bauh prod.  
19. Pin. 6. Hist. 11. p. 497.

Carex palustris media, radice fibrosa; caule exquirite triangulari,  
specia brevi compactiori Mich. gen. 69. tab. 33. fig. 14.

Habitat in agris ad fossarum margines &

variat specia nuda et bracteata &

Carex mucronata in

mucronata & specia oblonga subdecomposita, speculis distinctis  
capsulis divergentibus ore fesso, radice fibrosa Good.

mon. f. p. 7. 12 fig. 27.

Scheuchz. 480. t. 11. fig. 5. Flora Suevica no 839

# ore bifido

Folia angusta margine canaque fibrata. Culmus  
pedalis tranqueter angulus fibratus. Specia sepe decomposita  
specula circiter 10 inferne remote superne contiguis ovatis  
apice macula bractea subulata inferne sub specis inferis

in herbis mucronata Gooden. ubi specula longioribus. Squama ovata  
non adesi acuta capsula breviori. Capsula ovata acuta limbo plano illeni-  
locis, ore glabro ad mucronem superne hirsutula subdivergente.

ovales. O. spiculis subferris ovalibus approximatis aeternis, squamis  
lanceolatis capsulam aequantibus. Gooden in Ai. bot. lin. 2. p. 148.  
gramen cyperoides spica e pluribus spicis mollibus composita

Scheuchz. Gram. 456. t. 10. 15.

Cana Caponna Collect. n. 874. Less fl. heb. pag. 144. t. 14. fig. 6

Habitat in palustribus et pratis humidis &

Folia culmum subaequantia. Culmus erectus pedalis triquetrus  
angulis acutis. Spi ad basi spiculo inferiori bractea  
in partem spiculo sua longitudine depressa  
flores inferiores masculini pauciores. foeminei plures  
squama supra nervo dorsali viridi. Capsula oblonga  
acuminata ore integro

nemorosa ♀ spiculis ovatis sessilibus remotis capsulis divergentibus acutis  
bicaudatis, bracteis filiformibus spica longioribus cernitis. fl.  
Pozson. no 926

Habitat in Hungaria 4

affinis <sup>crenata</sup> ~~municata~~ diversa capsula bicaudata a reliquis  
bracteis longioribus

non vid.

*[Faint, mostly illegible handwriting at the bottom of the page, possibly a signature or date.]*

*Lepinna* & *Spica* composita, spiculis ovatis seplibus approximatis al  
ternis androgynis nudis *Spei. pl. nov. 1301. Icon. pl. Herb. 707. Tab. 14. fig. 6.*

~~*Gramen Cyperoides palustre majus, spica divisa Bauh. pin. 6.  
Mon. hist. 3. p. 244. f. 12. fig. 29.*~~

~~*Gramen Cyperoides, spica e pluribus spicis mollibus composita Scheuch.  
gram. 456. t. 10. 15*~~

*Carex angustifolia, caule triquetro, spicis pluribus elegantibus pa  
rum inter se distantibus Segu. Ver. 1. p. 124. tab. 1. fig. 2.*

*Habitat in Europa praevalens 4*

*Culmi, sive bijudales erecti, inferne foliosi, glabri, triquetri. Folia  
angusta, glabra, cannata, margine retrosum scabra, culmo breviora  
Rachis flexuosa. Spica ovata distincta u. c. fructiferis subrotun  
do, masculi terminalis in singula spicula. Bractea subinfima  
ovato-lanceolata aristata. Squama lanceolata, semiginea mar  
gine albedo membranacea. Pappulo lanceolato, acuminata  
margine scabra.*

*Nota  
descriptio  
ad.*

*3 alicam partem in Scellandia legi spiculis confertionibus parum  
moxoribus, subpido folies sub prima spicula caulem et cidente an  
modo vovetas. haec uti Syn. Mon. Keer. et Scheuchz ad  
ovalem pertinet*

Specimen e fecia Gaudet spiculis frequentibus. Ceream oblongi  
inferioribus panem remotioribus superioribus contiguis. bractea  
serpyneae lanceolata infimo in setam attenuata

*Sequierei* C. frusa composita disticha nudiuscula: spiculis contiguis  
androgynis teretibus rectis culmo superne nudo Schreb. *fl. d. fl.*  
Lep. pag. 63. Carex proterea

Carex angustifolia, caule triquetro, spicis pluribus elegan-  
tibus, panem inter se distantibus *Legu. fl. Veron. 1. p.*  
124. 7. 1. fig. 3. *Suppl. 24*

Habitat in gramenosis Italia et Germania  
Pulmi vix pedales. folia angusta

*Juncus* C. spica deicomposita elongata basi subramosa, spiculis inferioribus  
remotis; summis cordatis capsulis sub erectis Gooden in Act Soc. Lin.  
2. p. 160 \*

*Carex nemorosa*, fibrosa radice, caule exquisita triangulari, spica longa  
*Juncus* seu interrupta, capitulis solitariis, proterquam ultimis  
Michel. gen. 69. t. 33. fig. 10.

*Carex canescens* fl. Angl. 405

Habitat in nemorosis humidis &

Radix fibrosa. Colica angusta canna marginibusque  
aspera culmo longiora. Culmus sesquipedalis  
inquiete angulis acutis. Spica interrupta basi subramosa  
spiculis inferioribus remotis, plurima, ovata, sessilibus  
bracteis setaceis hirsutis: superioribus contiguis floribus  
masculis terminalibus. Squama mucronata albedo vixsten-  
te mucronata. Capsula ovata acuta ore bifido

divisa C. spica ovata subdecomposita foliolo erecto infructu, spiculis subcon-  
gestis, capsulis ad presci radice repente Good in act. sci: lin. pag. 157. x  
tab. 14. fig. 2  
fl. angl.

Habitat in palustribus maritimis

Cannaque

Radix repens. Folia erecta margine siabra culmo longio-  
ra, angusta. Culmus pedalis erectus ad spicam foliosus  
foliolo saepe longissimo interdum brevissimo tenui  
erecto, acute triquetris. Spica composita, interdum  
decomposita. bractea fusca oblonga sub spiculis. Spicula  
fusca ovata subcontigua, erecta floribus terminalibus  
masculo: Squama ovata acuta, capsula longio-  
res. Capsula ovata acuta hinc sub cavo illici-  
gibba ante imbricata, membranacea submargina-  
ta

Dwarf & spica composita: spiculis rotundis remotis, pediculis androgynis  
nisi foliolo longiori inferius, capsulis acutis, culmo vesetivis  
Hud. fl. Angl. p. 405 & L. Dan. 271.

Gramen cyperoides palustre spica divulsa Bauh. pin. 6.

Gramen cyperoides ex monte Ballon spica divulsa Bauh. pin.  
hist. 1. 11. p. 490.

Habitat in palustribus 4

vid. Dwarf Gooden.

vulpina & spica supradecomposita inferne laxiore, spiculis ovatis androgynis glomeratis: superne masculis Bl. Dan. Tab. 300  
Smilax n. 1. p. 166 t. 32  
gramen cyperoides palustre majus; spica compacta Bauh. Pin. 6.  
Monf. hist. 3. p. 244. f. O. t. 12. fig. 24.

Carex palustris major, radice fibrosa, caule exquiste triangulari, spica brevi habitioe compacta Mich. gen. 6. t. 33. fig. 13. 14.

Habitat in Europa paludibus nemorosis &

Folia latiuscula margine carinae espera culmo altiorum. Culmus erectus, bypedalis triquetris lateribus exte-  
ratis angulis scabris. Spica oblonga obtusa ramis distan-  
tibus rigidis. bractea basi ovata in fetam foliaceam hespi-  
dam depremi. Spicula ovato-rotundo, Squama ovato  
acuminata. Capsula oblonga acuminata ore  
bifido

Spica supradecomposita caantato-ramosa obtusa, spiculis superne ma-  
sculis, capsulis divergentibus, culmi angulis acutissimis god. in  
act. bot. her. 2. p. 161.

brunnea. C. spicis androgynis pedunculatis linearibus superne masculis  
Humb. fl. jap. 304. N. pag. 044

Habitat in Japonia

Culmus trigonus, glaber, pedalis, folia linearia apice attenuata, striata,  
verso medio elevato, integra, glabra, erecta, culmo longiora.  
Flores spicati. Spica pedunculata, erecta, lineares, acuta, inferne  
femineo, superne masculo, brunneo, glabra, semipollicares, plurimo  
cistiter duodecim. Pediculi capillares. Calycis glamo ovato, acuto  
triant.

indica & fructus androgynis cylindricis paniculatis pennatis, flosculis aliquot  
inferius foemineis Mart 574. N. p. 045

Habitat in India orientali

Indica ? (herb. Ind.) ex insula Bourbonis

Culmi bipedales, teres, triquetri foliosi. Folia graminae carinatae,  
marginata scabra, supra culmo attona.

non vid.

teretiuscula C. spica supra de composita coarctato-ramosa acutiuscula,  
spiculis glomeratis superne masculis, capsulis patentibus culmo teretibus  
Sculo Gooden. in Act. Soc. Lin. 2. p. 163. tab. 19. fig. 3. ~~et~~  
Habitat in palustribus 4

Radix fibrosa. Folia rigidiuscula culmum dimidium vaginantia  
vagina supra hinc membranacea transversim rugosa basi extus con-  
vexa intus canaliculata. superne cinnata culmo longiora  
supremis reliquis longius. Culmi acute triquetri ut angulis  
asper inter angulis torus prominulus longitudinalis, pedalis vel ultra  
Spica terminatis ovato-oblonga acutiuscula bractea infima  
brevis fere basi dilatata utraque membranacea fusca magis albo  
in seton spicula sua breviori depressi. Spicula ovata acuta  
Flores masculi superiores plures, foeminei inferiores circiter  
6. Squama acuta ovata. Capsula ovata margine serrato hirsuta  
10 patentis

Diandra C. racemo simplici arbo, flosculis masculis Diandri  
Roth. fl. Germ. 1. pag. 396  
Habitat

non vid.

interupta Carex spicis decompositis axillaribus pedunculatis, masculis  
superne, capsulis feminibus Inguetris striatis rostratis  
Habitat in India orientali Hongkong <sup>suber ad vaginam substriatula</sup>  
Culmi obtuse Inguetris vaginati foliosi. Folia Cannata  
canna margine que scabra femiungues. Lata Culmo longio  
ra. Vagina longa striata in pedunculi axillares como  
moti teretes loricis parhatis diffractis aternis femipolluta  
rei. Spicula ovato-oblonga alterno patentis <sup>prois sua</sup>  
mo ovato aristata striata femine breviores. <sup>margine vel membrana</sup> Semen in  
acuram longitudine ipsius feminis defraens

an indica Linnaei

paniculata & radice composito, spiculis androgynis.

Leinfl. II. 713

Cyperus longus inodorus Sylvaticus Bauh. pin. 14. Theatr. 221 Tab. 14. f. 4

Gromen cyperoides paludre elatius, spica longiore Cassa Monf. h. 3. p. 298. t. 11. f. 1

Carex angustifolia, caule triquetro, spica multiplici fusca Michx. 23.

Gen. C. D. t. 33. fig. 7.

Cyperus alpinus longus inodorus panicula femurinea minus sparsa  
Sch. agr. 499. pr. t. 8

Carex spica paniculata Hall. hist. 136 C.

Habitat in Europa

Pulmo 3-4 pedales triquetri, basi squamis fuscis lanceolatis, ca-  
nospica glabra, Leespici hirsuta folia striata conduplicata canna  
& margine fuscum scabra. Spica terminali ramosa. Ramis alter-  
ni remotiusculi spiculis alternis inferiusculi superne foemineis  
lanceolatis distinctis. Bractea striata ramo brevior. Squama  
ovato fusca margine membranacea. Capsulo ventricoso, spica  
acuta bifido

Spica supra decomposita, paniculato-ramosa acuta: ramis  
alternis remotiusculi, capsulis patentibus, Culmo triquetro Good.  
in a. s. l. 2. p. 164