

Cania

1. papaya *P. foliorum lobis pinnatis.*
2. papajosa *P. foliorum lobis integris.*

Digitata *Ranea* foliis digitatis lanceolatis integerrimis

Habitat in Peru Tuzhu pita. e coll. Tuzhu Hico de la gover naden Incolis

Caulis arboreus, spinosus. Folia superiora, petiolata: foliola 9na, septima Racemi com-
positi. Ocreae oblongae laevae

2 Pofopofa *Q. Colicium lobis integris*. Hort. Clift. 4624
Sicut arbor papayae sylvestris nomine muija Pluken. alm. 52
~~Legit~~ 14 b. v. 270. fig. 2. 2.
Papaya ramosa, fructu pyriformi Des. peruv. 2. p. 52. v. 39. fig. 2.
Habitat Surinamit

novi⁸² Synon. p. 14. v. 2. ab. uti et Pluken
Sicut: ex hort. Clift addenda

1 pepaya *Foliorum lobis sinuatis* Lin. P.V. her. obs. pag. 3704
papaya

Papaya-maran Rheed. Mat. 1. p. 23. t. 13. fig. 1. 2

Arbor platani foliis, fructu peponis magnitudinis eduli Bauh.
pin. 131. Mer. sur. 40. t. 40. et. tab. 62. 64.

Talis arbor utriusque india, platani foliis, mono perthe her. Pluken
alt. 145. t. 270. fig. 1.

♂ Anabapaya Rheed. Mat. 1. 3. fig. 1.

Habitata in India

mar. ^{lateralibus.} folia septem fido septem lobis lobis ovato-lanceolatis integerrimis
minoribus ^{caimago} intermedio inciso subpinnatifida utraque
glabra, pedalis, petiolata, alterna. Corymbi saepe
moxi alterni remoti.

Arbor 10-20 pedali subpinnata molli, frondosa. folia terminalia
flos hermaphroditici. ^{folia} folia in caule sub et inter folia in
diffinito individuo

Roaph. amb. 1. 5056. Hugh. barb. 101. t. 14. t. 15
ulteriori describenda

Spinosa C. foliis digitatis, folioli integerrimi autl fe. Gu. pag. 901
tab. 346.

Habitat in Guiana

non eda