

Canispa

1. corandae C. <sup>spinosa</sup> foliis ellipticis obtusis
2. spinosam C. spinosa, foliis ovatis acutis venosis, laciniis corolla lanceolata  
oblongis ramis glabris
3. Edulis C. spinosa, foliis ovatis acutis, laciniis lanceolato-linearibus,  
ramis superne villosis.
4. med uermis C. inermis foliis ovato-ovatis mucronatis acutis
5. mitis C. inermis, foliis lanceolatis attenuatis

Dulcis Canisa spinosa, foliis ovatis subaveniis, ramis glabris, laciniis laciniis corolla  
lanceolatis

Habitatio Guinea Thonning 5

Frutex ramosus bimus, biorgyalis, debili cortice umoso. Rami teretes,  
glabri, uti totus frutex. Spina opposita utrinque, ~~et~~ inter petiolo-  
recta, pollicari. Folia petiolata, opposita, bi-pollicaria, ovata, acuta  
rigida, supra opaca, nitida, subtus obsolete simpliciter venosa.

Petiolus brevissimus. Pedunculi axillares et terminales, gemini.

Et semi-pollicares. Flores 4. 5. sessiles, longitudine pedunculorum. Calycis  
lacinis subulatis. Corolla tubi sursum sensu sensim labior,  
purpureis: lacinis limbi lanceolata, leviter dextrorsum flexa, alba.

Bacca globosa, succulenta, magnitudine ribes, nigra, bilocularis.  
Loculis dispermis. Semina ovata, hinc convexa, inde excavata,  
obsemento affecta Thonning.

involucratu Convolvulus pubescens, foliis cordato oblongis obtusissimis mucronatis, pedunculis subtrifloris, bracteis ellipticis

Convolvulus involucratu foliis cordato-lanceolatis pubescentibus, pedunculis <sup>sub</sup>trifloris, calycibus bracteatis Wild. Spec. pl. p. 1. p. 2. p.

Habitat in Guinea Isert

Caulis volubilis, striatus; Venae. Sola petiolata, bipollicaria, basi sone mucronato-subtruncata, interdum subcordata, venosa, subpubescentia, integerrima.

Petuli villosi ma. Bracteis duobus ad basin pedicello nem, duobus ad basin singuli calycis, mucronatae.

Pedunculi sex  
longitudinis  
foliorum pubescentes  
2-3 flori

*Silicinea* *Canispa* foliis lanceolato oblongis mucronatis versus petiolum an  
gustioribus La Mart. T. E. 2. pag. 35.  
Habitat in India Orientali

an a *P. curvicauda* diversa

*Salicina Canisa*

Habitat in India orientali herb L. manthii 5

a reliquis differe videtur foliis seriqua pollicantur, basi acuti, quae ob  
tusis vel obtusiusculis cum mucrone: laciniis cordato lanceantibus; floribus  
copiosioribus; pedunculis floribusque tenuioribus

Salicina: Canosa

Habitat herb. Rus.

Rami teretes, glabri. Spinae duo, opposita, patentissima, unguiculatae. Folia opposita,  
petiolata, pollicaria, glabra, tenuissima venosa, supra nitida, lanceolata, mucrona-  
ta, utrinque acuta, vel apice obtusa. Pedunculi ex apice ramulorum 3. 4. in  
glomeris. Flores pedicellati.

Spinanum C. foliis ovatis acutis Lin. Mant 559 & S.V. p. 251.

2  
Spina spinanum Rumph - amb. 7. p. 76. t. 19 fig. 1.

Habitat in India orientali 5

Rami teretes, uti tota planta glabra. Spinae horizontales pollicares  
supra foliis, apice purpurascens. Folia petiolata, ovata, utraque  
venosa rigida, per unicum inter funas et per sub fune spinis, nullis  
na, petiolus brevis. Pedunculus terminalis bifidus, <sup>si non alius</sup> ~~pedunculatus~~ in  
f. trifloris. Corolla glabra <sup>alba</sup>. Laciniae acutae.

Spinanum C. foliis ovatis acutis venosis, lacinis corollae lanceolatis oblongis  
ramis glabris

oxyacantha javanica Rumph - herb. amb. 7. p. 39. tab. 14. fig. 3. Rumph.  
herb. Musi.







5 mitis  
4 nermis Parsia  
nermis, foliis lanceolatis attenuatis. Tab LIX

Habitat in India orientali & <sup>uti apud</sup> ~~China~~ <sup>India</sup> ~~apud~~  
Rami teretes, sub foliis <sup>ut apud</sup> compressi, glabri, cortice fusco, fove punctis

# <sup>ultimi</sup> ~~ramales~~ sub adnervi <sup>ut apud</sup> petiolata oblique opposita, lanceolata, glaberrima  
dichotomi. Stipula nulla.

Folia petiolata, oblique opposita, lanceolata, glabra, transversim  
nervosa, <sup>venis</sup> ~~venis~~ <sup>reticulata</sup> ~~reticulata~~, costa foliorum subtus purpurascens nitida.

Petoli vix semiunguiculari. Stipula nulla.

Conjuncti ex apice ramulorum. Braeae minuta sub pedicellis.

Calyx inferus: laciniis subulatis.

Corolla tubus linearis, basi incrassatus, cinerascens: lacinae limbi  
lanceolatae.

Stamina. filamenta nulla. Anthera s: in fundo tubi.

Germen ovatum, acutum. Stylus 1, superne crispus. Stigma obtusum

Frustrum non vidi, fide Cal. Honigii huc retuli, facie a  
reliquis parum recedit

3 Dulis Canisa foliis ovatis acutis arenis, ramis superne vellosis, laciniis Corollae lanceolato-linearibus

Antura Corkh. descr. pag. 63.

Rami ~~Canisa~~ Rami dichotomi, teretes, inferne glabris, superae vellosi.

Spino duo ad dichotomiam ramorum, oppositi, patentes, teretes, glabro apice rubro, inferiores majores pollicares.

Folia opposita, subsessilia, ovata, integerrima, acuta, rigida, glabra, arenis par unicium unicium inter singulam dichotomiam, in ramulis floriferis plenum quae trium parium, <sup>oblonga</sup> <sup>non</sup> ~~summa~~ ~~extimum~~ reliquis major.

Petiolus brevissimus

Pedunculi terminales, plerumque bini interdum tres, subquinque flori.

Pentanthum monophyllum, subsilosum, quinque partitum: laciniis subulatis, ciliatis.

Corolla tubus rektus: laciniis limbi lanceolato-lineares

Filamenta versus faucem tubi.

Pericarpium baccis bitoculari, dispersa Corkh. & Hal

(Cel. Leonoli in G. Ind. ad Hist. nat. pag. 199. Anturam Corkholi ad Arduini am am retulit, obstat vero Corolla tubus rektus non curvatus, filamenta non in inferiore parte tubi inserta sed versus faucem, Stagona simplex non ven bifida. Affinitas certe Arduinia maxima est cum Canisa



Spinanum Carisa Carisa foliis ovatis acutis venosis, laciniis corollae lanceolato-oblongis

Carisa spinanum foliis ovatis acutis Lin. S. V. pag. 251.

(Differt a Car. Edulis ramulis vix villosis, foliis venosis, pedunculis solitariis bifidis, calycis laciniis subovatis, Corolla majori laciniis lanceolato-oblongis, Ramuli in omnibus speciebus versus apicem compressi