

# Carlina

Squamae interiores <sup>calycis</sup> ~~radicatae~~ longiores radiantes nigrae & coloratae  
Leminae <sup>lanatae</sup>

1. acaulis C. caule unifloro flore brevioris foliis pennatis
2. acanthifolia C. acaulis, foliis pinnatis lanato-subnatis
3. lanata C. caule dichotomo superne lanato, squamis calycibus terminalibus  
aureis  
stellatisque sanguineis
4. corymbosa C. caule multifloro subdiviso, calycibus terminalibus septem  
flavis
5. vulgaris caule multifloro corymboso, calycibus terminalibus flavis
6. nemosa C. floribus lateralibus sessilibus paucissimis
7. pyrenaea C. caule multifloro, foliis decurrentibus multinatis
8. xeranthemoides C. fruticosa, ramosa, tomentosa, foliis linearibus serratis  
spinescentibus, parvula terminali, radio flavo.
- aurea caule dichotomo, calycibus terminalibus inque dichotomis  
sessilibus aureis

involucrata *Carduus Desfont*

Habitat in *Marbonia Poret herb-Desfont*

Altior quam in *India et Poret*. Flores plures, solitarii, duplo majores quam in  
*India* folia, cuncti foliis lanceolatis, pinnatifidis, margine inequaliter pinnato-  
serratis: lacini lanceolati in apicem depressi

uniflorus *Poret*

acaulis C. caule uniflore flore brevior Kun. S. V. p. 720

Chamaeleon albus Clus. hist. 2. p. 155. Cam. epit. 420

Cardina acaulis, magno flore albo Bauh. 300

Habitat in Italia, Germania, Hispania montibus apricis &

Caulis plerumque nullus interdum prostratus in cultis palmaris

altitudine foliorum inferiorum. Folia radicalia petiolata

penetratiffida, <sup>alterna</sup> ~~et~~ <sup>alternis</sup> ~~et~~ tamen undata: lacina lanceo-

lata dentata incisae dentibus spinosis. Stems magnus sessilis

calyx arachnoideus. Corollae linearibus erectis aequalibus spinosis

dentibus spinosis trifidis intermediis ~~et~~ spinulosis lobatis <sup>intermediis</sup>

integerrimis longioribus explanatis argenteis extrorsum paraflexis

liber

β caulescens

Cardina caulescens magno flore albicante Bauh. pen-

300

acanthifolia P. foliis aciculis <sup>507</sup> foliis pinnatis <sup>pinnatifidis</sup> lanato-subulcanis  
Carlina aciculis, foliis <sup>40</sup> ~~pinnato-pinnatifidis~~ <sup>Tomentosis semipinnatis</sup> plicatis, serrulatis  
pungentibus Mesp. Taurin. 5. p. 67. n. 55.

Carlina acanthifolia All. fl. ped. n. 571

Carlina chardoux foliis aciculis foliis pinnato-pinnatifidis  
palearum segmentis subulato-invasatis, radice bienni  
Habitat in alpebus Valdesperibus ♂

Simili Carlina aciculis & versa radice perenni foliis latioribus  
ad coctam non fertur ~~fertur~~ fertur <sup>fertur</sup> magis tomentosi.  
Radix alba nitida

Carlina utzha Haquet Plant. alp. Carn. p. 7. Tab. 1. n. 1  
Cui radix perenni  
lobi oblongi subpinnati

evolvinata P. caute unifloro flore longiore calyce aures folio  
Sprengis ob Vallato Parr. 8. 2. p. 234.  
Hab. in Barbano

multis rictis

Cupressoides. Tuicus frond ~~et~~ dichotome ramosa, foliis integ. indivisib., surculis  
repentibus

Tuicus cupressoides, caule brevi ramoso, ramis iterum dursis,  
fronde triangulari, in junioribus quasi imbricata, caule et  
radice repente West. Mscpt. litt. G.

Radice unguiculari, apice <sup>in</sup> fibris simplicibus divisi,  
Surculi longe repentes, straminei vel viridi <sup>ventos,</sup> florescentes, <sup>(bidentate</sup>  
collabentes. Stipites erecti, cum fronde palmato, <sup>vel utro</sup> alterni, ramo  
ti, supra basin aphylli, ramosi: rami alterni, distantes, infe  
rioris basi aphylli, superiores foliosi, <sup>di yttali</sup> ~~digitales, pectentes, qua~~  
~~tri vel quinquies dichotomi: ramuli foliosi frondes~~  
Troni digitali quadri vel quinquies dichotomi, <sup>tri quetro</sup> triangulari  
ramo altero longiore altero breviora, <sup>triquetra,</sup>

*Dichototomo superne lanato* stellantisque solitariis  
lanata & caule bifido, calycibus sanguineis terminalibus. primo acellari sessili heri  
I. V. p. 720\* Spec. pl. p. 1160\*

*Ac. anthoides* parva apula Col. ceph. 1. p. 29. t. 27. fig. 2.

*Ac. arna* flore purpureo rubente patulo Bauh. pin. 379.

*Ac. arna* atracyliidi folio, amplo flore Banel. ii. 403

*Cardena* flore purpureo rubente patulo Gand. ait. 36. t. 21.

Habitat in Italia, G. Narbonensi ☉

*Caules* <sup>rigidi</sup> ~~terres~~ <sup>superne</sup> ~~lanato~~ - *Tomentosi*, *Dichotome* *ramosus*.  
~~caulis~~ <sup>terres</sup> *Folia* <sup>terres</sup> *amplexicaulia* *fructu* *dentata* *spinosa*, *rigida*  
*nervosa*, *venosa*, *inferiora* *state* *glabra* *superiora* *lanato* -  
*tomentosa*. *Flores* *in* *dichotomia* *et* *in* *apice* *solitarii* *sessili*  
*obvallati* *folii* *structura* *foliorum* *caulis*. *Squamae* *calycis*  
*retinaculo* *in* *spina* *deprenti* *interiori* *parum* *laeviores*  
*radiales* *externi* *purpurei* *sepi* *effertis* *intus* *sanguinei*  
*spina* *calycium* *implet*

*Carlina* *pola* Haquet. *Plant. alp.* *Carn* p. 16. t. 4. no 3. *hinc*  
*absque* *de* *caulis* *retinet*

aurea ♂ caule dichotomo. calycibus Verminalibus inque dichoto-  
mis sessilibus aureis  
Habitat.



Carduus

affinis Curt. Tab. 4. fig. 1. Hall herb

dicifolia C. caule ramoso foliis floribus terminalibus sessilibus aureis, foliis oblongis dentatis spinosis  
Habitat in Regno mauritano Schousboe

paraseticus Turcis. frondibus filiformibus <sup>ramulis ramulisque</sup> confertis ~~sebaicis pubescentibus~~  
~~fructificationibus apertis uncinatis fructificationibus globosis~~  
~~at illanibus~~

Turcis paraseticus. Caule filiformi, angulato, ramosis pro  
ramulis confertis capillatibus. foliis pubulatis, acute denta  
tis, tuberculis proculis at illanibus. Uscio in extremitate  
ramulorum carnosio simplicis, quo alius allegatus plantae  
West. Insept. A.

~~Prox. valde ad Certhiolum accedit. Habitu venum alienum  
habet quamvis difficile dictu, dignatur tamen quod ram  
magis erectatis, multo carnosior ramis ramulisque profertim  
ultimis copiosis simis approximatioris nec distantibus denique  
fruct  
ma est nisi varietas~~

~~diversus a flagynoida quod Nephulo non latera  
unicum occupat nec ab utroque latera~~



calyci nec longioribus. Caulis glaber. Rami simpliciter, patentes, 1-3 flori. Calycis tomento  
si. Folia usque linearia - lanceolata, sparsa, etate glabra, pubes pubescente herb. Musf.

vulgaris C. caule multifloro corymbose, floribus terminalibus, calycibus radio fla-  
vescente (albo lin) Lin F. V. pag. 729

Atractylis minor Duchf. hist. 121.

Cardina sylvestris vulgaris Clus. hist. 2. p. 156.

Oniscus sylvestris spinosior Bauh. pin. 370.

Habitat in Europa montosis, aridis, sabulosis &

Pauli purpurascens superne ramis arachnoideis rami caule  
altiori. Calicibus amplexicaulis sinuato dentata spinosa.

Flos in apice ramorum solitarius. Squama lanceolata apice  
non foliata ut in sequente, spinosa spinae versus basi saepe geminis  
ultimo subulata

vulgaris Castina

sanctatem in gallia legit Dr. Schumacher caule 2-3 pedali  
foliis linearibus lanceolatis integerrimis serratis pedunculis latera-  
libus elongatis bifloris pedicello laterali altiore, Pedunculis  
caulinis unifloris

racemosa C. floribus sessilibus lateralibus paucifloris Lin. <sup>L. V. pag 729.</sup> Spec. pl. p. 1161 +  
Cardus sylvestris minor hispanica Clus. herb. 2. p. 157.  
Aearna flore luteo patulo Bauh. pin. 379.  
Habitat in Hispania desertis C.

planta sub hoc nomine in herbario an diversa vel eadem  
cum ~~figula~~ Clusi convenit satis <sup>stabilia</sup>  
Pauis subduchotomus lanato canescens uti folia et calyx  
Folia dentata per pennatipida venosa rigida spinosa. Flores in  
Dichotomia et in apice foliariis. squamis apice foliaceis et  
in corymbos modo latera minusque spinosa et longioribus  
radice pulcherrima



pyrenaeica @ caule multifloro, foliis decurrentibus multinatis ~~multinatis~~ Len Spec.  
pl. p. 1161 & p. V. pag. 794

Habitat in Pyrenaeis versus Hispaniam coniose

Habitus Onopodi, tota planta vili lanata. Folia pennata  
Pennis seplebu hastatis dentatis apicibus omnibus penna florescen  
te. Calycis vix majores cardus py. nocephalo; squamis latissimis  
erectis pennis angustis lanceolatis vix calycis longitudine flores  
purpureo-purpureo

an a Carduo cardenoides diversa

mihi haud nota

Xeranthemoides *C. fruticosa*, ramosa tomentosa, foliis linearibus subulatis: serratis  
sine pectinibus; panicula terminali, radio flavo Lin. Suppl. p. 349 \*  
L.S. p. 729

Habitat in Barrocaro circa pagum Chasna &  
Pulcherrimus fructus huius generis. Caulis appresse lanatus tener. Folia sparsa  
non decurrentia, subulata, terminata spina, margine serrata, supra  
viridia, glabra, subtus lanato-alba. Rami semipollicares  
aque divisi in quatuor foliatis. Calycis obvallati paniculis  
foliis structura caulicorum. Squamae interiores longiores, recurvo subu-  
lato serratae. Radius splendens, squamis subserratis. Flores mag-  
nitudine radicis l. c.

non vid.