

Carpinus

1. betulus Q. squamis strobilorum glabris basi lobis trilobis
2. virginiana L. foliis ovatis acuminatis, strobilis longis squamis
3. ostrea Q. strobilorum squamis inflatis oblongis basi pilosis mucronatis

orientalis *C. foliis ovato-lanceolatis serratis, strobili brevibus du Roi*
Herb. B. 1. p. 131.

Carpinus folio breviori fructu brevi
22 x 4 usque

~~name~~

Mifandra

~~1 reniformis M. foliis reniformibus crenatis
2 lobata M. foliis bipartitis incisis~~

Dionis deandro

Betula ^Q squamis prohemis planis Lin. S. V.
vulgaria: foliis ^{lobatis serratis}

Carpinus Dod. Pempt. 841. Camer. epit. 71

Astrya ulmo similis, fructu in umbellis foliaceis Beauh. pin. 427
incisa B. foliis oblongis incise serratis

Habitat in Europa

Rami teretes cortice purpurasciente glabri albedo puncta-
ti. Folia petiolata alterna, ovato lanceolata, attenuata,
indistincte serrata, glabra, 3-4 polliciana. Amara
masculina plura terminalia ciliata, foeminea. Congita-
dine foliorum squamis lanceolatis basi utraque lobo acuto
venosis, glabris. f. serpyi polliciana ^{est} totum subse-
tas

glabri basi trilobis

caroliniana *Q. squamis* prothlorum remoti patentibus trilobis Walt. fr.
Carol. pag. 236
Habitat in Carolina

non vid.

virginiana Carp. foliis lanceolatis acuminatis, strobili longissimi Mill. Det.

Du Roi Hort. haer. p. p. 130. Hort. kew. 3. p. 363.

Aceris cognata Offrya dicta flavescenti Pluk. phyt. alm. 7. t. 156. fig. 1.

Carpinus offrya p. Lin.

Habitat in Virginia &

Rami vixiter purpurascens, glabri. Folia petiolata ovato-oblonga, basi ^{marginata} tripolliciana, inaequaliter serrata serraturis acuminatis apice flavescentibus utraque vix ^{retro} rarisimè ad presertim ^{retro} in costa. Strobili sesquipedales ^{virescentes} basi peltata ^{retro} truncata ^{retro} terminata

foliis ovatis

habet sub nomine Metula a Motib. absque floribus

Dioscorea *viridis* *foliis* *cordatis* *acuminatis* *Doft. prod. p. 67.*

Habitat in *Insula* *Tanna*

Ostrya & squamis strobilorum inflatis Lin. S. V.

Ostrya ulmifolia, fructu racemose cupulo simili Bauh. pin. 427

Ostrya italica carpini folio, fructu longior s. brevior habitore Mich.
gen. 223. Tab. 104. fig. 1. 4.

Habitat in Italia

Rami cortice purpurascenti albido punctati ramuli villosi
iniani uti folia petioli et folia juvenia. folia petiolata
ovata oblonga inaequaliter serrata bi- s. tri-polliciana
ovata fere glabra ^{venis et plicata} amentum masculinum est apice plura
4 vel quinque pollicaria. squama ovata mucronata
strobili sex qui pollicari, squama oblonga basi hispida, mucrone
obtus. villos. terminata

oblongis basi ^{indegnis} pilosis mucronatis