

Panyocar

1 need i ferum Q

Caryocarpus amygdaliferum Mutis monograph. curante Cavanilles
Habitat in Regno Santa f. 5

Truncus teres erectus, 100-240 pedalis, diametro 3-4 pedali, coma am-
plissima. Rami glabri, virides vel violaceo fusci. ramuli alternatum
parum compressi. Folia petiolata, opposita, ternata: foliola b. f. 3 ped-
licularia, membranacea, lato-lanceolata, glabra, inter mediam latior, ner-
vosa, axillis nervorum subtus macula alba, villosa, attenuata, remote
ferrata. Petiolus communis teres, apice incrassatus: parviores brevissi-
mi, fruticuli 40^o infirmi, 2 majores, busiformes, basi hiantes, pedicellati
2 ad basin folioli intermediis, setaceo lanceolato vel busiformes. St-
ves terminales racemosi. Peduncululus communis semipedalis vel ultra
villosus, vili articulati, horizontales: pedicelli pollicares, apicem versus
incrassati, ibique articulati, dense villosi. Calyx 10 phyllis, cindiformis
5 partitus, deciduus: laciniis rotundo, liliata. Petala 5: annulo
filamentis adnexa, ovato-oblonga, obtusa, carnosae, glabra, viridi lu-
tes, duo parum majora, vix pollicaria. Filamenta monadelphica, numero

Supina, compressa, subulata, duplici serie a corona vel annulo germen cingent
exteriora fertilia, corolla duplo longior, interiora caespata, breviora. Antherae
rotunda. Germen superum, globoso-compressum, obtuse tetragonum. Hyle 4. sub
Cati. Stigmata simplicia. Drupa globoso-oblonga, glabra, viridis, maculis
saturationibus notata, succo oleoso fasciata, subtripollicariis. Nux. uniuers.
interdum duo, rarius 3. nunquam 4. imperfectae, 4 locularis. Nux.
Eae veni formis, 1 locularis, 1 spermis, intus fissura. Cortex interior dursi
mus, extus eminentius elevatis aculeatis mucatus. int. alter subero
sus

masifenum Cayoiar Lin Mant. 247. & R.V. pag. 504

Habitat in Barbis et Essequibo

arbor proceris folia ternata. Calyx et corolla purpurea

non vidi