

Casine

Casine?

Habitat in America? herb. Ausf.

Folia semperverentia? pollicaria, oblonga, glabra, crenulato-serrata, veno
sa. Pedunculi axillares, uniflori, fructiferi nutantes

prinosae Caspiae foliis oblongis semulatis deciduis, pedunculis axillaribus aggregatis unifloris

Habitat in Carolina herb. Tus.

Brachi alterni, teretes, glabri, punctati. Folia petiolata, alterna, oblonga, parum acuminata, utraque acuta et glabra tenuissime serrata. Pollinaria. Pedunculi breves. Flores abortu duri & nudi Cal. 5phyllus. Cor. 5partita. Stamina 5. germen abortu, interdum ista pars suppressitur. Foemina Cal. et corol. ut in mare. Stamina sterilia. Germen oratum. Stigma truncatum. Bacca 3 sperma, interdum 4-5 sperma. Prinos? an Prinos vestigellatus

Varia³⁰ secundum Michx. & datur foliis subter villosis tomentosis inanis

colpoo. E. foliis obovatis serratis floribus paniculato corymbofis

Habitat in Cap. b. spec. 5

Trami tereti glabri. Folia sesquipollicaria, rigid a subtus
venosa supra avenia, breve petiolata basi integerrima
subcordata. Panicula terminalis magna, e corymbis
brachiatis oppositi. Pedunculis communis tetragonis
Flores interdum quadrifidi.

confer mauronia et Eeon. colpoo.

colpoon Caspae foliis petiolatis ovatis crenatis, panicula longitudoine
folii Theob. prod. fl. cap. pag. 52

Habitat in Cap. 6 spec.

michi haud nota

Barbara Caspiae foliis sessilibus serrato-dentatis cordato-oblongis, ramulis quadrangulis
Lin. Mant. 220*

Habitat in Cap. b. p. 5

Folia sessilia, ovato-oblonga, subamplexicaulia, basi emarginata, venis
elevatis, glabra, nitida, serraturis exstantibus distinctis. Ramuli lateri-
bus oppositi canaliculati, angulis ad foliorum bases decurrentibus
ortis. Pedunculi axillares filiformes, foliis dimidio brevioribus, saepe
triflori Lin. Suppl. l. c.

non vidi

omittitur in Systemate. Umelini uti et in ed. St. Maur.

marginata Caspino ^{no} ^{petiolatis} foliis ellipticis crenatis apice calloso crenis glandulosis

Habitat in Angula Bortoni Thouriz

Rami cinerascens glabri, uti omnia. ~~Solia palmaria basi~~ ^{attenuata}
venosa, conata, basi integerrime, margine parum incurvato
remote crenato glandula fusca in sagula crenis, apice obtuso
minime emarginata et loco illius glandula fusca magnitudine
seminis. Petiolus brevissimus. Pedunculi oppositi solitarii pollicia
res apice dichotome divisi

an rubus Calabri species

capensis Cashne foliis petiolatis ovato oblongis retusis crenatis Lin-Suppl. p. 1024.
Mant. 220.

Celastrus theophrasti Clus. app. 2.

Dmitex oethiopicus, alaterni foliis Seb. mus. 1. p. 46. t. 29. fig. 5.

Phillyrea capensis, celastru foliis Dill. Elth. 315 t. 236. fig. 305.

Celastrus foliis subrotundis, floe fructaque satemose Burm. afr. 239. t. 85.

Habitat in Cap-bono frei

Tota glabra tam^{que} purpurascens. Folia petiolata sesqui polliciana
basi attenuata, apice emarginata a medio ad apicem obtuse remote den-
tata, rugosa, venosa. Petiolus brevis. Cyma opposita polliciana. Duha
tomo

— subovato oblongis obtuse serratis ob retusis

Cashne gaudent foliis oppositis inflorescentia axillari

maurocincia Casinae foliis sessilibus integerrimis obovatis coriaceis Lin. N. p. 295

Cerasus capensis fructu rubro, foliis fere obtusis Pet. garoph. T. 57. fig. 4.

Strangula sempervirens, foliis rigidis subrotundo Lill. Elth. 146. fig. tab.

121. fig. 147.

Habitat in Cap. b. spici

Folia glauca vicia vix petiolata opposita. pedunculis
axillari

Cas. lanicolata
emarginata
tebrosom
tricolor
venulata

Banks