

Castilleja

1. *integrifolia* C. foliis linearibus - lanceolatis integris
2. *pubifolia* C. foliis apice pinnatis - incis

integri folia C. foliis lineari - lanceolatis integris *Com. Smith. ic. fasc. 2.*
pag. 29. 7. 394

Castilleja integri folii foliis lineari subulatis integerrimis bracteisque
induratis *Lin. Suppl. pag. 293. S. V. pag. 548*

Habitat in nova Granada. 7

Caulis teres, ramosis, leviter hirsutus. folia alterna, sessilia, obtusa, nervosa, utrinque pubescentia. Stipula nulla ut in *sessifolia*. Flores in racemo terminali ramorum. bractea foliiformis ad basin singulorum pedicelli. pedicelli longiores. Calycis et floris minoris

²
2 *psifolia* ^{aptilleza} foliis lineantibus integris apice trifidis, floribus racemosis interspersis
bracteis trifidis Lin suppl pag 293. S.V. pag 540

1 *psifolia* ~~Cappellera~~ foliis apice pennato-incisis Smith u. 2. pag. 40 tab 40

Habitat in nova granada &

Caulis herbaceus suffruticosus, tripedali erectis, pubescens teretibus
subramosis. folia alterna sessilia, patentia, linearia trinerviis, polle
ciana, utrinque pubescentia laciniis 2-4 utrinque ad apicem
Flores ad apicem ramorum pedunculati, axillares solitarii. Peduncu
li pubescentis, folio triplo brevioris. Labium corollae superius longissi
mus dorso pubescens emarginatum inferius laciniis tribus minutis
acutis. glandula una inter lacinias lacinias labii inferiori. anthera
& stylo. Capsula ovata acuminata