

Casuarina

1. equisetifolia C. monoica, ramulellis flaccidis terribus, strobilorum squamis inermibus villosis, vaginis masculinis septempartitis ciliatis
2. nodiflora C. verticillis flaminum remotis
3. torulosa C. dioica, ramulellis flaccidis, strobilorum squamis villosis tuberculis exasperatis, vaginis masculinis quadrifidis
4. stricta C. dioica, ramulellis erectis, strobilorum squamis inermibus & laevibus siculis, vaginis masculinis multifidis glabris

equisetifolia Casuarina monoica ramulellis glaucis Verticibus, Arborescentibus, sicut
inermibus villosis, vaginis masculis septem partibus ciliatis Hort. Kew
3 p. 321.

Casuarina littorea Rumph. amb. 3. p. 86. t. 57.

Casuarina equisetifolia Torr. gen. n. 52. Lin. Suppl. p. 412.

Habitat in India orientali et nova Cambria Caledonia;

Rami Vertices e squamis foliaceis perspicentibus squarrosi: ramuli
adsci e teneris decurrentibus quibus angulati, glabri, articulati
articuli semina unguicularibus apice squamis quinque ovatis. ramulellis
unguiculatis squamis subulatis patentibus reflectis superne
confertioribus. Amenta masculina ex apice ramulorum
peripollinaris teretes anthera conferta. foeminei ex apice
ramulellorum oblonga nutantes.

nodi flora Cal. verticillis staminum remotis Kunth

Habitat in India orientali.

Differ floribus verticillis staminum remotis. Ramuli utriusque
eodem

torulosa & Divisa, ramuliculis flaccidis, Antheris squamis villosi tuberculis exasperatis, vaginae masculinae quadrifida Hort. Kew. 3. p. 326
Habitat in Nova caesia Australi

non vidi

Pineta P. Duvic, ramulellis erectis, strobilorum squamis inermibus gla
brifolulis, vaginis masculis multifidis & glabris Hort. Kew. 3. p. 320
Habita in Nova Zelandia australi.