

Catesba

longiflora
Sprengia

Catesba Corollis tubo longissimo, bacis ovalibus Schwartz prodr. p. 30.

Catesba Sprengia L.S.V. pag. 152.

Fructus Sprengia, buxifolius plurimis simul nascentibus, flore tetrapetaloides per
duo fardide flavo tubo longissimo, fructu ovali croceo semina parva continente.

Catesba Carol. 2. p. 100. t. 100.

Habitat in Providentia ~~et~~ herb. Fus. Et De font.

Rami teretes, glabri. Spinae oppositae, ^{an illarum} decussatae, vix pollicares, glabri

teretes, folia ad basin spinarum ^{horum ut in hanc plan} pedicellata, semi-angustipetala, interdum

ni uniflora plura oblonga, acuta, glabra, avenia. Corolla at illarum, ^{Pedunculis lobatis ut in foliis solitis} tripollicaribus, soli-
tariis sessilibus

Catesboa

Catesboa parviflora; corollis tubo tetragono abbreviato, basi subrotundis: Swartz prodrom pag. 30. Symb. bot. 2. pag. 31.

Rhamnus foliis buxii minimis, confertim nascentibus, frutis longis armata.

Roan. hist. Fam. 2. pag. 100. Tab. 207. fig. 1

Viburnum aliud

frutescens et aculeatum. Herbar. 4. usq.

Descriptioni hujus, in Symb. bot. p. 2. pag. 31 data, addo frequentia ex observatione Agarii ad fruticibus pluribus frutibus veni aspersis necumque a viro audato benigne communiatis:

+ tria frutex 3. vel spadalis, trunco vix ullo, ramosis simis, fruticosis simis. Rami

rarior opposita, opposita, decussati. plerumque trifol

folia basi acutura interdum parum attenuata, apice 3pe muicione brevisimo.

Corollae tubus exacte tetragonus, angulis acutis decurrentibus. Laciniae limbi

ante explicationem in pyramidem convixentes, 2 marginitibus spanum involutis marginatis, basi angulo extante ad basi angulo divisus: explicata lacin nio ovatis, planis demum recurvis.

filamenta basi tubi in serta, exoque facta longitudinis, glabra. Antherae lineares, erecta, limbo parum breviares

Litr. L. p. 13.

Stylus antheris vix longior, superne parum crassior, tortus, inflexus. Stigma sub bla-
mellatum, margine coloratum.

Bacca magnitudine pisi, ^{bilocularis} glabra, coronata laciniis calycis quatuor, parum incurvis,

^{bilocularis}
Semina decem in singulo loculamento, subrotundo-oblonga, saepe parum irregularia,
compressa, alteri convexa scula, altero latere parum concava, utrinque
scabru scula.

Ex his patet, Catesbeam parvifloram non modo specie, sed et genere a Scolosantho nostro differre. Cum figura hujus sit commoda in T. Enc. ^{opere ac} ~~atque~~
^{in plantis} Catesbeae quamvis haud optima, jam habetur, icones integras eam super-
vacaneas duxi, dum differentia eorum quoad plantam & figuris citatis
satis superque apparet. Structuram vero partium fructificationis, utro-
te in La Martii haud accuratam, & in Stouanci omnino desideratam,
depinxerit non abs re esse videlicet, ideoque tam Catesbea parviflora quam
Scolosanthi in Iconibus dedi.

2 parviflora Catesboea ^{Catesboea} corollis tubo tetragono abbreviato bacis subrotundis. Sw.
Schem. prod. pag. 30 Symb. bot. p. 100

Rami obscure angulati, glabri, purpurascetes.

Folia plerumque

Spinis oppositis, pollicares, patentes, decussatis, ^{et} glabris, ^{subtus hinc,}
rigido.

Folia plerumque quatuor sub singula spina, ^{subtus hinc,} ovalia, ^{marginibus} serratis,
culana, ^{marginibus} glaberrima, arena, mucronata.

Stipula parva, ^{utrinque geminata} membranacea, ovata, acuminata.

Flores sessiles, oppositi, patentes fimi.

Calycis laciniis lanceolatis, glabris, corolla duplo brevior.

Corolla vix unguicularis, glabra.

Anthera lineares, longitudine corollae.