

Catonia

Grandis

Cor. infundibuliformis laciniis limbi bifidis lobis divaricatis. Stigma septe

Macula 2

elliptica 2 latioribus elliptica lanceolatis attenuatis, racemis axillaribus  
terminalibus compositis

Habitat in India Orientali herb. bibliothecae Christianiense et  
An scandens. Rami teretes, ferrugineo tomentosi. Folia petiolata  
alterna, tri-vel quadripollicaria, patentissima vel a petiolo torto  
reflexa, integerrima, acuta, utrinque glabra, tenuis & vix obscu-  
rè venosa, pallida viridia, membranacea. Petioli ungui-  
culares, subtus caninati, supra canaliculati, saepe torti, ungui-  
culares, ferrugineo tomentosi. Pedunculi axillares, superiores,  
sesqui pollicares: pedicelli triflori; terminales & pithamoi,  
erecti & aliter erecti: pedicelli ramosi, ramis trifloris, uti caly-  
pedunculus communis, bracteo calycis que ferrugineo tomen-  
tosi. Bracteo parvo, subulato. Calycis ~~sepalis~~ <sup>sepalis</sup> Corolla et stami-  
na, ut in priora. Germe oblongum. Stigma subtriloculatum,  
latitudine germinis

Affinis priori, differre tamen credo foliorum <sup>is</sup> lanceolato-ellip-  
ticis, duplo vel triplo longioribus, in <sup>bus</sup> embracis, racemis termina-  
libus longioribus compositis

aurita ~~Salvia villosa~~, foliis ovatis dentatis auriculatis, floribus verticillato-spicatis  
~~Vp. 72. 49. Suppl. p. 80~~  
~~Habitatio Cap. b. spei~~

non vidi.



