

Caucalis

1. grandiflora C. involucri singulis pentaphyllis: foliolo unico duplo magno
2. latifolia C. umbella universalis trifida: partialibus pentapermis,
foliolo pennatis serratis folio foliolo lanceolatis serratis
3. daucoides C. umbellulis trifidis aphyllis, umbellulis tripermis triphyllis
4. leptophylla C. involucri universalis nullo, umbella bifida, involucri
pentaphyllis
5. montana C. involucri universalis monophyllo, partialibus triphyl
lis
6. orientalis C. umbellis patulis, foliolo partialibus supero ac compo
sitis: laciniis linearibus feminae setis ac glandulosis
7. platycarpus involucri involucrique triphyllis, umbellulis tripermis
8. parvifolia C. umbella ^{tri}quaesida: umbellulis subtri per mis folio caule
9. anthriscus C. umbellis ~~confertis, foliolo ovato lanceolatis pennatis fidis~~
involucri polyphyllis, seminibus ovatis stylis reflexis folio de
compositis: foliolo extimo lineari lanceolato

10. helvetica C. involucrio univesali subnullis, feminibus ovatis, stylis reflexis
foliis decompositis: foliolo extremo linear-lanceolato, caule ramo
sesimo

11. nodosa C. umbellis simplicibus subsessilibus, foliis supra decompositis

lorensis Caucasus

Habitat in Cap. b. sp. dedit La Mant

helvetica \odot involucrio universali subnullo, umbella 3. ad decempida, involucrio
li a tribus ad quinque, ramis fructe & variatis Lin. - V. pag. 276. Faerq
hort. 3. opp. 16.

Habitat in anglia, Helvetia
avenfo Cauc. involucrio universali subnullo, seminibus ovatis, stylis reflectis, foliis
decompositis: foliolo ultimo lineari-lanceolato, caule ramosissimo Hort. kew

1. p. 374

Similis T. anthriscu. Cauli subpedalis, verso superne ramis patentissi-
mi. Folia bipinnata pinnis lanceari lanceolatis inciso
serratis pilis adpressis raris. In etas minor quam in
reliquis hili ha glomeribus facta.

Caulis angustifolia: folia multifida angustis, comphylli
formibus, involucrio utroque, germine & seminibus
bispidis Bosph. & esp. pag 206.

Caulis

Caulis ad nodos florum hesperica

Habitat in hesperica herb. mus.

herb.

rigida Caudalis

Habitat in Peru? herb. Fusf.

Caules plures, pedales, erecti, striati, scabri, inferne subpilosii. Solia 3 pennata,
pinnis incisis, trifidis, integris, brevibus, linearibus, rigidiusculis, utroque latere
nervis albidis adpressis. Involucra 6 phylla: foliola pennata: pinnis linearibus indivisis
Radii umbellae plures, inaequales: involucri cellae subulatae, brevibus, indivisis. Flosculi
omnes fertiles. Semina oblonga, setis rigidis & angulosis; sulcis elevatis longitudinalibus

ventraliter ciliatis
an potius Dani freres

orientalis Paucalis umbellis patentibus, foliolis partialibus supra decompositis laciniis
laciniulis linearibus Lin Mant. 351 + S.V. p. 276

Paucalis procerior Chalepiensis ferilacis folio, flore albo Monf. h. 3. p. 308 f. 9
14. fig. 5.

Paucalis Bell. ibid. lib. 3. cap. 49. p. 200

Paucalis orientalis altissima, folio Bembo Tournef. Cor. 23.

Habitat in Oriente et herb. Turf. ~~Algeria~~

Flores flosculosi. absque radio. Semina siliis exsertibus apice viscoso glande
Lin Mant. l. c.

Caulis flexuosus, teres, glaber, striatus. Pinnula parva, oculis armata
villosa. Umbella radii plurimi, bipollicares: umbellula abortiva.

Stemina flavescenter, apice saepe glandula. Bala inferiora longe
petiolata, pedalia 3 ~~pinnata~~ ^{pinnata}: penna pinnatifida: lacinae lineares
parvae glabrae, acutae herb. Turf.

folia 3-4 ^{3-4 pinnata} foliola inferiora 2-3 fida, reliqua integra, acuta, glabra. Radii um
belle univesfolii saepe 10. partiales 10. Involucrum exanimum brevis
sumus. Involucella radii breviora, lanceolata margine membranacea.
Dorculi nonnulli abortiva. Petalum 1-2, quantum a specimine
pico videre licet, reliquis parum majora. Germena glabra, loricata, hinc
diversa a Turf. et generis alius
non signata.

grandiflora C involucri singulis pentaphyllis: foliolo unico duplo majore
Linn. V. Faicq. fl. austr. 1. t. 24.

Caulalis arvensis echinata, magno flore Bauh. pin. 152.

Echinophora pycnocarpus Column. Eiphr. 1. p. 91. t. 94.

Habitat in Europa australiori inter segetes.

Caulis erectus ramosus glaber. Folia bipinnata vel sub
tripinnata glabra pinnis pinnatis profunde incis
is in laciniis inferioribus trifidis reliquis indivisis linearibus
Anvolucria pentaphylla linearia lanceolata utri
usque involucria marginibus membranacea. petala duo mar
ginalia cuneata maxima. Semina

latifolia & umbella universali trifida: pediculis pentaspermis, foliis pennatis
seratis Lin. V. Faig. bot. 2. t. 120.

Caucalis arvensis echinata latifolia Bauh. pin. 152.

Lappula caruina latifolia Bauh. hist. 1. p. 81.

Tordylium latifolium umbellae confertae nudiusculi, foliis pennatis
folioli lanceolatis inciso-seratis Lin. Spec. pl. pag. 345. Mull. Diet
Tab. 0.

Habitat in Gallia Oriente inter septem C

Caulis erectus pedalis simplex culta amplexi stratus
basi pubescens superne ex stemulibus minutis propositum
ad apicem et in radiis umbellae scaberrimis; caespitans
folia 4-5 supra penna lanceolata profunde serrata
serraturis oppositis, pollicari. extrema recurventem utrinque
pilosam - scabra petioli vaginantibus strigosi. Umbella
bis 3 radiata radiis angulatis involucri foliola 2-3
brevia membranacea. involuella 5 phylla longitudine
fere sembellata, flos sine stemulorum margine membran
acea femina plerumque 5 reliqua abortiunt. stis con gis
facti fl. petala inaequalia. stibi nonnulli abortientes

lati profunde serratis foliis pennatis folioli lanceo

japonica Caulis involucri polyphylli. Seminebus ovatis, foliis
decompositis: foliis lineariformibus pennatifidis, caule hirsuto
Caulis japonica Hort. beyr. Lin. Pl. Syst. 6. pag. 45. Tab
43. Fig. 1.
Habitat in Japonia

non vidi

Daucoides & *umbellae trifidis aphyllae*, *umbellulae trispermis triphyllae* *Lin. Sp.*
pl. p. 346 & Lin. Mant. 351. Facq. fl. austr. 2. t. 157.

Echinophora 3. *Leptophylla purpurea* *Column. Ephe. 1. p. 96. t. 97.*

Habitat mospelii

Caulis *divaricatus* *semis diffusus angulatus. Sonatus, spon-*
danea hirsutus purpureo viridens. Solia bipinnata
pinnis pinnatis incisis. Umbella 35 radiata. Involu-
cum nullum. Involucella triphylla. Clofculi non
radiati, semina ut plurimum tria divaricati. Perian-
thio coronati aculei uncinati remoti lobis.

Descriptio *Cauci: daucoidis in Specibus plant. Linn. ad platycarum pectus*

Ceptophylla C involucrio universalis subnullo, umbella bifida, involucris
pentaphyllis Lin. mant. 3^o 41.

Lappula canaria flore minore Venusifolia Monf. hort. 3. p. 305. f. 9. t. 13.

fig. 3

Caucalis ar. venis echinata, parvo flore et fructu Bauh. hort. per. 15.

Caucalis humilis Gaey. hort. 2. t. 195.

Habitat in Anglia, Gallia, Italia &

Caulis simpliciter humilis teres palmaris ~~et~~ saepe retrospum siaber
Folia petiolata, bipinnata, siabra pilis, folioli pinnatis
mutis laciniis bif. trifidis. umbella bifida. Involucra
interdum nulla interdum gemina lineari lanceolata
involucella lanceolata margine membranacea. floerum
bella non reddita albo-purpurascens. Remina urister
3. pilis glochidibus reticulatis ~~tuti~~ hippida

Lappula canaria flore minore Venusifolia Bauh. hort. 3

pag. 80.

confer *Caucalis humilis* Gaey. hort.

mauritanica @ involucris univesfoli monophyllo, pappatibus triphyllis Len l. v
Mochr. C. N. c. 1742. vol. 6. p. 401

Paucalis mauritanica vulgari simili, sed semine majore Walth
hort. 127.

Habitat in Mauritania.

michi haec nota

platycarpus C. Involucris involuelli triphylli, umbellis trifidis
umbellulis tripermis

Caucalis monspeliaca esurata magno semine fructu
Pauh. pin. 153

Caucalis platycarpus umbellis trifidis; umbellulis tri-
permis, involucris triphyllis. Lin. spec. pl. pag. 347.

Habitat in Europa Australi et Barbana C

Jacq. hort. tab. 3. Caulis interdum plures subrotundi patentem glabro
angulati semipedales. folia bipinnata pinnis
#10 pinnatim incisiva laciniis trifidis. radii umbellae

descriptio C. danc. plenumque ^{rad.} angulati basi 4^{to}. Involucris
foliola integra radiis breviora margine membranacea.
Semina magna ex parte D. muricati
hui pertinet

ad Daucium muricatum referit in novisimo Lin.
Diversa vero omnis caule glabro angulato, involu-
cris et involuelli folioli indurpi squalebus
umbellae brevioribus. Semina sesilia

nonne Caucalis major Pluf. hist. 2. pag. 201. quo eadem
a ~~Cauci~~ secundum figuram videtur ac Bellonii ad Cauc-
oriental. allata hui pertinet

5. pumila Caucalis umbella universali subquinquefida: partialibus subtripermis,
foliis superdecempositis caule que decumbente villosis
Caucalis involuero universali diphylo, partialibus pentaphyllis

Ger. fl. Gal. Prov. pag. 137. n. 4. Tab. 10.

Caucalis pumila umbellis al ternis, oppositi foliis, umbella bifida,
umbellulis sub dipermis, involuero universali diphylo, partialibus

Conium Royeni libris pentaphyllis Gouan. fl. Mon. sp. pag. 285.

fide herb. Caucalis maritima humilis pubescens, laciniis foliorum obtusis
sculis, umbellis involucriatis, fructus oratis crassis, aculeis in squa

Royeni caulis uti foliis libris flavescitibus Vir. et. 2. pag. 166.

et radiis umbellatis Caucalis muricata St. Lin. S. V. ed. 14. pag. 277.

Radiis umbella frequens ad littora maris Europaeae Italicae et Barbariae.

3-4 sonolium caulis vel rami decumbentes, uti folia, prostrata superne villosa
et semina,

centio. semina subincani.
3-5 oblonga semina sub in umbellis partialibus subsessilia, semiunguicularia
causam dentibus oblonga, sulcata, pilosa, aculeata: aculei serie quadruplici in
floris oratis acuti semine singulo semine; dorsales duo, basi dilatati, in acumine pungente

desinentis, intermedii panem longioris, uncialis fere ad marginem utrinque
cujusque seminis similes ~~dosales~~ aculei dosales modo major.

Coetenim vultu laedit: Specimina alia legi sesquipedalia, diffusa,
foliis supra de quadripinnatis, pennis pennatis fidi, umbellis prima
nis quinque vel sex radiatis, parthalibus 4-5-6 spermis, involucri
5-6 phyllis, involucriis tetraphyllis vel pentaphyllis. Exemplaria
non pauca vidi caule vix palmarum vel spithameo, foliis supra de
compositis vel decompositis, umbellis 2-3-4 radiatis, umbellulis 2-3
3 spermis, involucriis 2-3 phyllis. Hinc nota ad umbellam et Invo
lucriis difficultis. Minime vero, cum ^{ipse} Dauco mucato conjungi
tur, genere enim differt a Dauco.

^{Rauisale}
africana ~~Gen~~ umbella trifida, umbellis quinis, foliis bipinnatifidis
Lupitii Theob. prodr pag. 49
Habitat in Cap. b. pra.

Virgata C. feminibus membranaceo alatis, involucrio subhexagophyllis Poir.

N. p. 133

Habitat u Babana

non vide

glabra C. glabra, foliis impinnatis, floribus omnibus pedicellatis
involucris tridentatis Torr. Depr. pag. 206

angustifolia C. folia angustata multiped. involucrio univesali partibus
libusque hippedi Torphi. Desir pag 206
Habitat in Ambra

mehi ynote

anthropus T. umbellis confertis, foliulis ovato-lanceolatis pennatifidis Lin. T. V
p. mart. 350. Fl. austr. 2. t. 142.

Caucalis femine asper, flosculis rubentibus Bauh. prod. 10.
pen. 152.

Caucalis minor, flore rubente Monf. hist. 3. p. 300. f. 9. t. 14. fig. 10

Habitat in Europa septentrionalis arvis rudicatis ♂

anthropus Cav., involucri polyphylli, feminibus ovatis, stylis reflectis
foliis decompositis: foliolo extremo lineari-lanceolato Hort. kew. 1. p. 335.
Caulis erectus bipedali subulpime striatus scaber folia petio-
lata bipennata pinnis lanceolatis decurrentibus serratis
velutis. flores albedo purpurascens radii umbella
scabra. femina minor quam in reliquis

nodosum Umbellis simplicibus subsplibus, seminibus exterioribus hispidis Lin. S. V.
Gaerq. fl. austr. s. app. V. 14.

Caucalis nodosa, echinato semine Bauh. pin. 153. prod. 10.
Bauh. hist. 3. p. 13.

Habitat in Italia, Gallia, Barbaria ad vicos et in agris

~~umbellis simplicibus subsplibus, foliis supra decompositis
Caucalis involucris polyphyllis, seminibus ovatis, stylis reflexis, foliis decompo-
sitis: foliolo extremo linear-lanceolato. Hort. kew. 1. p. 335~~

Caulis plures prostrati teretes glabri striati. Sape pedales
ramuli superne uti folia pilis adpressis. Folia petiolata
bipinnata, pinnis lanceolatis pennatis in ipso lacini
lineantur petioli vaginatis. Umbella oppositifolia
semina sicuti glomulis testa interdum omnia interdum
extima sicuti interiora mucinata

P. tenuifolia
infesta (P. andersonii) | Bankij
Strongylo