

Ceanothus

1. americanus C. foliis ternerviis ^{crenatis} subtus villosis, pedunculis foliis longioribus; umbel
2. asperius C. ^{lis racemosis} foliis ovatis utroque latere nitidis crenato-serratis, racemis foliis brevioribus.
3. africanus C. foliis lanceolatis enerviis, obtusissimis, racemis foliis brevioribus.

microphyllus *Ceanothus*

Habitat in Carolina hort. Celfi

Caulis ^{rami} ramosi alterni

macrocarpus - *Ceanothus* foliis cordato-subrotundis obtusis triplinerariis,
corymbis axillaribus Wedd. spec. pag 1114

C. macrocarpus caule fruticoso, foliis ovatis subcordatis
denticulatis Cavan. ii. 3. p. 30. tab 276.

Habitat in Nova Hispania &

non vid.

7 africanus [♀] foliis lanceolatis enerviis, stipulis subturdis Lin. t. V.
mant. 342.

Alaternus africana, launiferrata foliis Com. prol. 61. 7. 11
Ricinoides africana arborescens, foliis phyllisae longifolia
ferrata Seb. thes. 1. p. 35. 7. 22. fig. 6.

Habitat ad Cap. b. spec. 7

Alaternus hypericensis s. africana, launiferrata odorato stapaleano
foliis Plukn. tab. 126. fig. 1.

Tota glabra rami obscure angulati. Folca petiolata alterna bi
nollucaria supra arenia subtus pallidiora venosa remote obtuse
ferrata obtusissima, fere emarginata. Racemuli axillares foliis
brevioris. Stipulae deciduae

— ferratis

Americanus C. foliis trinerviis Lin. l. V. Mill. Dict. t. 26. Duham. arb. 1.
p. 130. t. 51.

Euonymus novi Belgii, cerni feminae foliis Com. hort. l. p. 167. t. 26.

Euonymus, perubini foliis, carolinensi, fructu parvo fere umbellato
to Plukh. alm. 139. t. 20. fig. 6.

Habitat in Virginia Carolina

Rami teretes, glabri, purpurascens. folia petiolata, alterna ovata
obtusata acuminata serrata supra glabra subtus molliter villosa
Pedunculi axillares inferi basi ramis parvis longitudinaliter adnati
foliis unlongior. flores umbellati racemosi. umbello confertim appropi-
nata, solum canaliculatum subinferioribus

Americanus C. foliis trinerviis subtus villosis, pedunculi folio longioribus floribus
umbellato racemosis.

2 *aphaticus* C. foliis ovatis enerviis Lin. LV

Grassularia speciei vidua, baccis in racemo congestis fradiceis, foliis
Crenatis ovato-acuminatis. Burm. zeyl. III. 4. 40.

Sperto Thiophrasti similis fructus indicus, latiori folio Pluken.
alm. 350. t. 63. fig. 2?

Habitat in Zeylona

Ceanothus racemifolius brevioribus Lin. fl. zeyl. 90*

Rami vertes, purpurascens, glabri, uti tota planta. Folia
reticulata, ovata ^{ante adhepta obtusa} ~~acuminata~~, alterna, utroque glabra supra
nitida altera ~~venosa~~ ^{nerviis}, subtus pallidiora obscure venosa,
Crenulato-serrulata, acis sicut *Psychotria*. Racemuli axillares
foliis brevioribus

aphaticus C. foliis ovatis utroque glabri attenuatis serratis racemulis
axillaribus foliis brevioribus

Tubanther Commerson herb. Gu.