

Cecropia

l. peltata Q.

peltata Cecropia Am. acad. s. p. 416. ⁴ Argem. obs. 2. t. 46. fig. 4

Ambayba Manogr. bras. 91. Diff. bras. 147.

Tecusunnamensu melibifido folio superna parte ad medium
liatro, areola densa canugine molli Plukn. alm. 146. t.
243. fig. 5.

Yanuma Ored: Sloan herb. 1. p. 13. t. 1. p. 8. fig. 2. et tab. 99.

Habitat in Jamaica calidioribus sylvis

Folia peltata ~~peltata~~ 5 vel 8 lobata, lobis
ovatis acuminatis denticulatis supra sic ut her. rami
Puber. tomentosi inanis nervis et venis fibratis

Digitata Cecropia foliis Digitatis

Habitat in Guinea 73 est 5.

Arbor folia petiolata: foliola umbellata, sessilia ²⁻²⁰ subpithamea, lanceolata, acuminata, integerrima, supra glabra, subtus iniana
et tomento lana, oblique sub costata, inter costas pulchre venosa. Petiolus
compressus, basi ad in sertionem dilatatus, oculo armato sub villosus.
Stipula maxima, subpithamea et ultra, ^{partis formis} involvens pedunculum
cum folio; coriacea, rigida, extus pilosa, intus a pilis adpressis co
nodis primis hirsuta, sordida sericea. Pedunculi axillares Teretius
culi. Amenta in pannicula contracta, globosa, magnitudine Pyris
nigr

glabra Melastoma folius elliptico-lanceolatis integerrimis acuminatis gla
bris lobatis, racemi ^{compositi}

H. Melastoma glabra ~~Boott.~~ ^{positis}
Habitat herb. Musci in Societate usque ~~in~~ Herb. Musci 3

Rami teretes, superne quaterni, 7e Tragoni, glabri, cortice fusco. Folia
petiolata, bipollicaria, utraque glabra, costa triplinervi, nervi tuta
ruleri venis pini, pallida vicia, obscure transversim venosa et nervosa
integerrime acuminata. Racemi terminalis, compositi, breves. Pedun
culi purpurei. Flores 3. pedicellati. Calyx glaber.

Folia scabra et trinervi habet differentia, et secundum specimen ab ipso Buffonis com
muna glabra; foliis integerrimis trinervi elliptico lanceolatis scabris,
et alijctus curium esse Boott. prod. p. 34