

Pedreles

odorata

Pedrelo

Habitat in Senegal herb. Guj.

Rami teretes, glabri, cortice pumicato. Folia petiolata, praesae pennatae cum pari quadrangulari, pedalis : foliolo petiolato, alterna, 3-4 pollicaria, oblonga, basi auctiora et altero latere baseor subbreviora, integrimina, ut rufa, glaberrima, levigata, pallide viridia, obtusa. Petiolis supra planis, basi crassior. Pedunculi in apice conferti, frithandi, compressi. Racemi decompositi. Flores glabri. Calyx brevisimus : foliolo s. rotundata. Petala oblonga. filamenta in tubo corona ~~de~~, apice membranaceo. Anthers que latere int. enori. Tres tubus globosus magnitudine somni minoris quadrivalvis, ⁴ loculis, ad apicem dehiscentia valvulis oblongis, acutis, crassis, lignosis, semina imbricata. Stigma nelta tuum

allcaica Pedrola

Habitat in LIMA Dombey herb. Aug^r 3

Arbor ex calpa, rasta! solea pedalia, pinnata cum pari, spigo. Soliola petiolata,
ovato-oblonga, 3-4 pollicaria, attenuata, integriforma, basi pubescentia, venosa,
integre glabra. Petioli crassiti fere penno arferio, crenati, raro pernitati.
Racemos pedatis, supra decompositi: pedunculi patentia, sparsi, distantia. Colpis
soliola rotundata. Petala oblonga, extus villosa, albo-lutea. Stamina 5 que di-
stincta, basi coherentia. Capsula orata, quinque loculari, quinque valvi,
semina numero 5, alata. Receptaculum liberum, lignonum, quinque angularis.
Rami recentes calceum redolent Dombey.

odorata Cedrela Lin. Syst. V. p. 241

Pedrus barbadensis, a lati frustis foliis Plath. alm. 92. t. 157. fig. 1.

*Pruno forte affinis arbor maxima materia rubra lata, odorata Sloan h. 2 p. 120.
t. 220. f. 2.*

Pedrus barbadensis, a lati frustis foliis Plath. alm. 92. t. 157. fig. 1.

Cedrela Cedro Loeffl. Pl. 103.

*Cedrela foliis pinnatis floribus late racemosis, ligno cavi odorato Brown
jan. 15. t. 10 fig. 1.*

Habitat in America meridionali.

Flores paniculati Lin.

non vidi