

Celastrus

4 numes

1. alatus C. ramis alatis
2. fructus C. ramulis erectis ^{oppositis} fructis, foliis ovatis acuminatis serratis, pedunculis parvis unifloris.
3. procumbens C. procumbens, foliis ovatis serratis, floribus axillaribus subsolitariis
4. venustus C. foliis obovatis serratis, pedunculis axillaribus unifloris solitariis
5. acuminatus C. foliis ovatis acuminatis serratis, pedunculis axillaribus unifloris caule erecto lato
6. lucidus C. foliis ovalibus nitidis integerrimis marginatis, pedunculis axillaribus unifloris
7. filiformis C. foliis lanceolatis integris, ramis filiformibus, pedunculis axillaribus unifloris
8. punctatus C. ramis scandentibus punctatis, foliis ovatis serratis

- 9 orbiculatus C. foliis rotundatis acuminatis serratis, pedunculis axillaribus trifloris
10. cuneatus C. foliis oppositis cuneatis - lanceolatis integerrimis, pedunculis axillaribus
 subbifloris
11. retusus C. foliis ovali-lanceolatis subretusis crenato-serratis, cymis axillaribus
12. bullatus C. foliis ovatis integerrimis, paniculis terminalibus
13. scandens C. caule volubili, racemis foliis ellipticis serratis racemis terminalibus
14. myrsifolius C. caule erecto, foliis ovatis serratis, racemis lateralibus.
15. microphyllus C. foliis ovatis obtusis integris, cymis terminalibus dichotomis.
16. floridus C. ramis verticibus, foliis lanceolatis obtusis subserratis, cymis lateralibus
 alternis, ^{an hinc inde}
17. glaucus C. foliis ellipticis subserratis acutis, cymis axillaribus foliis oppositis
18. edulis C. foliis oppositis alternisque ellipticis serratis
19. polygamus C. foliis ovalibus vel oblongis integerrimis obscure dentatisque
 cymis axillaribus elliptico lanceolatis
20. undulatus C. foliis suboppositis alternisque integerrimis undulatis, racemis
 terminalibus congestis
21. octogonus C. foliis ellipticis angulatis subnervosis
22. caspoides C. foliis ovatis utroque acutis late dentatis

22. *obtusatus* C. foliis rotundatis

xx *Spinosi*

23. *parviflorus* C. spinis nudis, foliis ovatis drenatis, pedunculis filiformibus foliis
congruentibus ramis teretibus

24. *pyracanthus* C. spinis nudis, foliis lanceolato ovatis utraque acuti superne
serratis

25. *buxifolius* C. spinis foliosis, ramis angulatis, foliis obovatis drenato-serratis
obtusis

26. *integrifolius* C. spinis foliosis, foliis ovatis obtusis integerrimis

27. *linearis* C. spinis foliosis, foliis linearibus integris.

Euonymodes - *22* & *Prunus*.

pyracanthus @ *pruni* nudis, ramis teretibus, foliis acutis *Lin. Spec. pl. pag. 287*
mill. dict. t. 87.

lycium *ethiopicum*, *pyracantha* foliis *Com. hort. 1. p. 163. t. 84.*

Euonymo affinis *ethiopica*, *lycii* foliis & aculeis fructu *Euonymi*

Plukh. alm. 139. t. 200. fig. 5.

Habitat in Cap. b. *Spei*

Rami teretes purpurascetes

alaternus sempervirens africana foliis lucidis spinosa *Plukh.*
tab. 126. fig. 3.

alaternus arbuti foliis lucidis promontorii bono *Spei* *Plukh.*
tab. 126. fig. 2.

affinis *buxifolia* Rami teretes purpurascetes glabri uti *Stea*
planta folia ovata lanciolata utrinque acuta superne serratis
acuminatis ut sepe spinosis seu inferne integerrima, uti folium
totum rariis, supra arena sesqui pollicaria. Cyma axilla
ris interdum pedicelli umbellati floris majores quam in
buxifolia. Pedunculi bis divisi, plerumque

pyrac. utrinque acutis superne serratis — — foliis lanciolato serratis
Plukh. 202. 126. fig. 2. 5.

buxifolius & spinis foliosis, ramis angulatis, foliis obtusis Len. Spei. pl. pag
24

2057

Lycium portoricense, buxi foliis angustioribus Pluken. alm. 234. f. 202.

fig. 3.

Habitat in Cap. b. spei

Totus glaber. Rami glauci virens. Folia sesquipedalia infer-
ne in petiolum attenuata, glauci virens, ^{superiora} ~~obtusis~~ subvenosa
pinnatis ^{obtusis} ~~obtusis~~ in ramulis junioribus semiunguiculatis. Pyna
axillares sespiter dichotome plures divisa. Flores flavae

aliam e cap. b. spei communicavit d. Bulow. hinc satis simili
differt modo foliis cuneatis angustioribus, sed saepe crenato serratis
in floribus minoribus

buxifolius C.
obtusis

foliis obovatis crenato serratis

Pluken 202 fig. 3.

integri foliis Celastri fruticosi, fruticuli foliis, foliis ovatis obtusis integerrimis, cy
27 mis lateralibus Lin. Suppl. pag 153. S. V. p.
Habitat in Cap. bono frei

Linearis *Celastrus spinosus*, spinis foliis, foliis linearibus integris Lin. Suppl. p. 153.

26

P.V. pag.

Habitat in Cap. bonae spei

non vid.

cochenillifer. C. foliis uterque mis glabris pedunculis multiflo.
Habitat in India orientali hinc, Kottler, Saldorf
Rami teretes glabri alterni patentissimi parum flexuo-
si spinoso alternis pollicares rigide aphylli. folia
petiolata alterna basi acuta obtusissima subionacea
avenia nervosa aggregata pollicaria vel bipolli-
ca pedunculi axillares breves pedicelli tres vel quatuor
capillares basi bracteati pedunculo longiores.
Capsula trivalvis glabra, magnitudine nisi

capitulum foliorum. folia lanceolata obtusissima basi acuta nervosa
Saldorf

mucronatus P. foliis palmatis pedatis: lobis ciliatis, apice mucrona-
ti, pedunculis flori Torp. prodr. fl. Austr.

~~Halimifolius~~
volubilis

non videtur

Dilatatus C. foliis obovatis cuspidatis apice serratis glabris. Humb in Act Sci Lin

non v. de

crenatus (folia ovata crenulata, cymis axillaribus Thunb. Forst. prodr. pag.

19

nov. 18

Dubius *C. spinis oppositis nudis foliis oblongis glabri integerrimis oppositi*

Habitat in India orientali La Mart.

Rami glabri cinerei spinis validis patentibus fere pollicari-
bus in axillis foliorum. folia unguiculata petiolata. pedunculata
ex axilla folii inter spinam et folium multiflori flores minuti
Calyx 4fidus

an hucus generis

rotundifolius C. folius subrotundis dentatis petiolatis Thunb. prod. pag 42
Habitat in C. b. spici

myrsinifolius. C. spinis alternis foliis obovatis emarginatis integerrimis
Habitat in India orientali La Mart. 5.

Rami teretes cortice cinereo folia in spinis petiolata vix
unguiculata glabra basi acuta subtus glauca arenia
fructus magnitudine seminis Conandri
ex lupis generis

69 undulatus Cel. inermis foliis suboppositis lanceolatis undulatis capsulis bival
ribus polypermis ~~Cheris~~ f. angl. n. s.
Habitat in ~~Isula~~ Borbonica 5

multiflorus C. spinis inferioribus longissimis, ramis parvis subsulcatis, foliis obovato
rhomboides, cymis lateralibus multifloris. K. Mark.
Habitat in Africa
Folia denticulata.

non vid.

Senegalensis C. Spinis foliosis, ramis verticibus, foliis ovato oblongis inaequaliter
dentatis, cymis minimis paucifloris La Mark.
Habitat in Senegal. 5.
folia glauco viridia

repanda 7. foliis cordatis oblongis repandis, pedunculis ramosis cymosis Spec. pl. 1668.
Linn. S. V. p. 205. Faun. Amer. 13. tab. 20.

Habitat in America

repandus 8. foliis subcordatis ovatis acuminatis repandis, pedunculis racemosis
cymosis, flore tubuloso lenisyl.

^{Tort.}
Catha. ~~l. c.~~ ^{est} ~~post~~ l. c. Habitus Celastri, folia in eduli opposita vel alterna sunt, in ^{quibus} ~~quibus~~ genere Celastri, striatus vel tamen et alatus Thunb. habent, notatu vero dignum ^{est} ~~est~~ quod folia in C. eduli absolute opposita non dici merentur, oblique enim opposita ~~sunt~~ ^{sunt}. Proterea, funis in parvifloro intra foliaceos sunt, aequae ac in bustifloris. Pedunculatio bifida etiam commune habent cum omni Celastro pedunculis divisis. Fructificatione in plurimis convenit cum Celastro; nam in parvifloro stigma sessile tuberculatum est, et in variis Celastri, acutum quidem in eduli secundum Tort. ^{etiam} Cum vero in omnibus aliis characteri Celastri respondit, non dubito quin huius generis sit.

13-14 purpuriflorus Celastrus spinis nudis, foliis ovatis crenatis, pedunculis feli formibus foliis
22 longioribus.

Catha fruticosa; foliis ovatis Dorsth. Desf. pag. 64.

Habitat in arboribus

Rami teretes, nusquam rufescentes, superne vix glauci.

Folia petiolata, alterna, ovata, ~~retrovata elongata~~ glabra, venosa, obtusa, crenata, basi integerrima, rarius undulata, bipollicaria.

Pediculus brevis. Spinis intra foliaceis, axillis ~~supra~~ ^{et} inferioribus; subulato, semipollicares.

Pedunculi axillares solitarii, feliiformes, foliis longiores, dichotomi. Squamula minuta, ~~stipitata~~ ^{ad} basin pedicellorum.

Stylus nullus. Stigma subtrifidum.

Character Celastris Ell. à Linn. ^{de} Nectario filis; germen vero receptaculo

magno plano decem foveis notatum immersum ^{est}, ~~est~~ ^{habet} ~~est~~ ^{Charact. tar generis} Gen. pl. pag. 107. quod idem

est cesp. ac nectarium cyathiforme inter stamina et germen annulatum a germine divergens margine undulatum, inter stamina et germen ⁱⁿ ~~est~~.

~~9. foliis ovatis crenatis~~
~~10. foliis ovatis crenatis~~
~~11. foliis ovatis crenatis~~
~~12. foliis ovatis crenatis~~

²⁰ Caspinoidea *Belastus inermis*, foliis ovatis utrinque acutis, base dentatis perennan-
tibus, floribus axillaribus. Hort. bot. Angl. n. 2. t. 16. Hort. Kew. 1. p. 271.
Habitat in Canariis.
Rami teretes glabri. Folia obtuse ex trochum obtuse serrata
retrofoliata utrinque glabra pollicina

utemur describendum et ~~in~~ inquir. num mea L'Hereteni vis cades

19 Octagonus Cel. inermis foliis ellipticis angulatis subnerviis perennantibus,
Capsulis bivalvibus monopermis. L'Herit. Journ. Voy. Angl. n. 4.
Habitat in Peru 5.

non vid.

undulatus
18. Senecio Del. inermis foliis lanceolatis integerrimis undulatis, racemis ^{terminalibus congestis} axillaribus &
Habitat in Insula Bourbonica Tuscana &
Rami teretes, cortice punctato, glabri. Siliqua petiolata & spissa, bis-tripol-
licaria integerrima, glabra, utrinque acuta, basi ⁱⁿ ~~in~~ versus parum
attenuata lato lanceolata, obscure venosa. petiolus pollicaris
Racemi longitudine petalorum duum flori flori longitudine pedicello
nem, bractea minuta ad basi singuli pedunculati

Q. undul. inermis foliis suboppositis lanceolatis undulatis corymbis
bivalvibus polyspermis L'Heur. Sect. angl. no 5

ab undulato non diversa Senecia La Mont.

Celastrus

7 & Dulcis Celastrus inermis foliis oppositis alternisque ellipticis serratis, cymis axillaribus

dichotomis

Catha dulcis Booth. de fr. pag. 63.

Sit. Fr.

Rami Cortice cinereo, inferne teretes, superne alternatim compressi, sub foliis dilatatis. Ramuli articulati, alterni

26.

Folia opposita petiolata, ~~et~~ alterna, in ramulis opposita, elliptica, obtuse serrata, glabra, venosa, obtusa, sesquipollicaria.

Petiolus brevis

Pedunculi oppositi, dichotomi longitudine petiolorum.

17 habitat in umbra

Corniculatus Celastrus foliis ovalibus integerrimis perennantibus,
cappula tricorni & Herb. pag. 6.

Breyn. w. tab. 22 fig. 3. Eucynurus africanus

Burm. afr. t. 97. fig.

Cap. 6. fig. 3

Habitus Euclea

Euclea micrantha es

~~Pumilus
radix w
Euclea burserii
Sphora caryocarpus
Gonolobus~~

phyllofolius Calastus

Habitat ad fretum magellanicum Commerfon herb. Thouni 4

Rami teretes, glabri. Folia sessilia, sparsa, sesquipedalana, lanceolata, utrinque acuta, subovata, rigida, arena, enervia, teretia, remote serrata: serraturis subglandulosis, basi versus integerrima. Flores axillares, aggregati, breviter pedunculati: pedunculi uniflori. Capsula parva, lobis, 3nangulatis, tribrin² lobis

habes

Splendens Celastrum

Habitat in insula Francisco Herb. Thouni.

Rami prostrati, glabri, teretes uti tota planta, teretes. Folia petiolata, opposita, semipollicinaria basi acuta. Pediculi axillares, sim

populifolius Celastrum

Habitat herb. ha Martini

habeo

Trigynus Pelastus

Habitat herb. La Mantia

Folia oblonga, ovata

Populi folium Celastri

Habitat in Cap. b. spec. herb. La Martini

Inermis. Rami ^{et} ter glabri: ramuli angulati. Folia petiolata, alterna, ovata,
attenuata, ^{glabra} remote serrata, supra acuta, subtus obscure venosa. Pedun-
culi axillares, ^{lob.} solitarii, b. flori.

pleurocarpus Celastrus

Habitat in Carolina herb. Ruck.

incrasatur Celastri

Barb. de melle capula. Franc. Com. mesf. herb. Guss.

Rami cortice cinereo, punctati, glabri. Folia petiolata, fraxa, lanceolata,
acuta, bipollicaria, utrinque attenuata, margine incrasata, undulata.
an varietas Celastri undulati?

Cucumis Pelastri

Habitat herb. Desfont.

Rami superne angulati, inferne teretes. Folia petiolata, vix pollicaria
oblonga, coriacea, venosa, glabra, acutiuscula, pallide viridia. Peduncu-
li axillares, plures, terni, uniflori, folio triplo breviores

Pelastus?

Habitat in insula Francica Comnes. herb. Husf.

Tota glabra. Rami quaterni, subsedivellati, tetragoni. Folia superne, ob-
vata, integerrima, venosa, obtusissima, emarginata, basi acuta, sesqui-
polliciana. Fructus magnitudine Pepenis. Semina duo, oblonga, nitida, dorso con-
vexa, ventre plana.

Celastrus

Sonneratia Commeson

Habitat in insula francis Commeson herb. 407.

Folia aggregata, oblonga, basi acuta, emarginata, crenata, reticulata, glabra,
venosa. Pedunculi plures, filiformes, folios breviores

B. foliis lanceolatis, utraque attenuatis ramis glaucis

V. foliis angustioribus

Senegalensis *Celastrus* foliis lanceolatis serratis glabris, paniculis axillaribus dichotomis

Habitat in Senegal herb. Lus

Rami teretes, glabri: ramuli spinescentes, glabri foliosi. Folia subreticulata, pollicariis vel parum ultra, basi attenuata, acuta, venosa, glaucis-viridia, interdum obtusa, basi versus integerrima. Pedunculi axillares, folio breviores, filiformes

angustifolius Pelastemum foliis linearibus lanceolatis integerrimis

Habitat herb. Tusc.

Rami teretes, uti folia glabra, superne subimpressi. Folia petiolatis opposita, sesquipolliciana, subtus pallida, utrinque glabra. Flores et fructus densi.

Phyllanthus Belasynis spinis foliosis, foliis lanceolatis serratis pinnatis
natisibus, floribus calycibus. L'Herit. p. 6
Hab. in Senegal

Octogonus Celastrius inermis, foliis ellipticis angulatis subnerviibus per
ennerviibus, capsulis bivalvibus monospermis & Herit. p. 7.

Hab. in Pen. 5

Folia glauca, semen anellatum bifulcum

non vidi

palatus ♀

inermis, ramis alatis Thunb. fl. jap. p. 904 L. V. p. 237.

Nepi Kingi Komph. am ex. 796.

Habitat in Capispei Japonia &

Caulis oxyali. Foliis oppositi glabri. Alis puberula irregulariter
corticis adherentes facile decidentes. Folium opposita
obtusissime petiolata, tenuissime serrata, elliptica acuta
menata, pollicaria. Flores in ramulis sparsi. Pedunculi
uniflori superne glandulosi. Capsula 1-2. variis loculis
dubital Thunb. numme species Eucynmi fl

Celastrus musui a Desfont. est oleoides de Manih. fl. de herb. L. M

2 *Stratus* P. *inermis*, ramulis erectis ~~caulis~~ *stratis*, foliis ovatis acuminatis serratis, pedunculis spatis unifloris Thunb. fl. jap. pag 98 + S.V. 237.
~~Habitat in Japonia~~
Habitat in Japonia

Rami teretes, subnegocij cinerei. Ramuli oppositi, folia opposita, brevissime petiolata, tenuissime serrata, glabra pollicaria. Pedunculi capillares articulati. Capsula 1-4 loculari vel potius capsula aggregata Thunb

non vid.

3
procumbens *Celastrus inermis*, procumbens, foliis cordatis serratis, floribus axillaribus
subsolitariis Len Suppl. p. 153. S.V. p.
Habitat in Cap. b. spici

non vidi

4 venustus C. foliis obovatis crenato-
serratis pedunculi axillaribus uni
flori solitariis

Habitat in Terra del fuego

Erigitur ramis simplicibus ramis vane distatis
myrtilli subconicea aenea, glaberrima in petiolum
brevisimum attenuata.

^{ac}
5
acuminatus *Celastrus inermis* foliis ovatis acuminatis serratis pedunculis axillaribus
uni-floris, caule erecto *Cav.* *Lin. Suppl. 154. S. V. p.*

Habitat in Cap. bono spei &

Tota glabra Rami ~~terres~~ ^{subtus venosa pallidiora} sulcati angulati. Folia breviter petiolata
supra nitida, *perfollicana*. Pedunculi breves.

6
Cuculus Pelastri foliis ovalibus nitidis integerrimis marginatis Lin. Mant. 49 * S.V.
pag. 237

Euonymus Ethiopicus, alaternifolius robustioribus densis et non crenatis Pluk.
alm. 139. t. 200. fig. 3.

Habitat in Cap. b. Spei 4

Truncus erectus, ramis fasciis densis. Folia alterna, ovata s. obovata, obtusiuscula,
venosa, lucida, brevissima petiolata, margine integerrimo, reflexo. Peduncu-
li axillares, conferti, simplices, folio brevioris. Petala concava. Stamina
corolla breviora. Stylus crassus. Stigmata tria, divergentia Lin. Mant. l. c.

Cuculus Pelastri ~~inermis~~
vine floris

pedunculis axillaribus

ex Cuculus hort. Paris. ex Hispania diversus.

Rhamnus hispanicus bustifolus amplexu Tournef. A. r. h. herb. Turc. f.

paniculatus. *Celastrus inermis*, foliis ovatis acuminatis obtusis serratis, pani-
cula elongata terminali. *Wied. Proc. pl. pag. 1125*
Habitat in India orientali 5

non vidi

undatus. C. foliis obovato subcuneiformibus undato dentatis, floribus
axillaribus sessilibus Thunb. prodr: pag. 42.
Habitat in Cap. b. frei

non vidi

7
filiiformis *Calatrus* inermis, foliis lanceolatis integris, ramis filiiformibus, pedunculis
axillaribus unifloris her. Suppl. p. 153. S. V.
— Habitat in C. bono spec

non vidi

3 punctatas B. uermis ramis scandentibus punctatis, foliis ovatis serratis Thunb.
fl. jap. pag 97 + l. V. p. 237.

Habitat in Japonia

Rami elongati polygoni, puncti albi si abidi ferruginei nud.
ramuli sparsi striati patentissimi saepe recurvi, foliis
breves. Folia petiolata, acuta glabra pollicana, subtus
pallidiora. Flores in ramulis sparsi, solitarii pedunculati
pedunculi articulati laxi, semisyncyularis. Capsula
tri loculari Thunb

non vid.

8-9 *Cuneatus* P. ^{oppositis} foliis ~~caud~~ cuneato lanceolatis opposit integerrimis pedunculis
axillaribus subbifloris

Habitat in Insula Bourbonis

Totus glaber: ramuli teretes cortice cinereo. ramuli oppositi tetragoni

Folia sesquipollicaria obscure venosa, glaberrima, supra nitida
obtusissima interdum emarginata basi in petiolo brevissimo
attenuata. Pedunculi brevissimi. Fructus vix magnitudine Rapani
subglobosus. Semina duo

Habitus Calastri, quamvis flores non vidi, hinc retuli usque dum
innotescant. Capsula videtur esse bivalvis

9 retusus P. foliis ovali lanceolatis subretusis crenato serratis cymis
axillaribus.

Habitat in Isle de France. Rami teres globosi. folia petiolata
plura ex eadem gemma cum pedunculis, bipollicaria venosa
obtusissima planiuscula subretusa, ~~sem~~ serraturis obtusis basi
acuta petioli supra canaliculatus unguicularis. Pedun-
celli plures apice ~~pauc~~ bifidi flori in Dichotomia pedun-
culi partiali bi. s. triflori.

Cernuus. *l.* foliis ovatis obtusifoliatis; pedunculis axillaribus unifloris
cernuus Kunz. ped. pag. 42.
Habitat in Cap. b. per

non vidi

Caurinus - C. foliis oblongis integris, paniculis axillaribus. Herb. prodr. pag. 42
Habitat in Cap. b. p. ei

non vidi

rostratus *P* foliis oblongo-ovatis integris, paniculis axillaribus, fructibus
Spinofis Thunb-prodr. pag 42
Habitat in C. b. spec

non vidi

^{atrilobatus}
21 orbiculatus C. nervis folus rotundatis acuminatis serratis pedunculis
axillaribus trifloris Thunb. fl. jap. pag 974 t. v. p. 237.

Habitat in Japonia;

Rami polygoni, parvis albis adpressis, ferrugineis, glabri. Solea petio
lata, ~~sub~~ nervosa ^{glabra} patentia sequi pollicaria. Capsula
trilobulata Thunb.

alio loco collocanda non videtur

bullatas *Belastria* inermis foliis cratis integerrimis Len. S. V. p. 237.

10

Euonymos virginianus rotundifolius, capsulis coccineis eleganter bullatis Pluk.
alm. 139. t. 20. fig. 5.

Euonymoides virginiana, foliis non serratis, fructu coccineo eleganter bullato
Linn. act. 1716. p. 369.

Habitat in Virginia 5

11 *Scandens* & *inermis* caule volubili. Lin. l. v.

Euonymoides canadensis scandens foliis serratis Sp. act. 1716. 291. fig.
7. Duham. arb. 1. p. 223. t. 95.

Habitat in Canada &

Rami angulati, uti tota planta glabri. Folia elliptica ^{attenuata} adumbrata
~~se~~ venosa, tenuia, serrata fere tripolliciana interdum glandulosa
una vel a petioli pollicari. Racemus terminali erectus.
bractea fetacea ad basin pedicellorum.

Myrtifolius Celastrus inermis foliis ovatis serrulatis, floribus racemosis, caule erecto Lin

12

S.V. p. 237.

Myrtifolia arbor, foliis latis subrotundis, flore albo Sloan. h. 2. p. 79 t. 193. fig. 1.

Rain d'endr. 36.

Habitat in Virginia, Jamaica &

microphyllus Celastrio inermis foliis ovatis obtusis integris, cymis terminalibus dicto

17

Somis Lin Suppl. p. 54. S.V. p

Habitat in Cap. b. p. ei

non vidi

149 flondus C. Ramis Verticibus; foliis lanceolatis ^{obtusis} serratis, cymis axillaribus

Habitat in Cap. b. p. in St. Dahl. 3

Totus glaber. Rami cortice cineriscenti fusco. Folia bipollicina
vel ultra basi attenuata, glauca simpliciter ^{pedunculata} obscure
venosa serraturis paucis remotis ^{venis} ^{pedunculatis}. Cyma axillaris
25. dichotoma. pedunculis angulatis

7-8 glauca Calastus inermis foliis ellipticis ^{ternatis acutis} ^{lymis} pubescentibus, paniculis axillaribus dicto
15 Tomis foliis squaribus
Mangifera glauca, foliis oppositis, oblongis, glaucis; pedunculis oppositis,
divaricatis, dichotomis; Rottb. in Nov. Act. Hesp. Tom. 2. pag. 534. Tab.

4. fig. 1.

Habitat in Inda Comandul et zeylona

Rami alterni, ^{teretes} superne albidi glauci, glabri, uti totam plantam

Stipulae petiolatae, oppositae, bipollicariae, retusa, venosa, glaucosae
ovatae, obsoletae ternatae

Pedunculi axillares, oppositi, dichotome ramosi; rami divaricati

bracteae minutae ad basin ramorum.

Calyx, Corolla, Nectarium, Stamina ut in Calastro

Stylus ut in varis locularis.

- Walmedya Lin fl. Kejl. 439.

Schrebera alba Retz. obf. 6. pag. Tab.