

Celsia

1 orientalis C. foliis bipinnatis

2. ~~orientalis~~ C. foliis radicalibus lyrato-pinnatis, superioribus oblongis
pinnatis: folioli calycinis integerrimis, pedunculis flore longioribus

3. coronandeliama C. foliis pinnatis, radicalibus lyrato-pinnatis superioribus
ovatis, floralibus cordatis pedicello brevioribus

4. cretica C. foliis radicalibus lyratis, floralibus cordatis attenuatis
folioli que calycinis pinnatis, floribus sessilibus

5. tenebris foliis linearibus oppositis pinnatis floribus racemosis

4 Lineari Celpha foliis linearibus oppositis serratis

+ ~~9. 1. 1. 4.~~

Caulis utraque sulco lato, glabrescatatus, glaber.

Stipula petiolata, angusta, pollicaria, glabriscula, utraque serratis
2-3. ~~rametis~~. Rudimenta ramulorum in axillis

Node mi axillares, breves. pedicelli filiformes, saepe pollicares, solitarii,
interdum infirmi gemini. Folia floralia pedicello dimidio breviora

Calycis lobula lanceolata, glabra

+ Celpha lineari foliis linearibus lanceolatis Tracy. coll. 2. p. 270
w. rar. cent. 2. fasc. 1. t. 13

Clata
dromerata Celsii

Habitat in Cap. b. Spei

Caulis quadrifidus vel quinque pedatus erectus pinna anserina crassior, pubescenti. ^{panum rumpis} foliis sessilibus lanceolato-oblongis inferne versus sensim angustioribus, & est bilis in quadri-pollicariâ sursum sensim immixtis, crenatis, acuta, venosa & subrugosa supra glabra nitidiuscula subtus villosa floralia inferiora cordata serrata acuminata. Bracteae tres oblongae acutae ^{duae} laterales angustiores & breviores acutae super inferas.

longitudine calycum inferiorum panum longior ^{interior} & superiorior & serratae flores tres ^{et calice} quinque sessiles. Calycis foliola saepe lanceolata. Corolla magnitudinis Celsii orientalis. Stamina barba lutea. Capsula globo & magnitudine nisi

4 p. premi
sessiler

~~Phlegma
oblongo-ovato, speciei orthocentronis, corporis forma conglomerata North. gran
1797. 23. Tab. 13. Fig. 2.
granum cyperoides orientale parvula oblongo-ovata conglomerata
conflata (Balken. Mart. 9. 1797. Fig. 3.
granum cyperoides minus, speciei conglomeratae plantae caribae
North. Mart. 1797. Fig. 1.
Habitat in Florida occidentali~~

Pangorae 105

valvulis linearibus obtusis,

Cyperus ^{tertiusculis} spiculis filiformibus ^{obtusis} subsero ~~approximatis~~ ^{umbellae} in involucri ~~seguente~~ ^{longitudine} umbellae subcylindricae

Cyperus Pangorae; culmo triquetro; involucri triphello; umbella universali decemposita, partialibus subtrifidis; spiculis alternis filiformibus Rottb. prop. gran. 31. t. 7. f. 3.

Habitat in India orientali

Culmus crassitie pennae columbinae. Involucri foliola linearia, duo longitudine umbellae, tertium brevius: partiale nullum praeter nixi & quomodo. Ochrea truncata, ferruginea.

Composita

Umbellae radii septem ^{obtusis} ^{alternis} ^{remotissimis} ^{quatuor} ^{obtusis} ^{pollicares}, longior subtripollicaris partialiter unguiculares; spiculae ^{remotissimis} ^{quatuor} ^{obtusis} ^{pollicares}, ternae, ferrugineae, viginti sex florum: valvulae lineares, concavae, enerviae, & ensim deceduae.

Patris de Vircor quod Retzii & Pangorae ^{differt} ^{diversus} ^{est} ^{de} ^{specie} non citans, haud raro enim sub nomine Pangorae Epil rimos ex India habui omnino diversos a Rottbollii qui

valvulis

linearibus

spiculis filiformibus gaudet nec linearibus. Distinctus est a praecedentibus spiculis angustis & tertiusculis valvulis linearibus

obtusis, recurvato-lanceolatis

Tomentosa Calpa

Habitat he herb. Desfont.

Caulis herbaceus, tomentosus, inanis, uti reliqua planta. Folia lanceolata, inferiora petiolata, dentato serrata, inferne subpinnata, bipinnata, per se per se minima, basi attenuata, ovata, integerrima. Racemus terminalis. Flores remoti: pediculi semipollinarii. Calycis laciniis oblongis, obtusis. Bracteis lanceolatis, pediculis brevioribus.

betonicifolia Celsi

Habitat in Barbani herb. Desfont.

Caules herbaceus, erectus, simplex teres, crassitie pennis asperis. Folia petio-
lata, glabra, inaequaliter dentata, venosa, inferius oblongo-lanceolata, tri-
pallia-ana, ^{superius lanceolata} ~~elongata~~ ^{pedalis}. Racemus elongatus, pedalis. Flores profusi,
Pedunculis ^{ut} ~~ut~~ ^{pedicelli glandulose pilosi}. Bractea pedicello brevior. Calycis
foliolo ovata, acuta, ~~prae~~, Corolla magna

crassifolia Celsia

Habitat

Herb. Thauri

Caulis herbaceus, erectus; citi tota planta glaber. Folia subpetiolata, lanceolata, ciliis
sum serrata: floralia integerrima, pollicaria. Pedunculi superne, axillares, uni
flori, gemini ex altera axilla, longitudine foliorum. Calycis paleola lanceolata

La mant

Arcturus? foliis radicalibus lyrato-pinnatis, pedunculis flore longioribus
Faughon 2. v. 117.

Verbascum fulvestre creticum Alp. exot. 123. v. 122.

Verbascum brasi's folio Column. Ephr. 2. p. 81. tab. 82.

Verbascum humile creticum laciniatum Bauh. pin. 240.

Verbascum arcturus foliis lyrato-pinnatis Lin. spec. pl. p. 254

Specimen herb. Tournef.
nam in d. vesp. videri

Caulis inferne lanatus

terminatus racemo

pedali. folia alterna

inferiora pedicellata

pinnis latenter, oblonge

terminatis pollicari

grossis et inaequaliter serratis

subtomentosis venosa

abitat in Creta

inferne lanatus

Caulis erectus fo. qu. pedalis simplex villosus purpurascens. folia
^{reticulata} in fenora ^{lyrata} ^{et} ^{pinnata} pinnis subpedicellatis alternis distantibus
^{inappropiata} ^{grossis et inaequaliter serratis}, oblongis, serratis ^{in pollicari} ^{profunde} ^{serratis} unguiculatis
vel minoribus, terminalis maxima fere tripollicaris, venosa
pilis minutis raris caulis caulina pedicellata oblonga
pervosa venosa serrata, superiora et ^{sub} ^{terminalia} ^{sub} ^{pedicellata}
ovata subrotunda ^{pedicellata} ^{profunde} ⁱⁿ ^{aequaliter} ^{serrata}. Pedunculi
racemosi elongati filiformes bipollicares pubescentes
laciniis calycis linearibus angust.

superioribus oblongis serratis
floralibus subrotundis
laciniis calycis

Verb. arct.

linearis integerrima

sorte

Celphä

pedicellis

antunes Celphä foliis radicalibus lyratis, superioribus oblongis: ~~pedicellis~~ bracteis
longioribus, folioli calycinis linearibus integerrimis

Celphä antunes: foliis radicalibus lyrato-pinnatis, pedunculis flore
longioribus lin s. v. p

Folia superiora ~~perata~~ petiolata, serrata dentata. Bracteo subrotunda

24

212

~~conf. Jacq.~~

Celsia

coromandeliana

Celsia, foliis ^{lyatis} ~~lyatis~~ radicalibus, ^{superioribus ovatis, floralibus cordatis} ~~superioribus ovatis, floralibus cordatis~~
~~pedicellis brevioribus, calycibus linear-oblongis integerrimis~~

Habitat in India Orientali

Caulis herbaceus, erectus, superne ramo uno vel altero, florifero, pubescenter, teres, striatus.

Folia radicalia et infima lyata: lacinae terminali lanceolata: fo-
intermedia petiolata, superiora sessilia: omnia villosa, serrata.

Suprema cordata

Bractea parva cordata, subtinerimus inferioribus semianguiculante
racemus elongatus: pedicelli ^{superioribus minus longis, minoribus} pubescentes, unguiculares,

Calycis foliola linear-oblonga, villosa, capsula parum breviora
^{integerrima}

Capsula peso parum major

~~Plant. diversa a Celsia cretica eiusdem generis~~
~~foliis supplementi caespitibus~~

Planta a Celsia cretica diversa. Flores magnitudine Cels.
artem

integripes Celsa

paniculatus
indonesi

O. medemii paniculati, foliis ovalibus denticulatis Burm. thes.

~~zeigl. t. 10. fig. 2. Cinodora Glehnii~~

~~Habitat in India orientali~~

non vidi

Cineans Celfa

alio generi ~~file~~ Hammer

Cretica \odot foliis radicalibus lyratis, caulinis subcordatis amplexi auribus, floribus subsessilibus Lin. Suppl. pag 207. + L.V. p. 5614

Blattaria perennis Cretica incana, foliis basi conjugatis ^{Mont. h. d.} ~~prostratis~~,
uno majore ^{remun. claud. in l. 2.} p. 488.

Verbascum foliis radicalibus ovatis petiolatis, caulinis oblongis
sessilibus serratis pubes tomentoso Thell. c. p. 182. t. 273.

Habitat in ~~Andia~~ Creta \odot

Caulis bipedalis erectus, simplex caespitibus pennis cygneo pelopis
caulis ^{hetero} bipedalis erectus, simplex caespitibus pennis cygneo pelopis

Folia ^{hetero} inaequaliter dentata erosae pili minuti adpressi. radicalia
et infima pennata lyrata pinnata pinnis 9-6. alternis per

impares majus ^{oblongum} penna approximata terminali maxima, superiora oblonga
petiolata: floralia sessilia cordata attenuata serrata

specia elongata. lacina calycis subcordata attenuata
serrata. Flores magni

erecti

calycini serrati

floralibus cordatis attenuatis foliolis

orientalis C. foliis bipinnatis Hort. upf. 179. t. 1. s. v

Verbascum orientale, sphaerifolium Tournef. coroll. P. Buxb. cent. 4.

^{p. 17.}
Blattaria orientalis, agrimonifolia Buxb. cent. 1. p. 14. t. 20

Habitat in Cappadocia Armenia C

Caules erecti pedalis et ultra simplex glaber. Folia pedolata, altissime
bipinnata vel laciniis incisi linearibus glabris. Racemus terminalis florum
diaphanes. Bractea trifida vel simplex linearis corolla parvam
longior. Caernis calycis linearis longitudine corolla

Cretica Celsia foliis radicalibus lyratis, superioribus oblongis, floribus ^{sub} sessilibus longis
vine bracteanum, calycibus ovatis serratis

Celsia cretica. foliis radicalibus lyratis, caulinis subcordatis amplexicau-
libus; floribus subsessilibus. Lin. S. V. pag.

Legi Turchi

Folia radicalia et inferiora lyrata + pennata, superiora oblonga petio-
lata crassa, suprema cordata amplexicaulia.

Bractea cordata, attenuata, serrata. Flores breviter pedicellati.

Corolla magna.

26

214

23. Coromanda deliana Celsia ^{superioribus abrotis} foliis radicalibus lyratis, pedicellis bracteis longioribus, caly-
 cibus lineari-oblongis integerrimis.
 Habitat in India Orientali Honj.
Caulis herbaceus, erectus superne ramoso uno vel altero florifero, pu-
 bescenti, teres, striatus.
Folia radicalia ^{terminalia} ~~lyrata~~ ^{et infima lyrato-pinnata}: laciniis terminali lanceolata-oblonga; inter
 media petiolata ovata; superiora obovata sessilibus; ^{suprema cordata} ~~ovata~~ ^{suprema cordata} serrata
Racemus elongatus terminalis: pedicelli distantes, unguiculati
 semipollicares, villosi pubescentes. Bractea cordata, subnitenti
 me, inferioribus ⁱⁿ femiunguiculari; superioribus supra minore
Calycis foliola lineari-oblonga, integerrima, villosa, capsula pa-
 rum breviora.
Capsula pisco major, glabra
 (Planta a Cels: cretica diversa, pedunculis bracteis duplo longiori-
 bus, floribus distantibus magnitudine Cels: antum, Calycibus
 ciliatis integerrimis)

25

213

scabra *Celsia siaberrima*, foliis lineariibus integerrimis floribus
subpinnatis

Habitat in Tava.

Caulis herbaceus erectus simplicissimus fructus ^{ter}tripedalis, uti
tota planta siaberrima. Folia opposita remota linearia
polluciana sursum sensim minora. Flores alterni
distantes sub sessile. bractea long. calycis brevioris.
Stamina 4. Filamenta duo villosa. Stylus apicem ver
sus cadefieri Capsula ovata glabra stylo persistente
terminatus biloculari semina numerosa minuta