

Cenchrus

Setosus Cenichus Spica linear-oblonga, involucri setosi, setis inermibus, interioribus basi villosis, villis ciliatis, glumis lateribus ^{inermibus} ser. prodr. pag. 26.

Habitat in America meridionali legit A. v. Rohl

Culmi teretes, glabri, foliis vaginatis

Folia convoluta, subulata, glabra. Vagina ore barbata.

Spica terminalis, cylindrica, quadripollicaris. Involucri setosa, pollicaria vel minoria, purpurea, basi flavescencia, villosa
(facies Cenichus ciliaris)

inflexus - Cenchrus?

Habitat in Guiana Herb. Lus.

Calami vagini verti, teretes. Vagina striata, punctis elevatis periferis latiori. Do-
lea ovato-lanceolata, hypoleucana, acuta, striata, margine canaque punctis
elevatis periferis, coctenim glabra. Spica axillaris, secundaria. Pedunculis elon-
gatus, glaber, teres. Valvula calycis ovata, attenuata, striata, tuberculata. Spini-
le praesentes, valvula altera brevior

Tragus

hodieformis C. racemo spicato simplicij, florum involucro polyphyllis, scabro
culmo erecto Thunb. prod. fl. cap. pag 24
Habitat in C. b. pae.

non vidi

genuiculatus - C. racemoso fructu simplici, floribus in involucrio polyphyllis scabris,
Culmo genuiculato. Thunb. prod. fl. Cap. pag 24.
Habitat in Cap. b. p. p.

non vidi

ciliatis \odot spica involuicellis setaceis ciliatis quadri-floris Lin. Mant. 302.
L.V

Habitat ad marginem agrorum Et in Danis cap. 6. spec.

Culmus ascendens lavis filiformis glaber articulatus spithameus
geniculis geniculis inflexis. Folia graminea vagina striata
fauces pilosa. Spica teris, digitalis, flores alterni rachi flexuos
Et quadri-floris: involucrio ex aris numerosi, fusis, inferne
ciliatis interonibus flosculo longioribus. flosculi sesplesi. Lin
hermaproditis duobus - masculis 2.

alopecurioides *C. spica cylindrica*, florum involucrio polyphyllis villosis. Kunth

pid. v. fl. C. pag 24

Habitat in Cap. b. per

Non vidi

purpurascens Conchus

Panicum hordeiforme Thunb. Fl. jap. 40
Conchus purpurascens racemo spicato, flosculis circumvallatis aristis
longis simis, Culmo erecto Thunb in act. Soc. Lin. 2. p. 329.

Habitat in Japonia.

Caulis erectus, bipedalis. Folia Culmo longiora. Racemus subspicatus, latus,
& pithamaceus: pedicelli longitudine flosculorum, distincte patulis. Arista
purpurea, flosculo sexies longiora. Thunb. l. c.

Stata II. *Spica setacea seta scienda L. I. V.* Schreb. gram. 69. t. 7.
Gramen pratense junceifolium Bauh. pin 5. Scheuchz. gram.

90
gramen pratense Hollandsium, capillaceo folio & minus
Bauh. pin 5. prod. II. Monf. herb. 3. p. 217. f. P. t. 7. fig. 10

Habitat in Europa aperi, sterilibus dano. 4
Palmites pitopi, palmarum exi. fructi simplicissimi filiformis glabri
nudi s. folia radice unica in culmo setacea rigida glabra
patentia culmo demisso breviora. flo. p. 1. alterni subulati glabri

Setosus Genchus

[#] *Panicum setosus*; spica linear-oblonga, involucri setosis; setis inermibus, interioribus basi villosis, villis ciliatis; glumis laevibus Swartz. *Starchyon*; spica prodr. 26 Fl. ind. occid. 1. p. 211.

Panicum alopecuroides; spica tereti simplici rubente, involucri setosis; callo unifloro fasciculato setosis, unifloro, inferne ciliato-plumosis Lamark, illustr. 1. p. 169.

Panicum erectis superne ramosis *Lin. syst.* Habitat in India occidentali

Panicum bi-quadripedale, ascendens, crassi, ramosi: geniculis nigri-glabris. Folia linearia, margine laevia: vaginæ castae. Spica spithamea, teretiuscula. Flosculi approximati, purpurascens

Involucri setae aristaeformae, subflexuosae inaequales, breviores oculo armato ciliato-serratae; interiores flosculis multo longiores, basi villosi. Calyx

biflorus, ^{glumis} exterior interiora multo brevior ovata, acuta; interiora acuminata. Corolla biglumis: ^{glumis} salvas lanceolatae. Stamen ^{sub} *Evolutaria* unicum *Sw. l. c.*

Typus generis est *Alopecurus indicus* *Lin.*

echinatus *Spica oblonga conglomerata* Lin. l. V

Schreb. gram. 9. 723.

fig. 1.

gramen americanum, spica echinata, majoribus locustis Plukin
alm. 177. 7. 92. fig. 13

gramen locustis humidioribus echinatis Scheuchz. gram 77.

Habitat in jamaica Curacao &

Culmi geniculati, pedalis striati. Folia graminea vixno
ore parum pilosa. Spica cylindrica bi pollicari. Rachis flexuosa
flores approximata.

sp. involucri villosi

Cavan. u. 5. p. 39. Tab. 462

calyculatus Penchnus

Penchnus calyculatus; culmo simpliciter, erecto: spica glomerata: calycia
communini calyculato. Paron. iv. s. p. 39. t. 463.

Habitat in Amicorum insulis

Culmus teres, simplex, glaber, bipedalis et ultra. Folia plana: vaginae
inter nodos longiores, faucibus tomentosae. Spica pedalis semipedalis;
spiculae approximatae, spinosae. Calyx ^{calyculatus} (setis rigidulis, brevibus
calyculatus: foliis ^{sub} duodecim; subulato - compressis, valde tomen-
tosis excepto apice. Flosculi tres-quatuor, sessiles, omnes fere her-
maphroditi, fertiles. Semen ovatum, pallide rubrum. Paron. l. c.

Leon H. Spica incivra ulata

indica N. spica platyca pinnata subincurvata Lin. Suppl. p. 109. T. V. p. 102.

~~Habitat ad Franquebanam cum spica
Palmi plures basi ramosi filiformes digitales inferne vaginati. Folia subulata
vix unguis ulam glabra vaginis angustiora. Spica parum incurva culmi
Longitudine floris pediculis alterni rachi altero latere parum
convexa altero parum concava cum dente pro pagulo flore.~~

W. A. C. H. E. M.