

Centaurea

Sibirica *Pentaurca calycibus ciliatis, foliis tomentosis in divisis pennatifidis que integerrimis* caule declinato L. Sp. pl. 1291. & S. V. p. 786

□ *Pentaurca calycibus ciliatis subrotundis, foliis pinnatis et integris, foliolis ^{pinnatis} simplicissimis: extremo maximo* Gmel. hb. 2. p. 96. tab. 42. fig. 2.

Habitat in Sibiria

~~Talus tomentosus~~ ^{Canugnotus} ~~Canugnotus~~ Caulis semipedalis simplicissimus ramulo unico alterove altitudine caulis. Folia radicalia plura tomentosa ^{in ang} inferiora, pennatifida laciniis foliis lanceolatis integerrimis, obtusis sursum versis, ultimo extremo majore caulina 6 vel 7. inferiora pennatifida superiora integerrima. Flores terminalis solitarius. Pedunculis sub flore inermis. Calyx glaber. ^{foliola} Squama ovata aucto squamae magnitudine folioli calycis ovata, arida flavescens argute ciliata flos *Pentaur*

30 *Sempervirens Centaurea calycibus ciliatis, foliis lanceolatis dentatis auriculatis, inferio-
ribus hastatis*

~~Monf.~~ sic: p. 73. t. 39. p. 3.

Tacca lusitania sempervirens ¹⁷⁵⁰ Monf. h. 3. p. 139. f. 7. t. 20. p. 9.

*Centaurea sempervirens calycibus ciliatis, foliis lanceolatis dentatis: inferio-
ribus substipulatis; inferioribus hastatis* ~~Monf.~~ Hort. Cliff. p. 22. * Sp. pl. p. 129.
L. V. p. 786

Habitat in Lusitania t

Caulis suffruticosus teres pubescens superne pubescens purpureus nudimenta
ramulorum in axillis. Folia late lanceolata, basi attenuata sessilia
pubescentia remote dentata, et basi attenuata utraque auricu-
la stipuliformi, lanceolata interdum falcata inde quasi stipulatus
Peduncululi sub flore inersati. Calyx ovatus glaber, squamis ovatis
apice versus apicem fuscis, membranula lanosa ciliata flava
auctis. Corolla purpurea corollulis squales.

inferiora hastata
summa angustiora
insensibilissima.

Scabiosa Pentauria calycibus ciliatis inermibus Radice duplo longior corollulis di radii
duplo longioribus foliis pennatifidis: pinnis lanceolatis

Scabiosa Brunfels. 5^{ta} Tray.

Scabiosa major Col. 4^{ta}. 541

Scabiosa major squamatis capitulis B. Pin. 269

Scabiosa major altera, squamatis capitulis, sive jaicea rubra latifolia
Laciniata Bauh. Pin. 269.

Cyanus foliis pennatis, pinnis dentatis obtusis, squamis calycinis man-
gulantibus Hall. herb. 106.

Pent. scabiosa calycibus ciliatis foliis pennatifidis; pinnis lanceolatis
L. 88. ju. 700 Gmelin sub. 2. p. 93. Sp. 1291. F. V. p. 706 Scop. fl. C. n. 1026.

Pollich. h. 226.

Habitata in Europa septentrionali prae-⁴ glabra magna raris pilosa
Caulis sulcatus angulatus glaber. Folia radicalia bipennatifida
pinnis pinnulisque lanceolatis obtusis, caulina rarisque pennati-
fida. Pedunculatus elongatus uniflorus Calyx subglobosus imbri-
catus squamis ovatis margine fuscis ciliatis inermibus. Corolla
purpurea. Corollula radii duplo longioribus flosculis disci duplo
longioribus

~~Pentauria~~ *Pentauria* *colerum* *officinari*
Hort. purpureo Bauh. h. 3. p. 32

34
Tatarica Centaurea calycibus ciliatis foliis pennatis: junis lanceolatis indivisis Suppl.
p. 383. l. V. pag. 86
Habitat in Sibiria 4
Flores et Calyces omnino Cent. Scabiosa. Folia primo lato lanceolata
indivisa, integerrima. reliqua pennatifida: laciniis minime sublobatis her.

non vidi

acaulis Centaurea calycibus ciliatis, foliis lyratis caule subnullo L. Sp. pl. 1292.

36

L.V. p. 706.

Tacca acaulos lutea, emicofolis, squamarum ciliis candidis Shaw. Spic.

342. tab. 342

Habitat in Arabia

non vid.

74 *Palmaria* ~~Centauria~~ *Centauria* calycibus ~~setula~~ ^{spinosis} setaceo spinosis glabris, foliis
radicalibus lyrato-nuncinatis, caulinis lanceolatis serratis spinosis
Noebe palmaria 1. Clus. hist. 2. p. 9.

Tacea major, foliis cichoraceis mollibus lanuginosis Bauh. pin. 273.

Tacea major foliis cichoraceis mollibus, flore flamineo Monf. h. 3. p. 140. f. 7.
Tab. 26. fig. 14.

Calycibus setula subspinosa exserta glabris, foliis lyrato-nuncinatis serratis len.
Sp. pag. 1299 l. V. p. 700. Jacq. bot. Tab. 64. mant. 470

Habitat in Europa australi &

glaber

Caulis bipedalis, paniculatus, erectus rigidus, sulcatus. Rami striati
folia ^{glabra, subspinosa, vel nuncinata} ~~pubescentia~~ ^{glabra} radicalia lyrata, dentata; caulina lanceolata, serrata

serratura remoto, spinulosa, pollicaria, ramulorum angustiora

Calyx oratus
consimus
flos solitarius terminalis pedunculatus. Squama calycis ^{reddens} ~~flava~~
ter apice fuso, setula flava, patens, terminata. Corolla nuba vel
alba, radii et disci corollae magnitudine aequales

75 - Euphorbia Centaurea calycibus fetaceo spinosis, foliis decurrentibus indivisis
ferrato spinosis Sp. pl. p. 1299. L. V. pag. 700
Folia foliis cichoris, caule alato, flore purpureo Raij Suppl. 203. Tell.
ref. 84. 1. 27.
Habitat in monte argentario Italiae.

non vidi

77 *babylonica* *Pentaurca* calycibus petalis ^{pub} spicatis, foliis ^{pub} rad ~~subtomentosis~~ ^{pub} radica
libus lysatis, caulibus lanicollatis decurrentibus floribus thyrsoides ^{pub} spici
Gaiea maxima alp. Exot. 4202.

Gaiea *Babylonica* Bauh. prodrom. 235.

Gaiea *latissima*, laciniato folio Bauh. Pin. 235.

Pharposia *oides* *lutea* *altissima*, *helenifolia*, *alato* caule Vaill.
Act. 102. n. 27.

Pentaurca *Serratula* *Babylonica* foliis tomentosis decurrentibus
subintegerrimis concavis canaliculatis: radicalibus lysatis,
floribus thyrsoides spicatis Sp. pl. p. 1148

Pentaurca *babylonica* calycibus fianosis, foliis subtomentosis
decurrentibus indivisis: radicalibus lysatis Mant. 4 60. l. v. 787
Habitat in Oriente &

Caulis semiorbitalis erectus rigidus, ^{alatus} angulatus tomentosus
folia tomentosa ^{am} cultus pars ^{am} deponit ^{am} culta minus. Radialibus
ampla lysata, dent venoso reticulata ^{am} superne dentata

ubi *P. glaberrima* ^{dentibus} spiculosis. Caulibus lanicollatis, decurrentia
inferioribus denticulato, spicosa venoso nervosa, mucronata
polliciana

caulis a medio fls ad apicem floriferus, Flores axillares plerumque
terni breves pedunculati terni terminalis solitarius longius pedun-
culatus. Foliola plura lancea lanceolata ad basin in singulis pedunculata
Calycis ovati in ^{flave-pentis} magnitudine imbricati squamis ovatis villosis
lobis, ovatis seta pungente terminatis
Corollae sulphurea Corollula diffusa longitudine radii

79 *gradata* *Pentaurca* Calycibus subinermibus subaristatis radiatis foliis pennatifidis
L.S.V. p. 780

Heranthemum foliis pennatifidis Gmel. Sib. 2. p. 108. t. 47. f. 1. Sp. pl.
1201.

Habitat ad Tanain prope oppidum ^{vel} Calcinense.

~~Caulis~~ ~~foliisque~~ ~~pubes~~ ~~pubes~~ pubesca. Folia pennatifida lobis dentatis super
nove dentato-pinnata. Calyces subcylindrici. Squama ovata mucroni
stata

non vidi

80 nudicaulis *Pentagloea calycibus setaceo-spinosis: foliis indivisis, caule simpliciter unifloro*
^{inferne}
+ *foliis folioso sup*

Tacea intybalea, capite nigro spinoso Barr: ii: 1210. Boiss mus: 2-p-60
Tab. 40.

Tacea folio Ceanothus, purpurascens flore e rupe Victorio Heron
parad. 190 tab. 190

Pentagloea calycibus setaceo-spinosis, foliis indivisis: superioribus
subdentatis, caule simpliciter nudicaulis nudicaulis unifloro simpliciter.

L. Sp. pl. p. 1300. S. V. 788. Ger: Prov. 107. tab. 5.

Scopoli planta
Del. fl. et
sum. infusis
videtur alia plan
ta nisi culta
seu mutata
mea convenit
cum citationibus
ad hunc allatis

+ *Caulis herbacaeus stratus, erectus, pedalis, glaber inferne tantummodo*
foliosus. glabra aerea glaucescentia
plurima radicalia
folia prima obovata integerrima, reliqua lanceolata linearia sabti
lispina ciliata, mucronata. 3 vel 4 in caule inferne sessilia laniceo
calata dentatae dentibus utriusque 2. vel 3 remota. foliolium minutum
versus medium caulis
ter. terminalis unicus. Calyx globosus squamis ovatis margine fuscis
seta flava subpurpurea terminatis flos purpureus
^{Hesperia}

+ Habitat in Italia, rupe Victorio Galloprovincia, Hispania

21 *Procoditium* *Pentauraea* calycibus pinnatis simplicibus sive pinnatis, foliis pinnatifidis
integerimis: laciniis extrema majore dentata. L. Sp. pl. 1299. *S. V. p. 63
Cyanus purpureus, capite pinnato, Syriacus Barrel. 927. + 503
Procoditium vulnerario foliis Vaill. act. 103

Habitat in Syria ☉ ☉ Liba & Lyrate pinnato
Rami pubescenti striati. Folia inferiora pinnatifida; laciniis lanceolatis
obtusis inaequalibus, inferioribus brevioribus extrema majore
subdentata. Summa subintegra lanceolata basi angustiora
Calyx subrotundus; squama ovata margine membranacea, nives
apice spina longitudine squarum radii Conilla radii ^{superioribus} magna spina
purpurei. Disci albi; apice purpurei

2 pumila Centaurea calycibus simplicibus sine pinnis, foliis interrupte pinnatis tomentosis, caule nullo

Crocodylium acaulon forma, Callictrago foliis crispis Vaillant act. 163.

C. pumila calycibus simplicibus sine pinnis, foliis dentato pinnatis villosis, caule nullo Am. acad. 4. p. 292 * Sp. pl. p. 1300. S. V. pag 789

Caulis vix ullus vel brevis primis rami plures parum supra terram elevati ^{impelluntur}
Folia plerumque pauca in ramis, plerumque radicalia, petiolata, ^{dentato} interrupte
pinnata tomentosa, penna oblongo pinnata ~~fracta~~.

Flos solitarius in apice. Calyx imbricatus squamis glabris et labro
margine ~~no~~ membranacea nuda, ^{apice} penna terne longitudine squamam

Caedunt orientalis acaulos incanus et tomentosus, dentis leonis folio Tour
ref. Coel. 2.

caulam quod acaulis est a solo aceddit ad non naturalis videtur, Centaurea
vario statuti vidi eodem modo sese habentes rudimento tandem modo
coelis in alio solo vero caulescentes

83 galactites Centaurea Calyptrobisptaios-spinops, foliis decurrentibus pinnatis pinnis
nobilis tomentosus

puna alba math.

Carduus tomentosus et corona fratrum lob.

Carduus tomentosus capitulo minore B. Pin 302.

Carduus galactites Bauh. h. 3. p. 54

13 Carduus costicus non maculatus, caule alato Tournef cor. 31.

Habitat in Europa Australi 4

Planta saepe bipedalis erecta. Ramis patentibus ^{tomentosus} ~~caule~~ et foliis ^{tomentosus} ~~decurrentibus~~ ^{tomentosus} ~~tomentosus~~

notum decurrentia
aliis exstantibus pinnatis spinosis

libris alato folia pinnata angusta calicis remotis alternis laniceo
Catis apice inque axillis spinosis, spinis flavis Pedunculis vespa equiem
sesquipedali ceteris erid. tomentosus, uniflori. Calyx arachnoideus ca
nus squamulis lanicolatis pinnatis flexibili terminatis Plospurpi
reus. Habitat omnino Cardui ut flore radii neutri

Centaurea foliis radicalibus lyratis tomentosis, caulinis linearibus decurrentibus

scicula affinis

habitat in aegypto Torphäl est scicula

nondum foliis
examinata

Centaurea affinis paniculata, differre videtur magnitudine per capitulum

Reclis squamis flavescens nec fuscis, pedunculis tomentosis

foliis longioribus

ambo ad paniculatam

refert Halleris

Et certe limites vix
dantur

videtur esse Centaurea gmelini Tom. 2. pag. 98. Tab. 43. folia vero
in figura latera sunt quam in praesimine herbarii ad paniculatam
hoc tabula a Linnæo citatur, sed Cent. pag. 95. no. 75 est paniculata Lin

~~gypto a n. 75~~
Centaurea foliis lyratis fibratis aciculis

ægyptia Torphäl

specimen minus perfectum. Calcitropa h. n. n. exemplar pygmaum

*Centaurea affinis Cineraria, et flos sulphureus et habitus foliorum diversus
ex horto Patavino*

Pentaurea Autorem
quae in Linnæo non reperitur

Triumfetta
hybrida
niceensis } allionii
~~et~~ elegans }