

Cerastium

* capsulis oblongis

1. perfoliatum C. foliis connatis
2. lineare C. foliis lineari lanceolatis glabris, pedunculo dichotomo tomentoso
3. ^{repens} ~~Veronica~~ C. incanum tomentosum, foliis lanceolatis caulibus basi tetragonis
4. vulgatum C. foliis ovatis radicalibus obovatis: caulinis oblongis, petalis calycis aequalibus, caulibus diffusis
5. visiosum C. erectum velloso-visiosum
6. reflexum C. foliis lanceolatis glaberrimis apice reflexis, petalis calycis longioribus
7. pentadactylum C. floribus ~~perispermis~~ ~~perispermis~~ ~~perispermis~~ alternis fertilibus, petalis emarginatis
8. pentadactylum C. floribus pentandris, petalis integris
9. arvense C. foliis lineari lanceolatis obtusis velloso; corollis calycis majoribus
10. [†] ellyncium C. foliis lanceolato-oblongis caulibusque dichotomis foliolosis, calycibus hirsuto-tomentosis, longitudine petalorum
11. dichotomum C. foliis lanceolatis, caule dichotomo ramosis, capsulis erectis
12. ~~nitens C. velloso-visiosum foliis lanceolatis, caule dichotomo ramosis capsulis reflexis~~
13. alpinum C. foliis caulibus hirsutis, foliis ovato lanceolatis, caule diviso
14. glabrum C. glabrum, foliis inferioribus obovatis, caulinis lanceolatis, pedunculis subramosis

44 capsulis fibrotundis

15. repens C. foliis lanceolatis, pedunculis ramosis, capsulis fibrotundis
- 14 16. ¹⁵ striatum C. foliis linearibus acuminatis glabris, pedunculis unifloris submentopis.
17. suffruticosum C. caule perenni fructo, foliis linearibus lanceolatis canaliculatis rigidis, calycibus striatis
18. maximum C. foliis lanceolatis stratis, petalis crenatis, =
19. aquaticum C. foliis cordatis sessilibus, floribus solitariis, fructibus pendulis
20. dioicum C. hirtum vispidum, foliis lanceolatis, floribus dioicis, petalis calycis triplo majoribus
21. latifolium C. foliis ovatis submentopis, ramis unifloris
22. tomentosum C. foliis lanceolatis ^{tomentosis} ~~tomentosis~~, pedunculis ramosis
23. manducum C. glabrum foliis lanceolatis, pedunculis longispinis
24. obtusifolium C. foliis oblongis obtusis glabris, caulibus basi repentibus, pedunculis solitariis

myofotis Venusfimo folio rigido Tournef. Inst. r. herb.
Habitat herb Musf.
Caulis cespitosus ascendens. Capsula oblonga

alpine montana capillares folio minima flore pentapetala, petalis subrotundis
et incis. Michel. Pl. Rom. et Neap.
Habitat in Italia herb. mus.

habes

Spergula

Habitat in monte video Commerf. herb. tusf.

Caulis herbaceus, erectus, semipedalis, raris, superne pubescens, apice diviso in pedunculos dichotomos. Folia pollicaria, linearia, crassiuscula, glabra, margine scabra. Nervis membranaceo, arida. Pedunculi in dichotomiis et apice ⁴. Calyxis foliola lanceolata, margine membranacea, albida. Corolla longitudine calycis. Capsula ovata, glaberrima nitida unguis alari. Semina membrana cintha.

⁴ raris raris membranaceo, sulcata, connata

visiofum ♂ erectum. villos - visiofum Lin. f. V

alpine hespita altera visiosa Bauh. pin. 251.

Myosotis hespita alba Vaill. Bot. 142. t. 30 fig. 4

B. grandiflorum

Habitat in Europa praei macilentis ♂

Calycis majores, floris pauciores

Specimen herbari nil valet

repens L. foliis lanceolatis, pedunculis ramosis, capsulis subrotundis

Lin. S. V

Lichnis incana repens Bauh. pin. 206.

Ocymoides Lichnitis reptante radice Col. phytob. 141. T. 37.

Myofotis arvensis, polygoni folio Vaill. panf. 141. T. 30. fig. 5.

Habitat in Gallia, Italia & ~~Francia~~ basi tetragoni

radix repens. Capuli plures fileiformes qd descendentes pedalis in
cultis subramosi, uti tota planta inanis tomentosa. Folia po-

fide herb Tournef

Sci: Synon. Bauh

Cerastium folio tomentosu

tofu H. Havn
var. minor repens
est

qui pollicis anq. obtusiuscula. Pedunculi elongati folia floralia
ovata margines membranacea. calycis foliola lanceolata
petala calyci duplo longiora

caules in superne vesis caules nodos. Caules plures
basi ramosi spithami in cultis longiori inferne tetragona
et tota planta tomento nuceo obducti. Folia polliciana
infernodis longiora. Pedunculus caulem terminans elongatus
bis vel ter bifidus bractea oblonga membranacea ad ramifica-

~~non~~

tionem. pedu flor. dichotomia fissili capsula calycis parum
cum folia in tomentosa oblonga secundum Linne. plantam meam
huius vetuli quamvis incana tomentosa est ob folia lanceolata

Cani folium G. Folio subseptenis linearibus lanceolatis lobatis, pedunculis papillo-
ribus, caulis erecto tetragono Hort. Kew. 1. p. 144.

Rubia Cori lanifolia montis virginis Barrel. Fe. 583.

Galium canifolium Mill. Dict.

Habitat in Europa aq. Australi 4

Temper
de Synonymo
Bot. de curius sum nec plant. in eadon. Test. et de
Columno

Japonicum l. foliis sessilibus obovatis serratis villosis, floribus paniculatis Thunb. fl.
Jap. pag. 312.

Habitat in Japonia ©

Caulis simplex filiformis, pilosus, erectus. Folia attenuata in petiolo semiam-
plexicaulis, obtusa, erecta, pollicaria. Flores terminales. Pappus pilosus, semi-
genus Thunb. l. c.

linear C. foliis linear lanceolatis glabris, pedunculis dichotomis tomentosis.
petalis calycis longioribus
Cerastium linear. foliis linearibus flaccidis angustatis, pedunculis sub-
nifloris tomentosis, capsulis oblongis All. fl. pedem. 2. pag. 365. Tab. 88 fig. 4
Habitat in alpebus Valdensibus

Caulei lati glabri simplicis pithamosi, folia sesquipollucaria acuta
mucronata. Pedunculi terminalis foliatus terni uniflori vel semel
dichotomo divisi. Calycis foliola lanceolata villosa. Capsula caly-
ce duplo longior nuda calycis duplo majora bifida

perfoliatum @ foliis connatis Lin. T. V.

Gmel. p. 4. t. 62.

fig. 1.

Myoporis orientalis perfoliata, Lychnidis folio Tournef. cor. 10. Dill

Esth. 295. 7. 217. fig. 204.

Habitat in Graecia, Sibira @

Tota planta cori glaberrima. Caulis pedalis erecti teretes sulcati superne

dichotomi. Folia remota lanceolata oblonga, glauca virentia.

Calycis foliola oblonga obtusiuscula margine tenui membranacea

Petala calycis vix longiora Capsula per pollicariisstrata

— glaberrima petalis calyce brevioribus

Cerastium

Myosotis orientalis, flore maximo, fructu oblongo Tournef. Cor. 10

Habitat in Cappadocia. ~~hab~~ Tournef. Cor. pag. 107 her

Ceratium

Myosotis orientalis, flore maximo, fructu oblongo Tournef. Bot. p. 110

Habitat in Cappadocia h. Tournef.

Caulis simplicis, ascendens, patens. Pedunculi fructiferi pollicares, re-
flecti. Capsula oblonga, unguiculata

Cerastium

myosotis orientalis, longissimo folio Tournef. Cor. pag. 10.
Habitat in Armenia herb. Tournef.

herb.

elongatum Cerastium

Myofotis montana maxima subhispidata Becken albi-folio flore parvo Michel.

pl. flor. no 131.

Habitat in Etuna herb. Mus.

Caules laxi, subramosi, decumbentes, sesquipedales, striati, pubescentes. Folia
sesplici, lato-lanceolata, venosa, glabra, margine subciliata, integerrima, basi
attenuata, apice acuta. Pedunculi ex apice, 3-4 dichotomi, villosi-subhispidi,
Folia floralia parva, lanceolata. Pedicelli in dichotomia et apice. Calycis
villosi, lanceolati, acuti, margine membranacei. Capsula oblonga, parva
calyce parum longiore, Cerast. p. medicandi parum majore

Cerastium

myosotis tomentosa linearifolia angustiore Tournef. Galt. v. h.

Habitat. herb. fusc.

Totum villosum, subaerescens. Caulis tenues. Folia unguiculata et ultra, lineari,
nervi, aculo armato ciliata, margine scabra, acuta. Pedunculi dichotomi. Bractea
et foliola calycis lanceolata, margine membranacea. Petala calyce longiora
ut venetas Cer. tomentosi

Peratium

Habitat in Sicilia Boccione herb. Mus.
Caules simpliciter, digitales

hobis

rigidum Cerastium

Mesopotia Caryophylli folio incano Theraiv.

Habitat in oriente? herb. Jusf.

Planta cespitosa, digitalis, villosa, canescens. Caules simpliciter, erecti. Folia linearilanceolata, rigidiuscula, radice alia semipollicaria, superiora minoria, Flores terminales. Calyces lanceolati, acuti, striati, margine vix membranacei. Petala calyce majora. Capsula globosa.

Tetradneum \odot hirsutum subrescedum, floribus quadrisfidis Tetradneum, petalis bifidis
calyce brevioribus Smith fl. Angl. 2. pag. 498.

Cerastium Tetradneum Curt. fl. Lond. fasc. 6. tab. 31.

Sagina cerastoides Trans. of Lin. Soc. 2. pag. 343. Engl. bot. tab. 166.

Habitat in arenosis maritimis, muris et ruderalis Scotis \odot

Caulis plures, foliosi, dichotomi, vix paniculati. Folia elliptico-oblonga,
summa ovata. Pedunculi calyce fere triplo longiora, erecti, demum re-
fracti. Calycis foliola hirsuta acuminata. Petala in planta spontanea 4.
in fulta subinae 5. quae oblongata. Stamina raris aequae. Capsula cylin-
drica, calyce parum longior, apice octodentata Smith habitus \odot perian-
thi Smith.

Canatum Canadum

Habitat

Desert la Mancha

Caules plures, interdum longitudine digiti minimi

reflexam ^{linear} C. foliis lanceolatis glabris ^{villoso-pilosis} apice reflexis, petalis calyce longioribus
Habitat ad fretum magellanicum Compositae
Caevis C. arvensis ad folia breviora reflexo patentia. Jamur ^{caulis}
Calycis pubescente caulis diffus. basi ramosi palmatis et ultra ^{fora}
fasciculi foliorum in axillis ex capto in infimis et supremis ramosis
Caevis ^{ramis pubescentibus villosis} ramosi basi saepe geniculati. folia inter nodos breviora
Caevis magni

Semidecandrum C floribus pentandris, petalis emarginatis Lin fl. su. 416+

Cerastium hirsutum minus, parvo flore Pres angl 3. p. 340.
t. 15. fig 1.

Myosotis arvensis hirsuta minor Vaill. parif. 142. t. 30. fig. 2

Habitat in Europa borealis campis apricis sterilibus

Caulis interdum plures vix digitales villosi erecti simplices.

Folia radicalia plura oblonga inferne attenuata caulina 4. 6.

remota oblonga semiamplexicaulia villosiuscula. Pediculi terminalis
subumbellati. Filiformes semianquiculares. Calycis foliola canicola
ta. Capsula calyce parum longior

alpses hirsuta minor Bauh. pin. 251. herb 4usf

in herbis velle pubescens erectus folus oblongis petalis emarginatis
calyce parum brevioribus

pentandrum Ceratium foliis floribus pentandris, petalis integris Loefl. it. 142 * Lin.

S. V. pag. 436.

Habitat in Hispania

Planta minima similis C. semidecandro, a quo differt: colore viridi: nec incano
Staminibus 5 fertilibus, nec aliis 5 anthera destitutis. Petalis calyce
longe brevioribus lanceolatis, acutis, nec acute emarginatis Lin. Sp. l.
c.

non vidi

arvense ♂ foliis linearibus lanceolatis obtusis glabris, corollis calyce majoribus
fl. Dact. 626.

Panophyllus arvensis hirsutus, flore majore Bauh. pin. 210.
Myosotis arvensis hirsuta, flore majore Vaill. Bot. 141. t. 30. fig. 4.

Habitat in Europa 24

Caules basi ramosi diffusim vellosi. Et subramosi folia frequentiora quam in reliquis et unguiculata cum rudimentis omnium in axillis pedunculis terminalibus bis dichotomis

vellosum

vellosi

illyricum ^{ramosissimum} P. foliis lanceolatis oblongis caulebusque dichotomis villosi calycibus
hirsutis ^{sub} tomentosis, petalis longitudine longioribus.

Cerastium illyricum: capsulis ovatis, calycibus foliis barbatis: caule dichotomo ramosissimo Ad spec. 2. pag. 26. tab. 11.

Habitat in Dalmatia C

Caulis ramosissimus rami basi declinati. Folia semperque in laevam
superiora basi angustata, acuta. Calycis foliicola valde attenuata
lanceolata. Capsula calyce longior

Dichotomum \odot foliis lanceolatis, caule dichotomo ramosissimo, capsulis erectis. An l. v.

Alpne corniculata Pluf. bot. 2. p. 184

Lycnis segetum minor Bauh. pin. 204.

Habitat inter segetes Hispania \odot

Cauleis palmatis vel ultra ad articulos nodosis dichotome
ramosis villosis v. pilosis. Solcia polliciana attenuata.

Capsulae laevi glabrae calyce duplo longior.

Myosotis orientalis longissimo folio Tournef. Cor herb. Guss.

alpinum \odot foliis ovato-lanceolatis, caule diviso

fl. dan

Tab. 6

Caryophyllus holosteus alpinus latifolius

Alpine myosotis folia, Lychnis alpina, flore amplo nives,
repens Ray angl. 3. p. 349. t. 18. fig. 2.

13 caule basi erecti Habitat in Alpibus Europae

Caules plures interdum diffusi vix palmares interdum erecti
semipedales teres, vix tota planta herbata, basi ramosi.

14 y. caule basi
foliisque glabris
bui

Folia basi caef. approximata superne remotiora semper
lana vel parum ultra, acuta. pedunculi terminalis plerum
que solitarii interdum gemini alter tridius diphyllo-
foliola calycis lanceolata margine membranacea. Petala
calycis dimidio longiora bifida.

herbata
lancea foliis lanceolato-oblongis + v. am. subunifloris
nitatis calyce majoribus

glabrum P. ^{glabrum} foliis inferiombus obovatis caulini lanceolatis, pedunculi subrang.
Cernitium alpinum glabrum fr. fl. cap. fl. Dan.

Habitat in Finmarkia, Lapponia.

Totum glabrum diffusum. folia ^{multa} angustiora quam in alpino
caulena remota, Caules ascendentes flores magni

~~caulena remota~~

Myosotis *perenni* *procumbente*, *foliis* *linearibus* *lanceolatis*
subherpatis *Lin. S. V.*

Myosotis *Venusino* *foliis* *rigido* *Tournef. G. R. H. 245.*

Habitat *in* *Europa* *australi* *et*

Caules *basi* *ramosi* *fructu* ^{*palmaris*} *ore* *lenti* *inferne* *Venusino* *vellosi*
articulati *articulis* *inferioribus* *brevioribus* *geniculis* *nodosis*
folia *per* *via* *pollicaria* *per* *ventesima* *subtus* *cannata* *supra*
canaliculata *ad* *lenticam* *villosa* *indumenta* *foliorum* *gaspiculata*
in *axillis*. *Peduncululi* *dichotomi* *folia* *floralia* *ovata*
calycis *foliola* *strata*

fructu *foliis* *linearibus* *lanceolatis*
caninatis *rigidis*, *calycibus* *stratis*

Capsula *calyce* *longiore*

mollisimum Cerastium

Habitat in Penn herb. tussoi :

Caules herbarii, ramosi: articuli breves. Stipulae semipluricaulis, pollicinae, lanceolatae, uti tota planta incano-tomentosa, integerrima, acuta, frequenter sima. Pedunculi terminales, bi vel ter dichotomi: pedunculus dichotomus post florescentiam reflexus. Pappi foliola lanceolata, villosa-viscosa. Petala semitripida. Capsula cylindrica, semipollicaris, fere her. perfoliati

Strictum & foliis linearibus acuminatis glabris ^{puberulisque}, pedunculis unifloris sub-
somentosi, capsulis globosis Lin. Spec. pl. p. 629 Jacq. collect. 2. p. 65
Alpine alpina puberula, linearis foliis Schreb. alp. 2. p. 130
Habitat in alpidibus austriacis.

Caules vix palmares basi ramosi ascendentes ad lentem villosi
~~folia~~ folia stricta attenuata, rudimenta foliorum in axillis
setacea. Pedunculi terminales gemini vel terni uniflori
Calycis villosi uti pedunculi. Folia interdum puberula

Similis arvensi ~~differe~~ videtur foliis capsulis globosis

Petala calyce longiora pedunculi triflori vel biflori

maximum Pendulum foliis lanceolatis serratis, petalis crenatis, capsulis globosis len.
S. V. p. 436. Gmel. fol. 4. pag. 150. tab. 62. fig. 2.

Gmelin sibir. T. 4. t. 62. fig. 2.

Habitat in Sibiria O

Caulis sive pedalis inferne hirsuti superne glabri, erectus sili striat.

Folia petiolata. Gmel.

aquaticum P. foliis cordatis sessilibus, floribus solitariis, fructibus pendulis
fl. Jac. n. 4134

Alpinae major Bauh. pin. 250.

Alpina maxima folan. folia Mentz. pug. 2. 4. 1. fig. 3.

Habitat littora lacuum Europae &

Rami pubescentes

Caulis angulatus pedalis vel plus saepe apice dichotomus; articulatus
folea polluciana et ultra parum attenuata venosa subtus villosa
scabra. Pedunculi ex dichotomia et apice pubescentes. calycis folio
la ovata acuta ^{spinata} pubescentia petala calycis vix longiora

lyvaticus O caulebus decumbentibus hirsutis ramosis Len. Mant. 67. t. V. p. 667a

an demum altero lyvatico

Drosera Q. *hermaphrodita*, foliis lanceolatis, floribus dioicis, petalis calyce
triplo majoribus Hort. Kew. 2. p. 120.

Habitat in Hispania &

Caulis decumbens, vertes villosi, folia simplicia, folia lineari
lanceolata pollicina villosa pedunculata dichotoma, folia
floralia lanceolata margine vix membranaceo, foliola lance
calycis lanceolata attenuata corolla magna.

Facies Cesp. arenosae

obtusifolium C. foliis oblongis obtusis, ^{glabris} caulebus basi repantibus, pedunculis
solitariis

Habitat in Bonana? ^{Thoum}
^{in v. quadrupollucis}

Caules filiformes ramuli axillares brevibus: Cilia vix unguia
longa. pedunculus axillaris cum ramulo ulterius est repente
unifloris Calycis foliola obtusa

norvegia a.

latifolium C. foliis ovatis subtomentosis, ramis unifloris, Capsulis globosis

Lin. l. V. p. 4367

Caryophyllus holosteus alpinus latifolius Bauh. prodr.

104. pen. 210.

Habitat in alpebus Helvetiae 2 palmarum

Caules filiformes prostrati villosi subtomentosi. Folio unguiculata
acuta interdum basi versus panem angustata. Pedunculi ter
minales plerumque solitarii uniflori
folia uti et foliola calycina laxiora quam in alpino

Benghalensis B.

Tomentosum Q. foliis oblongis tomentosis; pedunculis ramosis, capsulis
globosis. Lin. S. V.

Caryophyllus hololeucus tomentosus latifolius Bauh. prodr. 104
 n. 210.
V3. Caryophyllus hololeucus tomentosus angustifolius Bauh. prodr
 104. n. 210.

Habitat in granada &

~~Radix repens caulis plures ascendentes sub ramosi uti tota
planta tenax tomentosa pedales. folia sesquipedaliana
obtusiuscula. Pedunculi elongati; folia floralia ovata
margini membranacea. Calycis foliola lanceola. Petala
calyce duplo longiora. Petala bifida~~

lanceolata

non vidi

manticum Q. glabrum caule strato, foliis lanceolatis, pedunculis longis
fructibus capsulis globosis. Lin. Am. acad. 4. p. 315 4
Alfene canophylloides glabra, florum pediculis longissimis Legu.
veron. 3. p. 170. t. 4. fig. 2.

Habitat Veronia C

Caules ^{plures} ~~erecto~~ ^{erecto} strati glabri inferne pubescentes basi tam
superne in pedunculo dichotomo divisi. Flores. Folium remot
basi subconnata pollicaria. floralia ovata acuminata per
marginem membranacea. calycis foliola lanceolata margine
membranacea.

^{erecto}
caule teri, foliis linearibus lanceolatis