

Cerbera

1. akorai C. foliis ellipticis
2. manghar C. foliis lanceolatis: transversalibus
3. Theretia C. foliis linearibus confertis

ovata Cereus folius ellipticis obtusis Willden. Spec. pl. pag. 1222
Cereus ovata foliis ovatis prostratis subsessilibus, floribus terminalibus
subquibus Caran. v. 3. p. 35. Tab. 270.
Habitat in Nova Hispania ♀

parviflora C. foliis obovatis stellatis Forst. fl. Austr. pag. 19
Habitat in Tropicis Americae

Saludoni Cerebra foliis et fructibus ovalibus Lour. fl. Cochin. pag. 136.

Lactona salubri Rumph. amb. Lib. 3. pag. 259. Tab. 84.

Habitat ad littora maris Cochinchinae.

Arbor medicini. Folia oblongo-ovata ovale obtusa, integerrima nitida, costa obliqua, ad apicem ramorum confertis subpetiolata. Racemi subterminali parvi. flores albi nodosi. Calicis calycis subulata. Calicis corolla oblonga carnea. Stylis crispis curvatis. Tubum corollae rumpens. Stigma tuberculatum truncatum. Drupa ovale magna.

manghas *C. foliis lanceolatis: nervis transversalibus* Lin. Spec. pl. pag 303 &

Flor. zeyl. 1064

manghas fructu venenato Bauh. pin. 440.

odollam Rheed. mal. 1. p. 71. t. 39.

Cibor lactaria Rumph. amb. 2. p. 243. t. 51.

Manghas lactescens, foliis nervis crassis venosis, Gafmini flore, fructu per
sui simili venenato Burm. zeyl. 150 t. 70. fig. 1.

Habitat in India ad aquas

Rami glabri purpureascentes. Folia petiolata, sparsa basi
versus attenuata superne sesquicinctam lata acumina
sa ^{composita} ~~sa~~ ^{per ramum} ~~per ramum~~ ^{pedalia} ~~pedalia~~. Racemi terminalis ramosi
inæquales pedicelli sursum rufaspati. Calyx pentapetalus
folioli ovati acutis deciduis. Corolla infundibuliformis
calyce duplo longior interne angulatus.