

Cerinthæ

1. major C. corollis obtusiusculis patulis
2. minor C. corollis acutis clausis

apera *Ceanothe*. corollae obtusipetali cylindricae staminibus corollam
aequantibus Roth cat. bot. 1. p. 33.

C. flavo flore apertior Bauh-pin. 2512

C. quoniamdam major. spinoso folio, flavo flore Bauh
~~pin~~ hi 3. p. 602.

Ceanothe major ps. Lin.

Habitat in Europa australi. C.

major ♀. foliis amplexicaulis, corollis obtusifoliis patulis Lin. l. v. p.

Perianthe flore rubro purpurascente Bauh. pin. 250.

B. Perianthe, flavo flore, a. p. Bauh. pin. 250.

Habitat in Europa Australi ^{basif}

Caulis teres glaber. Folia cordato-orata ^{cuneiformis cordatis} pell. superosa pollicia

na, ^{omnibus} obtusissima, integerrime arena, squamis albidis adpressa

marginata, supra, supra ciliata. Peduncululi terminales

tandem racemosi filicem ad singulum pedicellum corollae

duplo vel triplo majoris quam in inferiore, latius ovatis

radicalia in petiolum
atenuata
caulina basi
angustata
suprema
cordato ovata

2 minor \varnothing foliis amplexicaulis, ^{integris} corollis acutis clausis Lin. V.

Paq. fl. austr. 2. t. 124

Cerinth minor f. quarta Clus. hist. 2. p. 160

Cerinth minor Bauh. pin. 250.

13 Cerinth foliis amplexicaulis emarginatis, corollis acutis clausis
Lin. Spet. ed. 1. p. 137.

Habitat in Austria et Styria ayni 2

Caulis stratus glaber, ramifus decumbens. Folia amplexicaulia
inferiora cuneata ^{repens} superiora cordato oblonga, punctata uti pro
cedenti, nonnulla interdum et superiora margine subciliata
Racemi ex apice ramorum. Flores tandem d. stratis foliis oblongo
laciniolatis acutis sub papulo pedicello. Laciniis calycis
laciniolatis. Corollarum laciniis tubulatis