

Cenpegia

1. candelabrum C. umbellis pendulis, foliis exitis
2. biflora C. pedunculis bifloris, foliis oblongis mucronatis
3. sagitta C. umbellis subsessilibus, foliis sagittatis
4. venusta C. umbellis pedunculatis, foliis linearibus

Funcea

Cepogia caule foliis subulatis sessilibus floribus subrim bellatis, caule
corollis infundibuliformibus laciniis linearibus elongatis
Habitat in India orientali. In Prothes.

Caule volubili caespitibus glabris. Folia unguis clava, opposita
acuta glabra integerrima. pedunculi laterales ^{subulati} ^{longiores}
apice ~~max~~ ^{us} ^{inter} ^{quaque} ^{flori} ^{pedicelli} ^{con} ^{approximati} ^{versus}
apicem pedunculo parum breviores uniflori. Corolla sesquipolli-
cans ~~Dubus: inferne~~ ^{inferne} ^{se} ^{incurvis} ^{basi} ^{subglobosis} ^{superne}
 dilatatus laciniis corollae linearibus lanceolatis attenuatis
to sesquipollicaris.

angustifolia Cerropegia

Habitat

Herb. Desfont.

Caulis fruticosus. rami teretes, glabri, tener. Folia brevissime petiolata, tripol
licana, linear-lanceolata utrinque acuta, glaberrima, enervia, venis
subtus pallidiorum. Umbella axillares, triflorae, brevissime pedunculatae
Corolla laciniata uti calyci ovato

nitida Ceropegia

Habitat in St. Domingo. Herb. Desfont.

Caulis fruticosus, volubilis, ramifugus; teres: rami vellofolii. Folia petiolata, opposita, pellucida, lanceolata, acuta, basi obtusa, glabra, arenia, nerva supra nitida, subtus pallidiora, nervis paucis ramosis. Petiolus brevis, vellofolius. Umbella axillaris, 6-8. florum. Pedunculis brevissimis: pedicelli pedunculo paucum longiores. Corolla unguiculari. Calycis lacinae ovatae

angustifolia Ceropegia

Periploca scandens longissimis et angustissimis foliis Plum

Habitat in America meridionali herb. usq.

Rami teretes, glabri, elevato punctati. Folia petiolata, 3 pollicaria et ultra, sparsa, lineari-lanceolata, attenuata, glaberrima, subtus pallida, supra nitida, uscula, avenia. Pedunculi axillares, unguiculares, biflori. Calycis lacinis oblensa. Corolla brevior.

tenusifolia C

foliis linear lanceolatis Lin. S-V

~~nam nudi Rheed. mal. 10. p. 67. t. 24~~

*Apocynum frutescens frutescens rigidis et prolongis foliis bullatis
floribus Pluken. mant. 17. t. 338. fig. 5*

~~*Periploca tenuifolia*~~ *foliis linear lanceolatis* Lin. Spec. pl. p. 310

Habitat in India

Caulis volubilis et liiformis glabrescens. Folia septem
angusta glabra revoluta, bipollicaria opposita umbellae
axillares pauciflorae calycis lanceolati abbreviati

umbellae subsessilibus.

pulvis emesum excitat, hinc Pharmacopoeia Peruvianae
sub rub. Proyeri

~~*Periploca tenuifolia*~~ an Synonyma Burm. hinc retinetur

condata Peruvia folus cordatis, umbellis pendulis Laur. fl. Cochinch. pag 114

Habitat in Cochinchina

Caulis scandens teres, folia integerrima, glabra opposita - Petioli ter-
gi - floris vndi: lutei - Umbello magna axillares longe pe-
rennitate - Nectarum glandula 10 oblonga postillum circumscripta

non vid.

obtusa Ceregrina foliis obtusis, caule volubili Lous. fl. Coch. pag. 114

Habitat in Cochinchina

Caulis filiformis tenuis, glaber. folia oblonga in verticillis, plana
pauca. flores pallidi similes Cer. candelabra pedunculati breves.
folliculi apice refracti

non vidi

biflora C. pedunculis bifloris Lin. fl. zeyl. 46*

Habitat in Zeylona 5

Caulis filiformis glabri volubiles. Folia petiolata oblonga
nervosa tenuia mucronata sequipollicaria remotissima

Pedunculi laterales folio longioris biflori. Corolla tubulosa
pollicaris lacini 5 lanceolati apice in setam pinnatam
culariam dependentia. Folliculi subulati 3 pollicares glabri

folus oblongis mucronatis

Sagittata. ² umbellis ⁵ f. plibus, foliis sagittatis Lin. Mant. 215 * L. V. p. 255

Cynaridium radice glandulosa, foliis angustis ⁵ lineatis, floribus unicoloris
miniatis Burm. afr. 36. t. 15. ⁵ ut huius pertinet ad

Habitat in C. b. spec. arenosis 4

Caulis volubilis lignosus ramis oppositis tomentosis. Folia
⁵ petiolata, unguiculata, cordato-lanceolata utraque ⁵ ~~ramis~~
velloso subtomentosa, margine reflexa, subtus albida
umbella axillaris 5-6 floris pedunculo brevi: pedicelli
pedunculo longioribus. Calyx tomentosus corolla dimidio
brevior

tuberosa *Ceropegia* foliis ovatis acutis, umbellis erectis, radice ^{ro}perste

tuberosa

Ceropegia tuberosa Rostburgh. Corom. 1. p. 12. tab. 9

Habitat in India 3

non vidi

acuminata *Ceropegia* foliis lanceolatis longe acuminatis, umbellis multifloris verticis, radice bulbosa
Ceropegia acuminata Roxb. Corom. 1. p. 12. V. P.
Habitat in India orientali 4

non vidi

bulbosa *Ceropegia* foliis obovato-ellipticis cuspidatis umbellis erectis,
radice bulbosa

Ceropegia bulbosa Roxb. Corom. 1. p. 11. tab. 7

Habitat in India orient. 7

non vidi

Candellabrum Ceropogia umbellipendulis, floribus erectis Lin. S. V. p. 259

Nota - nodum - valli Rheed. malab. g. p. 27. Tab. 16.

Habitat in Malabaria 4

Raulis volubilis geniculis subentibus. Folia petiolata ovata,
acuta, ^{trifida} glabra. Pedunculi ex apice ramulorum
^{pendentes} umbellae pedicelli adscendenti. corolla aucto basi globoso
tubo cylindrico pollicari