

# Cestrum

- <sup>1</sup>  
<sup>eadem</sup>  
<sup>pubescens</sup>  
nocturnum C. filamentis dentatis; pedunculis subracemosis foliis equalibus  
diurnum C. pedunculis brevissimis foliis ellipt-oblongis nitidis; filamentis edentatis, stipulis nullis  
auriculatum C. filamentis edentulis; stipulis lanceatis, foliis ellipticis.  
Parqui C. filamentis denticulatis nudisve, caule florifero paniculato, stipulis  
lineari-bus, foliis angusto-lanceolatis  
launifolium C. filamentis denticulatis nudisve, foliis ellipticis concavis nitidis,  
pedunculis petiolo brevioribus  
septentrionale C. filamentis edentulis, tubo filiformi; pedunculis brevissimis  
tomentosum C. floribus confertis sessilibus terminalibus, ramis foliis calycibusque to-  
mentosis  
hirtum C. floribus subspicatis axillaribus, foliis subcordatis ovatis acutis subtus  
ramulisque hirtis.  
oppositifolium C. foliis oppositi

macrophyllum a latifol. Aitard differt herb. Reich

*allosum* *Castro*

Habitat in America meridionali herb. Desfont

Rami teretes, inferne glabris, superne, uti folia subtus, calycis et corollae extus villosi, villosi subpellati. Folia petiolata, semipollicaria, ovata, acuta, venosa, obtusa nervosa, integerrima, utrinque a punctulis elevatis scabrispulo. Flores axillares vel in apice ramorum, sessiles, semipollicares, quaterni. Calycis laciniis subulato. Corollae tubus tenuis: laciniis lanceolatis

*myrtifolium* Cestrum

Habitat in Bonaria herb. Tus.

glabrum - folia petiolata, semipollicaria, obtusa, basi acuta, avenia, <sup>interdum axillaria, basi flor.</sup> enervi.  
raci. Flores in apice ramorum: pedunculi brevissimi, s. 6 flori. Corolla semipol-  
licares: laciniis limbi s. 6. lanceolata, villosa.  
a *C. parqui* diversum.

*pulvulentum* Cestrum

Habitat Capana Pichad 5

Rami teretes, glabri, apice, uti petioli, pedunculi et calycis pulvulentato tomentosi. Folia petiolata, 3-4 pollicaria, elliptica, obtusa, venosa, glabra, subtus pulvere stellato-punctata, supra nervi sulco exarati. Pedunculi axillares, plures, brevissimi, uniflori. Calyx tubulosus, unguiculatus. Corolla glabra, calycis duplo longior. Lacinae lanceolatae. Filamenta edentula

pallidum Cestrum

No. 204. fig. 2.

Herb. Mus.

Totum glabrum. Rami teretes. Folia petiolata, alterna, bi- & tripollinaria, ovato-oblonga, acuta, venis. Racemi ex apice ramorum, 3-4. non semipollicares, 3-4 flori. Calycis dentibus ovatis. Corolla unguiculari: laciniis ovatis. Filamenta nonnulla, edentula.

*longifolium* *Pestrum*

Habitat in Guadeloupe herb. Surinam.

Rami teretes, glabri. Folia petiolata, spithamea, lanceolata-elliptica, utraq[ue] acuta, glabra, subvenosa. Racemi axillares et terminales, unguiculares. Calyx glaber: laciniis ovatis. Corolla unguiculari ~~tubulosa~~: laciniis subulatis.

*Cestrum*

Habitat in India occidentali herb. Surian

Rami teretes, glabri. Folia quinque pollicaria, elliptico-lanceolata,  
acuminata, venis pme venosa, glabra. Racemi semipollicares

<sup>Cestrum</sup>  
auniculatum filamentis edentulis stipulis lunatis L. H. Joff. p. 41. \* tab.

35  
Hedwinda Tasmianensi flore Tenell. obj. 3. 25. tab. 20

Habitat in limo humidis inque semivivaceo usum sideratis reperitur  
a sepestrino differt floribus paniculatis, foliis planis, stipulis  
auniculatis. a & Parqui caule minus paniculato, stipulis luna

folia juvenia

oblongo-lanceolata

demum et superis

ve ovata & stipulis

subtus folia gemma

non axillares

pedunculati axillis

tom inferioribus

quam superioribus

& l. Penn. l. c.

to tubo corollae cylindrico, filamentis edentulis

Rami glabri Ramuli pubescentibus tomentosi

Folia petiolata alterna lanceolata elliptica integerrima

obtusis tripollicariis glabra venella pubescentibus tomentosa

stipulis axillaris pedicelata unguiculatae foliaceae summi

stipulae axillares foliosi axillares foliis duplo longiores

pedunculati alternis oppositi 3-7 flori flori in apice

superioribus calycis calycis calycis calycis calycis calycis calycis

sub corolla utraque margine utraque tomentosa

Cestrum auniculatum foliis ellipticis lanceolatisque auniculatis obli-

que cordatis, ramis floriferis  
Cestrum hedwinda La Marti Egypt. <sup>vergentibus; pedunculis compositis</sup>  
paniculatis fides 2 pag 28 t. 155 f. a



*Astragalus*

*Astragalus fruticosus*, floribus axillaribus septibus Torr. Descript. pag  
139. n. 33.

Tota planta densissime pilosa alba.

Caulis annuus, erectus simplex, teres, fartus, rigidus, crassitie pennis anse

<sup>in no.</sup> folia opposita, pennata foliolis 29 jugis, alternis, subsessilibus, sub  
cordato-subrotundis, emarginatis unguicularibus extus serfim de crepente

bas, supra minus pilosis junioris seriei

Stipulae ovato, acuminato, unguiculares latere interiori  
glaberrime.

Flor. sessilis plerumque Corolla sulphurea

ex omnibus axillis

legumina sessilia, patenti, incurvata; apice stylo recto, bi  
loculano, pollicipona utraque angustiora lanata

Parqui *Cestrum filamentis denticulatis nudisve*, caule floriferi pani-  
culato, stipulis linearibus L'Herit. fol. 4 pag 73. t. 36 \*

Parqui Deuille fol 3. 52 t. 32.

Habitat. Chili

*filamenta denticulata*  
base tumida nullo

ca. folia videri

lata gemma axi

lanceolatis per

stipulis v. l. c.

foliis in petiolo

Stipulis linearibus, tubus clavatus, laciniis lanceolatis  
(~~ca. laurifolia differt pedunculis longioribus, limbo corollae~~  
~~latiori, filamentis nudis foliis lanceolatis, floribus albis~~)  
se diurnum a laurifolia differt

Rami glabri cinerei folia frequentia angusta lanceolata  
ut nunquam attenuata ut nunquam glaberrima integerrima

triflori vel quadrisyllabian. Pedunculi et alii supernantes  
pallidiusculi apice triflori. laciniis calycis subulosis. Corol-  
la clavata laciniis margine tomentosis

Stipula parva angusta

foliis angustis lanceolatis

*Cestrum virgatum* foliis lanceolatis acutis, ramis floriferis paniculatis  
pedunculis compositis  
5 *Cestrum jamaicense* varietal. 15 la Mark Enc.

Affinis *Cestrum* *Chrysanthemum* *diffusum* a *hololepis* *lym-*  
nibus *concolor* *pallidius* *foliis* *angustis* *trifloris* *apice* *trifloris* *laciniis* *calycis* *subulosis* *corol-*  
la *clavata* *laciniis* *margine* *tomentosis*

*Astragalus falcatus*, <sup>glaber Cyminibus</sup> caespitosus erectus, floribus subracemosis pendulis  
falcatis

2 habitat in Sibiria, communicavit amicis primis. de La Marti Autor Encyclopedie  
et nova Botanica colligenti

1 *Astragalus falcatus* Caespitosus erectus, floribus spicatis, leguminibus  
pendulis subfalcatis flore luteo Encyclopedie nov. pag. 310. ne 4.

Caulis erectus <sup>terre</sup> glaber striatus superne parum flexuosus; Ramuli breves  
in axillis erecti

Folia pinnata, petiolata; foliis 31/33. alternis subpetiolatis oblongis acutis  
glabris

~~Stipulae membranaceae~~ utrinque una <sup>longioribus</sup> ovata lanceolata acuminata  
Pedunculi vespes summatae <sup>longioribus</sup> patentes folio <sup>longioribus</sup> 3-4 pollicari  
legumina pendencia <sup>marginata</sup> falcata, acuminata <sup>marginata</sup> inferius convexa  
<sup>na. arvo</sup> folio suturali superne acuta <sup>na. arvo</sup> acutius in calyce sessile glabra bilobata  
semine utrinque 6.

Campanulatum Cestrum

Habitat in Peru Dombey herb. Guss. 3

Rami teretes, glabri, superne ciliati & tuberculati; superne villosi, cortice griseo. Folia petiolata, bipollicaria, elliptica ovata, attenuata, integerrima, utrinque villosa, aranea, obscure nervosa, basi acuta. Petioli unguiculares. Pedunculi infra foliarios, aggregati, copiosi, uniflori, unguiculares. Calyces glabri dentibus ovatis, obtusis. Corolla campanulata, brevis.

an dycum aggregatum DC. Peruv.

*Salicifolium* *Cestrum*?

Habitat in Pem. herb. 4. usq. 5

Totum glabrum. Rami cicutricato-tuberculati. Folia petiolata, bipollicaria  
et ultra, lato-lanceolata, utrinque acuta, subsensosa. Racemi terminales, semi-  
pollicares, solitarii. Calycis tubulosi, angulati. Corolla unguis<sup>2</sup> lareos. Stylus  
superius crispus. Stigma obtusum.

confer cum *Lyco umbellato* fl. Per.

validum *Cestrum vacinoides* compositis axillaribus, floribus parvis pallidis  
foliis ovato-oblongis acuminatis ha Math T. & 2. p. 5.

Sloan herb. jam. 2. t. 204. fig. 2.  
Habitat in Jamaica 5

Lanuginosum Cestrum

Cestrum lanuginosum; foliis ovatis subcordatisque, pedunculis suboppositis foliosis: partialibus 6 floris, floribus sessilibus H. Pers. pag 30  
Tab 157. fig. a.

Habitat in Peninsulae collibus arenosis

Lanugine helvula obtectum. Caulis fruticosus, triulnaris, erectus, inferne glaber, granulatus. Rami subpendentes, longi teretes; tenues valde lanuginosi. Folia breviter petiolata, ovata, nonnulla subcordata, acuta, integerrima, subtus magis lanuginosa, submembranacea, venosissima. Pedunculi axillares, folio brevior, foliosis; suboppositis: partialibus 5-6 flori. Flores sessiles; basi bracteae lanceolatae. Calyx lanuginosus, brevis, 5que dentatus. Corolla luteo viridescens; glabra: limbo extus atropurpureo, tomentoso. Filamenta ciliolata. Baccæ nigra, tri vel 4 sperma H. Pers. l. c.

fl. axillares et terminales

Conglomeratum Cestrum

Cestrum conglomeratum foliis lanceolatis, acutis, floribus axillaribus  
numerosis, sessilibus. Conglomeratum Fl. Peruv. 2. pag 29 Tab 156. fig. a

Habitat in Peruvia prostratum, et alti Injido locis

glabrum, graveolens. Caulis fruticosus, terroreus, erectus, ramosus, ramis  
ramis patentibus, teretibus. Folia petiolata, lanceolata, integerrima, venosa,  
patentia. Flores axillares, numerosi, in tres globulos aggregati, sessiles.

Bractea ad basin florum lineari, lanuginosa. Calycis epica hirti et pur-  
purei. Corolla lutea, laciniis acutis purpurascens. Filamenta  
dentula Fl. Per. l. c.



*Strigilatum Cestrum*

*Cestrum strigilatum*, foliis cordatis acutis, pedunculi geminis racemoso  
paniculatis, altero breviori Fl. Per. 2. pag. 29. tab. 156. fig. 6.

Habitat in Penna nemoribus.

Laevigata brevi strigiliformi adpressum. Caulis fruticosus, prophylli  
ramosissimus, erectus. Rami subpatentes, verticilli, caule magno pubescenti  
centi. Folia breviter petiolata, dependantia, cordata, acuta cum brevi acu  
mine, integerrima, supra glabra. Pediculi axillares, gemini panicu  
lata racemosi, altero breviori. Flores subsessile, basi bractea minima  
calyx corolla 4plo brevior. Corolla luteo-rosida; tubus curvatus, filamen  
ta edentula. Bacca obovata, truncata, obscure violacea fl. p. l. c.

flor. racemosi

undulatum Costum

Costum undulatum, foliis ovatis acutiusculatis, pedunculis axillaribus  
terminalibusque gracilibus paucifloris *Fl. Penn. 2 pag 26. tab. 155. fig. 6.*  
Habitat in Pennsylvania versuris, nederatis et rapibus &  
glabrum, foetidum. Caulis fruticosus, terogyalis, granulatus. Rami patentes,  
teretes, longi, virgati, teneri. Folia sparsa, breviter petiolata, reflecta  
subcannata, ovata, acuta, integerrima, undulata, nitida. Petioli  
inflexi. Pedunculi axillares, terminalesque, solitarii, filiformes,  
subrotundiflori; in flore foliis brevioribus, fructiferi folia aequantes. Flores  
breviter pedicellati <sup>pedicellati</sup>. Bractea linearis decidua ad basin pedicellorum  
Corolla lutea, calyce triplo longior: limbus pubescens. Bacca  
violacea, obovata, biloculari, intus exsucca. Semina 6. libera & l. l.

folia ovato oblonga

*Conyflorum Cestrum*

*Cestrum longiflorum* foliis ovato-oblongis acutis, pedunculis terminalibus, paniculato-racemosis, corollis longissimis Fl. Peruv. 2. pag. 20  
Tab. 154. fig. a.

Habitat in Peruvia nemoribus  
Caulis fruticosus, terribilis, erectus. Rami teretes nitidi; tenes pubescentes. Folia breviter petiolata, ovato-oblonga, integerrima, supra nitidissima, venosa, bipalmata: juniora leviter lanuginosa. Petioli tubi on totti. Pedunculi terminales, lanati, paniculato-racemosi, foliosi; pedicelli axillares, quatuor-sexflori. Flores breviter pedicellati; basi breviter lan-  
ceolata. Calyx lanuginosus, denticulis 5: parvis. Corolla longissima sesquipollicari, purpurascens. Tubus corollae glaber. Limbus marginibus extus lanatus. Bacca purpurea, obovata, magna, bilobulata  
Fl. Peruv

pedunculi terminalis floribus racemosis

racemosum *Cestrum* ~~foliolatum~~

*Cestrum racemosum* foliis lanceolato-ovatis acutis, racemis brevibus compositis  
1-3 noque, intermedio productiore Fl. Peruv. 2 pag. 29 Tab. 15<sup>4</sup> fig. 6.

Habitat in Peruvia nemoribus &

glaberrimum. <sup>foetidum</sup> Caulis fruticosus, trioryzalis, erectus. Rami longi, ten-  
tes. Folia petiolata, subhorizontalia, lanceolato-ovata, acuta, integer-  
rima, venos, supra nitida, bipalmata. Petioli breves & subtortati.

Peduncululi axillares, solitarii, trii ternaque, racemosi, intermedio pro-  
ductiori. Calyx minimus. Bacca subglobosa, violacea, biloculari  
4 sperma, magnitudine pisi parvi Fl. Peruv

Folia ovato lanceolata

Confertum *Cestrum*

*Cestrum confertum* foliis ovato-ovalibus acuminatis coriaceis confertis; semi-  
floribus axillaribus congestis sessilibus Fl. Per. 2. pag. 29. tab. 153. fig. a

Habitat in Peruvia Sylvis

8  
Flos Pauli fruticosus, bracteato, erectus, fuscus, superne ramosissimus. Ramae diffusae, compressae, salteretes, dilute fuscae, aliquando granulatae; glabrae. Folia sparsa, conferta, breviter petiolata, omnia basi spectantia, ovato-ovalia, acuminata, integerrima, coriacea, utrinque glabra, supra nitida, marginibus leviter revolutis, nervo supra prominulo, venosa venis utrinque elevatis. Petioli & subcostae, supra canaliculati, atrii; axillis lanuginosis. Flores axillares congesti, sessiles, basi bractea ad singulum, ovatis; concava, exteriori lanuginosa, femineae. Calyx viridi ater, ore ciliatus. Corolla lutescens, calyce quadruplo longior: limbus exterior ater, marginibus leviter tomentosus. Filamenta edentula. Baccae atrae purpureae, magnitudine pari fl. Peruv. l. c.

Folia oblonga, acuta.

Cestrum

Cestrum scandens, # folio ovatis attenuatis glabris, racemi axillaribus subim  
# filamentis edentatis, # ramis caule scandentibus  
# foliis, Habitat prope St. Martham non horti

Rami teretes; glabri.

Folia petiolata, alterna, remota, bipollicaria, sursum versus sensim  
minora, ovata, attenuata, acutiuscula, integerrima, venosa, glabra,  
obscura venosa.

Eadem forte ac fermen  
torum Richard ad rivum  
Manzaneros St Martho

Petiole unguiculares. Stipulae nullo.

Litr. G.p. 25.

Pedunculi axillares, solitarii, palmares, superiores breviores, tenues  
pubescentes. Pedicelli filiformes, pollicares, sensim breviores, remoti  
glabri: inferiores triflori: floribus pedicellatis. Bractea parva, ovali  
lineari ad basin calycis, parva lineari

Calyx oblongus, tubo corollae ampliori et quintuplo brevior, quinque  
dentatus: Dentibus minutis.

Corolla sesquipollicaris. Tubus filiformis, versus faucem six uncias  
satur. Limbi lacini subulato, fere unguiculares

Filamenta quinque brevissima sensus faucem tubi, Dentula. Antho  
nae globose.

Quoniam minutum, subglobosum. Stylus capillaris, longitudine tubi. Stigma  
dilatatum obtusissimum

Cestrum latifolium, filamentis dentatis, <sup>subvillosis</sup> ramis superne folisque ellipticis subtus pulverulentis, axillaribus brevissimis, stamentibus dentatis.

Cestrum latifolium racemi brevissimis axillaribus; foliis ovatis glabris, petiolisque subtomentosis La Mart. Tabl Enc. Tom. 2. pag. 5

Habitat in insula Trinitatis Ryan &  
Rami elongati, alterni, teretes, grisei, punctati pulverulento-villosi; inferne glabrescunt.

Folia petiolata, alterna, quinque vel sex pollicaria, pollicis tres fere lata, elliptica, interdum basi subovata, integerrima, acuta, venosa, nervosa, subavenia, supra glabra, subtus leviter pulverulento-subvillosa profertur in costa et nervis.

Petioles sesquipollicares, pulverulento-villosi. Stipula nulla

Racemi axillares, inferne terni, <sup>superne</sup> gemini, versus apicem solitarii, quinque vel octoflori. Pedunculata communis <sup>et</sup> racemosa petiolo duplo brevior, uti pedicelli pulverulento-villosi. Pedicelli brevissimi alterni.

Calyx brevissimus, pulverulentus, quinque dentatus.



Corolla tubii pollicaris, gisiformis, sursum sensim incrassata. Grimbi laci  
nō lanceolato, acuto.

Silamenta versus faucem tubi, brevissima, adentula. Anthera globosa.

Germe . Stylus capillaris, longitudine tubi corollae. Stigma capitatum

Bacca oblonga, bilocularis. Semina

Semina duo in singulo loculo.

(a C. h. Swartzii videtur differre foliis non subindatis nec subtus hirsutis.)

nocturnum filamentis dentatis, pedunculis subracemosis foliis oppositis  
 L. Her. fol. 4 pag. 70.  
 C. Nocturnum <sup>racibus pedunculatis foliis subordato ovatis</sup> hinc sum synonym: except. fenellae in 1. V  
 Cheococia nocturna foliis alternis haicu. amer. 60.  
 C. noct. pedunculis multifloris; corolla tubo in fundi biliformi  
 limbi laciniis ovatis Musc. nov. Com. gott. 5. p. 44  
 Symplocos laurifolia jamaicensis, floribus et flavo pallidior  
 Aubl. Plur. alm. 35. t. 64. fig. 3.  
 Tasmunum laurifolia, flore pallido fuscis, fructu atro  
 canaliculo polygynico venenato Sloan. bot. 2. p. 96. t. 204.  
 fig. 2.  
 Tasmunodes foliis pershaminis, flore viridiflora noctu odora  
 Vespino Dell. Elth. 103. t. 153. fig. 105  
 Habitat in Jamaica Hispaniola  
 Ramis glabris. folia petiolata elliptica 4 pollicaria distan-  
 tia glaberrima pedunculi axillares longitudine foliorum  
 basi pedicello uno vel altero uni s. biflori, floribus pluri-  
 mi 2 5: inferiori parum remoti superiores subterminalis sessiles  
 Corolla clavata.

Falcato  
rhomboidali

Cassia foliis septemjugis lanceolatis, <sup>extimis</sup> majoribus, petiolis eglandu-  
latis, leguminibus <sup>immaturois falcatis</sup> rhomboidales <sup>compressi</sup>  
habitat in arabia <sup>in</sup> Col lect: Torri. absque nomine inventa

Caulis teres lavis

Folia pinnata, septemjuga. Siliola falcata lanceolata glaberrima

semper majoribus.

~~Glandula nulla in petiolo. Petiolus quadriflorus, glandula nulla~~  
~~in petiolo. Petiolus quadriflorus, glandula nulla~~  
Petiolo longiore, solitarii.

Floris rademose. <sup>decidui</sup>  
Corolla flavo-purpureis. <sup>decidui</sup>  
germen villosam

Legumen glabrum <sup>rhomboidale</sup> compressum, <sup>maturum oblongum,</sup> <sup>utrinque</sup> oblique  
rotundatum, pollicare, immaturum falcatum

Semina 4-6.

a Senna differt numero et figura foliorum leguminibus maturis  
non falcatis

a Aquadrina siliolis extimis majoribus petiolis eglandulatis

diurnum *Cestrum* floribus sessilibus. Len. S. V. <sup>L'Her. Suppl. pag. 744</sup>  
Gasmioidei. laevigata foliis, flore candido interdum dorato Will.  
Eltz. 186. t. 74. f. 186.

*C. diurnum* pedunculis multifloris, corolla tubo infundibuli  
formae, limbi laciniis subdivisis Mur. Com. v. 908. S. p. 44

~~Herberti~~  
*Cestrum diurnum* filamentis adentibus, laciniis corollae subro-  
tundis reflexis foliis lanceolatis L'Her. Suppl. nov. pag. 744

Habitat in Chili Havana

Rami teretes glabri. Folia petiolata alterna elliptica veno-  
sa glaberrima obtusa subtus pallidiora supra nitida basi tri-  
pollyana nitida basi acuta. pedunculi axillares brevissimi  
triflori subulsi corollae unguiculares laciniis corollae obtusi

subulsi pedunculo petiolo brevioribus

~~Cestrum diurnum~~

~~argentea Indigofera foliis simplicibus, ternatis peritropis, foliis obovatis  
fereis: impari minore.~~

Indigofera articulata Leguminibus pendulis articulatis, foliis  
simplicibus, ternatis, pennatisque imparis Gouan Fl. Ind. pag  
49.

Indigofera argentea foliis pennatis: foliis obovatis tomentosis  
fereis: impari minore Lin. mant. alt. pag 273?

Indigofera argentea Leguminibus <sup>sub</sup> sessilibus tomentosis, foliis  
ternis quinisque orbiculatis Burm. fl. Ind. pag 174.

Indigofera tinctoria Torr. descripsit. pag 130. no 20.

De synonymo Linnaei debito cum tandem modo folia pennata  
meminerit et Roanum citabit. De Gouani et Burmanni  
~~vero certis cum me fecit inspectio herbariorum illorum~~  
Plantam <sup>vero</sup> Torricellam eandem esse cum Gouani et Burmanni  
inspectio speciminum in herbario <sup>Gouani</sup> ~~Roani~~ asseratis persuasit

herbarium *Cestrum* floribus subpanicatis axillaribus; foliis subcordatis ovatis acutis,  
suttus ramulisque herbis. Schw. prodr. pag. 49  
Habitat in India occidentali, Jamaica. 5

Caurifolium Cestrum filamentis denticulatis nudisve, foliis ellipticis coriaceis nixi-  
tis sive, pedunculis petiolo brevioribus L. Herbar. 4. pag. 29. Tab. 34

Laureola sempervirens americana, latioribus foliis, floribus albis antibus odori  
Pluk. alm. pag. 209.

Laureola latifolia floribus albis antibus odoratis Pluk. phys. Tab. 95. fig. 1.

C. venenatum pedunculatis foliis lanceolatis obliquis floribus alabris  
pedunculatis foliis mell. Dict. 6.

~~C. venenatum Burm. prodr. 5~~

Habitat in America

Rami glabri cortice cinereo uatnati orodofi. folia ad apices ramorum  
et ramulorum conferta, nervosa vix venosa, obtusa, brevifera petiolo  
ter. bydollicana vel ultra glaberrima. flores in axillis foliorum  
et terminaliter brevifera pedunculati 1-2. triflori. Calyx campanulatus squidentatus  
corolla unguiculata laciniis allophi

Cestrum venenatum de Marti enyel.

Lyx Burm. Cestrum venenatum est distincta planta

fructuosa fructibus dracunculis, thymis denticulatis, foliis ellipticis, nervosis, trifloris Tab. 1.  
Cestrum venenatum Burm. prodr. 5

fastuosa Justicia fruticosa foliis ellipticis, thyrsis terminalibus, floribus secundis, Penantico  
externo ~~quodammodo~~ bifloro. Tab. I.

17. 11



Vesperbaum *Cestrum filamentosum* Dentatis; tubo filiformi; pedunculis bre-  
vissimis Hort. Kew. 1. p. 255

Lin. Mant. 206. f. v  
p. 227

*C. vespertinum* floribus subspicatis lateralibus foliis ellipticis  
filamentum aliud arboreum foliis Solani minus Plum. Cat. 17.  
Linn. 157. f. 1.

*C. axoni alternifolia* foliis alternis Gacy Amer. Tab. 177. f. 2.

*C. vespertinum* foliis subspicatis simplicibus; corolla tubo longiora  
filiformi; laciniis acuminatis Kunz. Com. Gott. 5. Tab. 10

Habitat in Antillis

Rami raris flexis ciliatis tuberculatis. folia petiolata  
peltata obtusa cuneolata elliptica ad apicem ramu-  
lorum congesta glabra juniora uti petioli <sup>et pedunculis</sup> villosi  
minutis adpressis integerrima. flores in apice ramulorum subs-  
pici. lacina corollae cuneolata acuta

Astragalus peregrinus

caule pens erectus

floribus <sup>melaleucis</sup> ~~melaleucis~~ <sup>longis</sup> ~~longis~~ <sup>pedunculis longis</sup> ~~pedunculis longis~~

radice foliorum leguminibus annuatis <sup>canariensis</sup> <sup>canariensis</sup> <sup>foliatis</sup>

quidam <sup>in herbario</sup> <sup>in herbario</sup> Tournefortii vidi cum sequenti nomine: Astragalus peregrinus filiquis conglobatis incurvis sulcatis et hirsutis flore luteo Tagon. <sup>prospit. in subso</sup>

+ Paulus erectus pilosissimus

emarginata, pubesca india.

Folia remota tripollicaria, pinnata foliolo 21-27. <sup>canariensis</sup> <sup>subrotun</sup>  
da subrotunda superiora oblonga, om.

Stipula ovata acuminata

Spica axillares, floribus inferioribus remotioribus; superioribus contiguis

Pedunculus longitudine foliorum.

Calyx cylindricus pilosus laciniis <sup>staccis</sup>

Bractea subulata calycis duplo breviores

Corolla octoleuca

obtusa

Legumina <sup>annuata</sup> <sup>incurva</sup> lanceolata, stylo rigido persistente rigido leguminibus

quaduplo brevior <sup>vermurata</sup>, angulis superior acutis inferioribus <sup>subtus</sup>

fulvis <sup>annuatis</sup> <sup>canariensis</sup> <sup>alba</sup> <sup>toment</sup> <sup>pilosa</sup> <sup>tomentosa</sup>

affinis Christiano legumina similia <sup>staccis</sup> <sup>pedunculo elongato inflexato</sup>

haec fessilis in axillis. a reliquis Astrag. caule erecto differt, leguminibus

annuatis tomentosis caule pilosis <sup>simis</sup>

7 habitat in oriente?

tomentosum Cestrum floribus confertis sessilibus terminalibus, ramis foliis calycibusque,  
tomentosis Lin. Suppl. p. 1507 S. V

Habitat in America meridionali

Habitus herbae et floris convenit cum reliquis speciebus. Figura foliorum florum  
que ut in C. diurno, sed calyces rami, foliorumque pagina inferior tomento-  
sa, calyces majores, corolla colorata: tubo breviori; limbo magis ampliato  
Lin. l. c.

oppositifolium foliis petiolatis oppositis

Habitat in C. b. spici 5 Thunberg

Rami cortice cinereo oppositi ramulosi ramuli articuli ad articulos delati  
fati compressi. Stipulae breviter late, acuta inter foliaceae  
Folii sesquipedalium glabra ovato-oblongo integerrima

an huius generis sub nomine Cestri absque floribus et fructu misit  
Thunb. - sed inter capensis <sup>in vrbis</sup> que non invenitur

Folia perennantia uni nervia lucida C. launfolia, Durmo  
retinata latibus, & sursum conniventia. C. auriculato, Parqui

Stipulati C. auriculatum, Parqui

Peduncululi subracemosi elongati C. noctur., auri: Parqui  
breviores, Durmo;  
nulli - seppentino

Stemata dentata C. Noct. launf. Parqui  
dentula Durm. sepp. auri.

biloba Veronica floribus solitariis pedunculatis, foliis ovatis acutis serratis glabris, laciniis calyci  
ae aequalibus fructu bipartito majoribus

fructu obovato compositis, fructis axillaribus; inter bracteis quaternatis  
~~fructibus ovatis~~ duobusque ovatis fructibus

fructibus quaternatis compositis

Bacca biloculari, intus exsiccata. Semina pauca, libera, truncata fl. Per.

2. pag 27

in bot. fl. Penn. omnibus staminibus edentulis proter undulatis