

# Chorophyllum

1. filloideum C. caule teri sulcato, geniculis tumidis <sup>in</sup> sulcis
2. bulbosum C. caule teri geniculis tumidis basi herbato
3. aristatum C. caule teri geniculis tumidis, seminibus hirsutis bianstatis
4. demulsum C. caule scabro geniculis tumidis
5. hispidum C. caule aequali, foliis incisus acutis fructibus bianstatis  
pedunculis lobatis
6. scabrum C. caule aequali, foliis incisus acutis hirsutis, pedunculis scabris
7. coloratum C. caule aequali, foliis supra decompositis, in voluellis coloratis
8. aureum C. caule aequali, foliis incisus, seminibus coloratis sulcatis  
muticis <sup>foliis bipinnatis ovatis</sup>
9. aromaticum C. caule aequali, foliis serratis, fructibus bianstatis
10. fraxinifolium C. fructibus <sup>opum</sup>

bulbosam & caule teri geniculis tumida, basi hirsuta Pers. Spec. pl. p. 370 v  
- Jacq. fl. austr. t. 63.

Cicutana bulbosa Bauh. pin. 161.

Myrrhis annua, semine striato teri, tuberosa nodosa concophyllon  
Plukh. alm. 249. t. 206. fig. 2.

Habitat in Germania Hungaria, Helvetia Norvegia &

Caules erectus tri vel quadripedalis erectus nullo  
maculatus folia quadri pinnata vaginis longis  
striatis glabri petioli pubes omnibus pubi albis rever  
si hirsuti. pinnis foliolorum superiorum sagittatis supra  
glabra subtus costa pilosa. involuella interdum dimi  
diata. semina cylindrica tera atque parum an  
guistiora.

pinnae parvae  
foliolorum infra  
nervis oblongis  
cristis



capense Charophyllum caule teri aequali, seminibus sulcatis, folioli trifidis  
glabris Thunb prod. pag. 51.  
Habitat in Cap. b. frei

nov. 1.

anfratum  $\odot$  caule teri geniculis terimido seminibus hirsutis bianfratis Thunb fl. jap. pag  
S.V. pag. 209.

Habitat in Japonia

Caulis erectus teris fructus glaber. Folia bipinnata villosa  
vaginis petiolorum ciliatis. Umbella ternatales composita  
intraque involucra subulata reflexa. styli divaricati semi  
na albo villosa Thunb.

non vidi



*temulum* ♂ caule scabro geniculi tumidas Lin. t. V. p.  
1. Tab. 65.

Fragm. fl. austr

*Cherophyllum sylvestre* Bauh. pin. 152.

*Myrrhis annua vulgaris*, caule fusco Mon. bot. 3. p. 302. f. 9. & 10  
fig. 7.

Habitat ad Europæ arvos, vias et sepes ♂

Caulis erectus debilis 1-3 pedalis teris striatus pili parvi  
adpressi. Folia duplicata pinnata foliolis oblongis  
in cæcis extremis confluentibus, subtus pallidiora pinnis  
pilosiora, pinnis partialibus ternis vel quaternis. Umbellæ  
umbellæ pedunculatæ, laterales et terminales.

hirsutum  $\odot$  caule aequali; foliis incisè acutis, fructibus bianctatis L. V. p. 2004  
man. 356. Gaogr. fl. austr. 2. t. 148.

*Seseli montanum*, cicutæ folio, subhirsutum Bauh. prodr. 85. p. 161  
*Myrrhæ brociferæ bergensis* Bauh. p. 160.

*Picubana palustris latifolia rubra* Bauh. p. 161.

*Picubana palustris latifolia alba* Bauh. p. 161.

*Picubana latifolia hirsuta* Bauh. hist. 3. p. 102

*Cerefolium latifolium hirsutum album et rubrum* Monj. hist. 3. p.  
304. f. 9. t. 10. f. 6.

Habitat in Alpibus Helvetiæ 4

Caulis peripedalis hirsutus fistulosus. Folia triplina  
topiinnata pennis ovato lanceolatis serratis incisè  
costa supra hirsuta, extrema confluentia. Folia pinnæ  
cinctæ 9. Umbella densa comæx ante anthesin  
nutans 4-nervosa cella pentaphylla longitudine umbellula  
fructus cylindricè leviter striati vagina lato bifida  
ore hirsutissimo margine — pedunculis lobatis



Rabrum & caule aequali, foliis indivisi acatis hirtis, pedunculis scabris Thunb. fl. jap.

Ray. H. V. p. 209

~~Sampna~~ ~~mentis~~ ~~Thunb.~~ ~~Am. ex.~~ s. p. 822

Habitat in Japonia

Caulis erectus pedalis subflexuosus angulatus inferne glaber  
superne hirsutus. Ramuli alteri <sup>longi</sup> fastigati, patuli folia  
bipinnata. Semina ovato-oblonga. Thunb.

ab hirsuto differt foliis minoribus magis divisi vaginis non  
delatis. umbellis minoribus

non vide

Coloratum



Aromaticum & caule aequali, folioli serrati integri, fructibus baccatis Lin. L. V. p.  
~~202~~ 208 Mart. 356. Jacq. fl. austr. 2. t. 64. 150 (pec. pl. pag. 3714

Myrtis minor Bauh. pin. 160

Myrtis perenni alba minor, foliis hirsutis, serratis

Angelica sylvestris hirsuta inodora Bauh. prod. 82. pin. 156.

Cerifolium, rugoso angelicae folio, aromaticum Boiss. mus. 2.  
p. 29 t. 19.

Habitat in Lusitania, Misina &

caulis 1-3 pedalis uti petioli hirsutus. Folia bipinnata  
Ogopodii Podagraria ad serraturas subaequali. Foliola  
altero latere breviora umbella plana non densa

ovatis oblongis

arborescens Chorophyllum fruticosum Lin. Spec. pag. 371. \* S. V. pag. 289

Piceana arbor Virginiana Raii Suppl. p. 257.

Arbor arbor Virginiana Pluk. mant. 49.

Habitat in Virginia.

Caules frutescens. Folia Chorophylli sylvestris, ampla, supra decomposita,  
pennis patentibus, ovatis, inaequaliter serratis. Umbellae tenues, albae; involu-  
cro partiali. Flores omnes fertiles. Lin. Spec. L. C.

non vidi



*Chorophyllum*

*Mynthis orientalis* cicutano folio Tournef. Bor.

Habitat in oriente herb. huf.

Caulis glaber. Folia bipinnata: pinna infimo inferiorem subquaque pino vel ternata  
pinna ovata oblonga, pollicaris, acuta, profunde serrata, profertim basi, serraturis  
serratis, subtus villosa, supra glabra ora, sesquialtera, acuta fere ~~exteriora~~ ad ap-  
icem vergenti basi brevioris. Petioli villosi. Involucella ovata lanceolata, attenua-  
ta, margine membranacea, glabra.

Cherophyllum

Habitat ad fretum magellanicum Commes. herb. mus.

habeo



*Cherophyllum*

*myrrhio orientale* anglicis foliis, tuberosa radice Tournef. Corr.

Habitat in Orientis herb. Græc.

Caulis sulcatus, angulatus, subdlopus, crassitie pennis columbina. Siliqua  
caulina longe petiolata, pennata, bipuya: foliola ternata; pennis subordata  
ovata teresa glabra, unica a lateralibus et terminali saepe biloba vel lobo toto di-  
stincto, venosa, pollicares vel minores, obtuse serrata, utraque glabra. suprema  
ternata, intermedia subpennata, lateralia ternata, pennis lanceolata, acuta serrata  
incisa, acuta. Umbella g radicata: involucrium parziale reflexum, margine membra-  
naceum in fetam acuminatum.

patens *Chorophyllum* Lamour.

Habitat herb. Guss.

Caulis glaber, striatus. Folia bipinnata: pinnae pinnatifidae. Laciniae lineari-  
lanceolatae, acutae ~~in~~ <sup>ae</sup> ~~angulatae~~ <sup>angulatae</sup>, integre bis trifido, Costa <sup>subtus</sup> ~~subtus~~ <sup>retius</sup> ~~retius~~ <sup>trichoma</sup> ~~trichoma~~ <sup>trichoma</sup>  
pila. Involucella, 5 phylla, reflexa, lanceolata, acuta, extus villosa. Co-  
rollula irregulari.



Depauperatum *Chenopodium*

Habitat ad fretum Magellanicum Commes. herb. Kusf.

Caulis erectus, striatus, superne villis raris adpressis. Folia petiolata, bipinnata:  
foliola bipinna; pinna subcordata, ovata, infero saepe ternata, acuta, venis sub  
tus pilosa 1-2 per quos pollicares, serrato incisa. Petioli longi uti vaginae subulose  
7 nervium univulvare et partiale monophyllum subulatum. Umbella univulvata  
3-4 radicata: partiale 4-5. Semina linearis, striata, raris pilosa.

aureum *Chorophyllum* caule aequali, folioli incis, seminibus coloratis sulcatis  
Mucos. Lin. S. V. p. 280 \* *Fraxinifl.* Austr. Vol. 1. t. 64.

*Myrtus altera* Kob.

*Myrtus minor* Baub. pin. 160

*Myrtus perennis alba minor*, foliis hispitis, semine strato aureo Monf. h  
B. p. 130. Rupp. Gen. 3. p. 282. t. 5: \*

*Myrtus radice lignosa perenni*, foliis hispitis, seminibus flavis obscure stratis  
Hall. Gott 104 \*

Habitat in Germania ?

Caulis angulatus, stratus maculatus, furtus, inferne hispitus, superne pubes  
folia pallida subtus hispita, supra glabra: folioli extremis confluentibus  
Flores albi, <sup>sub</sup>extus rubri. Fructus quasi formi-cylindrici. Semina sulcatis <sup>per</sup> or  
si, remotis, flava Lin. Mant. l. c.

Planta <sup>3-4</sup> pedalis. Solera supra decemposita super glabra  
folioli lanceolatis profunde serratis. Umbella latera  
les et terminales pedunculata multiflora involu  
cum nullum vel monophyllum involuella 5-6 phylla

Folia hispita: penna pennatifida lanceolata, unguicularis: inferiores  
et trifidum 3-4 serratis incis. Involuella oblonga in herbis herb  
his. in herbar. meo non existat



coloratum *Chorophyllum* Caule aequali, foliis supra decompositis, involucrellis colorat  
Len. Mart. 57. \* R. V. p. 200 Jacq. hort. 1. Pl.  
*Myrrhis perennis lutea daucoides* Monf. h. 3. p. 302. f. 9. t. 10. fig. 6.  
Habitat in Ilyria

Caulis teres, hirsutus, prope in inferne. Folium selini *Thyspini*, adpressa pilu  
rari. Umbella *Choroph. sylvestris*. Involucrella ovata, acuminata, lute  
venicolorata ut in *Bupleuris*, longitudine pedicellorum. Floresuli variis sterili  
bus *Fructus Chor. aurei*, sed venis striati, a quo differt omnino. Foliolis pil  
ulosis & c. vespis Len. Mart. l. c.

Caulis teres subtilissime striatus, punctis minutis coloratis, pilis paucis.  
Folia 4 pennata: penae lineares, unguiculatae, acuta, integerrima, usq  
in ea raro bi- & trifida, angusta, raris pilosa. Involucrella lanceolata  
attenuata herb. Juss.

michi ignota

Cicutaria P. folus bipinnate: foliolis cordato oblongis incisè petalis emar-  
gnatis, caule glabro Vill. Delph. 2. pag 641

Habitat in Delphinati  
varietas Ch. herpiti secundum Hall. et All.

non vid.



alpinum *C. Galii Impennati*: foliis angustis oppositis petalis planis  
integris, pistillis deciduis Vill. fl. Delph. p. 2. pag. 642.  
Habitat in Delphinatū  
an varietas *C. Sylvestri*

non vidi

Sylvestre Q caule lori striato, geniculi tumidi sculi Lin. spec. pl. p. 369 & Jacq. fl. austr.  
2. v. 149

*Pistana vulgaris* Rod. pempt. 701.

*Myrris sylvestris*, feminibus lobatis Bauh. pin. 160.

Habitat in Europa pomaniis cultis &

Caulis tripedalis et ultra. folia magna multiplicata  
pinnata, flaccida. Sapor ore abledo. Semina nigra  
nitida non striata