

Photochilus

36 Cal. subbilabia Cor. tubulosa: limbo 5-partito; laciniis linearibus, 2bus superioribus breviori-
bus, 3bus inferioribus
bus longioribus. Cap. ore ~~4~~ dentato, 2 loculari, polysperma.

Cateniflorus Chaetochilus

Habitat in Brasilia Thouin

Caulis fruticosus: Rami alterni, teretes, superne subvillosi. Folia petiolata
alterna, pollicaria, ovata, integerrima, inferiora obtusa, superiora acuta
sax subvenosa, glabra. Pedunculi interfoliacei vel oppositifolii, solitarii
uniflori, patentes, breves. Calyx tubulosus, subbilabatus marginulatus,
subbilabatus ^{trilobatus}, unguicularis, glaber, decem nervosus: labium superius bifidum
inferius trifidum: lacinis subulatis, aequalibus. Corolla sesqui polli-
cari, bilabata: tubus crassitie feli emporidici, undique eodem latitudine;

Labi limbus usque ad orificium tubi divi offinque ^{partitus} fides; lacinis linearibus,
angustissimis; ^{duobus} superioribus tribus inferioribus parum
longioribus. Filamenta duo infra medium tubi inserta, eique parum
brevisora. Germen superum. Styl. stigma obtusum. Capsula tubi
nata, acuminata, ora quodri dentata, bilocularis. Semina plura. Discus
pimentum oblongum, compressum. Corolla um
gem Corolla facile diagnosticatur lacinis quasi quinque summitate
reste

tubi quasi insertis et colore a Tubi diversis.

Cor. tubulosa. Limbo ^{superior} infido, lac