

Cheiranthus

off. omnes species hujus generis feminibus obaque margine membranaceo
ad 4. esper. amandanda, quamvis gaudet plerique tetragona ex mente Desf.
1. ensiformis C. foliis lanceolatis dentatis nudis, caule erecto simplicissimo
plerique tetragoni.

2. hel. veticus C. foliis ~~lanceolatis~~ linearibus integerrimis dentatisque nudis
frutis, caule erecto, plerique tetragona stylo acuminata

3. montanus C.

4. dentex C. foliis canescentibus radicalibus retrosum dentatis, caulinis
linearibus integerrimis.

5. pubescens C. caule foliisque lanceolatis integerrimisque pubescentibus,
pedicellis calycibus plerisque tomentosis.

6. sibiricus C. foliis linearibus canescentibus integerrimis, caule ramoso
paniculato.

7. lobelianus

8. alpinus C. foliis linearibus subtomentosis, radicalibus dentatis inte
gerrime, caulinis integerrimis, caule simplicissimo

9. cheiri C. foliis lanceolatis acutis glabris, ramis angulatis, caule fruti
coso.

10. salenus C. foliis lanceolatis obtusi integerrimis, caule erecto, antheris inclusis
11. mutabilis C. foliis lanceolatis attenuatis argute serratis, caule frutescente,
siliquis pedunculatis
12. venosifolius C. foliis filiformibus integerrimis subspericis, caule frutescente
ramoso.
13. strictus C. foliis linearibus acutis glabris, caule fruticoso erecto.
14. fruticulifer C. foliis lanceolatis acutis glabris subserratis, caule fruticoso.
15. callosus C. foliis lanceolatis integris callofis, caule angulato fruticoso.
16. dubius C. foliis linearibus integerrimis pilosis, caule villosis
17. cheur C. foliis oblongis obovatis ^{ve}que, petalis emarginatis siliquis apice
subulatis acutis.
18. maritimus C. foliis lanceolatis obtusi subdentatis scabris pilosis, siliquis
filiformibus obtusis caule diffusis
19. incanus C. foliis lanceolatis integerrimis obtusi incanis siliquis apice
truncatis compressis caule fruticoso.
20. serotinus C. foliis congestis caputatis recurvatis undatis, caule induratis
21. annuus C. foliis lanceolatis subdentatis obtusi incanis, siliquis cylindricis
undatis apice acutis, caule herbaceo

22. *littoreus* C. foliis lanceolatis subdentatis submentosis subcaeriosis, petalis
emarginatis, caule herbaceo
23. *alysoides* C. tomentosa nuda, foliis linearibus integerrimis, caule fruticoso
lofo. ^{fomentosi incani} petalis linearibus undatis
24. *tristis* C. foliis lanceolatis sinuatis, floribus ^{fomentosi incani} seplibus filiquis apice
sagittatis, caule fruticoso. petalis linearibus undatis
25. *integripolus* C. foliis linearibus ~~me tomento~~ incanis, filiquis ^{tricuspidata}
to hastatis, caule fruticoso
26. *vellofus* C. foliis velloso tomentosis, floribus seplibus, petalis linearibus
planis filiquis ^{tricuspidata} hastatis
27. *inlobus* C. foliis ^{dentatis} sinuatis obtusis, calycibus lobatis, filiquis nodosis
municatis ^{velloso} filiformibus lobatis glabris
28. *tricuspidatus* C. foliis sinuatis subpinnatifidis obtusis, petalis obcordatis
filiquis ^{velloso} pinnatis tricuspidatis
29. *sinuatus* C. foliis tomentosis inferioribus sinuatis obtusis superioribus
integerrimis filiquis municatis
30. *carpetia* C. filiquis ovalibus compressis, foliis linearibus, caule
fruticoso (prope montanum collocatur)
- Ch. *tristis* est *strepens* Lavandula foliis, oblieto flore Barba

semperflorens Cheiranthus foliis linear lanceolatis integerrimis

Habitat in Barbana

Cauli suffruticosus, erectus, strictus pedalis et ultra, vix ramosus, inferne
purpurascens canescens e villis minutis, superne scabrieusculus, angu-
latus. Folia rudimenta ramulorum ex omnibus axillis. Folia des-
silia linearia ^{longiuscula} saepe frequentia, bipollicaria, linear lanceolata, inte-
gerrima glabra, lora cirenia. Racemus terminalis. Flores distantes.
Calycis st glaber, juniores ante florescentiam apice purpurascens, foliola
subcarinata. Petala alba, integerrima, magnitudine Cheiranthi
loba lamina subrotundo-orata

alysoides Cheranthus tomentosus incanus, foliis linearibus integerrimis, cau-
le fruticoso.

Heppensicula frutescens, siliqua truncipede Tour. ref. f. R. H.

223.

Cucurbitum minus fruticosum, purpureum, montanum, conigerum

Boiss. maf. 2. 140. t. III.

Cucurbitum minus fruticosum purpureum alysi-folium Basel.

42: 804.

Habitat in Europa australi montibus

Caulis semipedalis, erectus, inferne ramosus. Rami conferti
cretes altitudine caulis, uti tota planta, tomentosi, nerei.

Folia sessilia, frequentia, unguiculata, obtusa, integerrima,
crassa, subtus convexa, supra canaliculata

Petala purpurea, submarginata, obtuse denticulata

(Sub nomine Ch. lictorei a Joviano alii epi, ^{plantis} diversa mihi videri
tur, caule fruticoso neri annuo, toto ~~nereo~~ ^{nereo} tomentoso neri
~~subtomentoso~~, foliis foliis integerrimis neri subdentatis
semum quod tota planta nereo tomentosa sit neri subtomentosa
Nec cum isto sejura Cher. lictorei Clusii plane diversa

14 grandiflora v. ^{u. r.} pedunculis subunifloris, foliis ovatis ovalibus, vexillis gla-
bris

Habitat in cultis Neapoli florēt mes autis mensi Aprilis

Caulis spithamei striati glabri. folia sex juga foliola infera

apice vix emarginatis
micronata, pilis virido armato subpelosa nervosa. Circum-
ra alterna superiora opposita lata, ovata, polliciana
pinataque pedunculis axillari solitarii brevissimi uni-

(montanae)

flori vel biflori. Calyx nervosus pilis raris ad presens
stipula inferioris dentato-incisa superioris integris.

Floris lutei vexillum ovatum latitudine pollicis.

an varietas lutei ^{concolor} germina vix pubescenti nec hirsutum breva

vicia floribus pallide luteis amplissimis Neapolitana

Roj. Syll. Herp. ext. Bot. pag. 261

vid. adves: et Roj. historia plant.

Cheiranthus odoratissimus foliis lyrato-sinuatis tomentosis, siliquis longe pennis an-
tibus, stigmatibus bilobis terminatis, caule suffruticoso Marsch. in Schrad. Journ.
f. 2. b. 1. 6. pag. 462.

Cheiranthus odoratissimus Pall. Tabl. de Taur.

Habitat in collibus nudis prope veterem Schemathiam t. 3

Cheiranthus cuspidatus foliis lanceolatis dentatis, caule erecto simplici, siliquis
obtusis late angustibus, stylo persistente duplo longioribus Marsch. in Schrad. Jour
f. d. b. i. b. pag 462.

Turnitia montana siliquis latis Buxb. cent. 2. pag. 23. Tab. 33. fig. 1.

Habitat in collibus graminosis ad sylvanum margines Caucasi inque Tauri
♂

Cheiranthus

Leucopium minus angustifolium luteum hispanicum Barrel. ~~100~~. 412 no
43 fig. 1000

Habitat in Lusitania

Caulis erectus, simpliciter, pedales, teretes, laxes, oculo armato pilis adpressis.
Folia sessilia 3-4 pollicaria, linearia, angustissima, plerumque integerrima,
raro denticulo uno alterove remoto, oculo armato pilis adpressis: rudimenta
ramulorum in axillis. Flores sulphurei. Calyces puberulescentes. Siliqua
tetragona, incurva, rostro subulato terminata.

Cheiranthus

Hesperis orientalis maxima leucouifolia in caeno, floribus variis Tournef. Cor
pag.

Habitat in Oriente herb. Desfont. et Tournef.

Suffruticosus, basi ramiflorus: rami robusti crassitie pennae confertis, squamis ora
tis acutis vel acuminatis a basi foliorum persisstante imbricati. Folia in apicem
nervorum, aggregata, lineari cuneata, integerrima, obtusa, incana. Pedunc
uli in pedunculo digitali dispersi, incano. Flores breviter pedicellati
Petala cuneata.

habes inter *Hesperis* no 6

Tomentopus Cheimathus

Habitat in Syria Bellardiere herb. Desfont. 5

Rami teretes, ^{rigidi} a tomento stellato incani, uti tota planta, crassitie penna cygnis.
Folia sessilia, ^{oblonga} semipollicaria, inferora obtusa, superiorem acuta, re mota dentata,
crassa, avenia, enervia. Racemus terminalis: pedicelli brevissimi. Calyces
ovati, subrotati, canescentes. Siliqua 5-6 pollicares, compressiufilagineo
to patentes, ad femina torulosa, incana, obtusa

Chelidonium

Leucogon orientale Elichrysi folio Tournef. Cor.

Habitat in oriente herb. Mus.

Caulis erectus, sesqui-pedalis, sulcatus, angulatus, superne triquetus, scaber, ramosus, virens: rami simpliciter. Folia lineari-lanceolata, sessilia, integerrima: radicalia perithamnia, angusta, caulina triplex Clusiana, frequentia, sesqui-munera, ovulo armato pilosa. Racemi terminaliter ramorum; flores flavi.

tenuefolius *Cheranthus*

Hesperis hesperica lutea angustifolia

Habitat in Hispania herb. Mus.

Caules plures simplicis et pedales

herb. no 7

~~herb. no 8 in Herb.~~

alysoid. Cheiranthus

Leucogon minus lusitanicum purpureum alysoides Tournef. Gasp. v. h.

Barrel. icon. 504

Habitat in Lusitania Lab. mus.

Caules plures; erecti simpliciter, palmares et ultra unum

habeo no 2.

habes *Cheranthus*

Leucopum orientale luteum foliis dentatis, siliquis planis Tournef. Cor.

Habitat in oriente herb. mus.

Caulis erectus, sesquipedalis, pilicatus, an quae latus, superne ramis ^{trique} ter, si abes
pulis parvis retroflexis adpressis, superior ramis ^{ter} simplicibus. Siliqua bipylli-
cana, sessilis, oblonga, dentato-sinuata, obtusa, subavenia, si abes et pilis ^{ter} stel-
latis, oculo armato videntis, fusis semper minoribus, oblongo lanceolatis.
Racemi terminalis, pedalis et ultra. Flores sulphurei. Siliqua adpressa, bre-
vifloro, pedicellata, pollicari, compressa, cineriscenti, si abes, stylo
fili formi, seminibus quatuor terminatis.

parviflorus Cheiranthus

Aspeni orientalis maritima leucopifolia incano, flore minimo Tournef. Cor.

Habitat in oriente herb. Turf. 4

Caulis plures, erecti, spithamei, simplices, uti tota planta, glabri. Folia radicalia
copiosa, linearis cuneata, integerrima, angustulana. Calyx ut in Cheir. trite.
Corolla lamina subcuneata. Siliquis pollicares, teretes, mucrone brevi termi-
nata.

Acheianthus

humilis

Respenis orientalis maxima leucocis folio incano, flore minimo Tournef. Cor.

Habitat in oriente herb. Mus.

Caulis palmatis vel pithamoris, erectus, ramosus: rami simpliciter. Sola linearia
obtusis, integerrima vel dente uno alterose

an a perisflor in herb. Fissici Daresa

habes n^o 4

Cheeranthus

Leucogon *cuticum* *groecum* *saxatile* *humile* *Tournef.* *Cor.*

Habitat in Oriente herb. Mus.

Caules fruticosi; ramosi: rami angulati, canescentes. Sola petiolata, semipol-
liciana, lanceolata, acuta, scabru² fi²cula, integerrima, sculo armato villis adpres-

si
an varietas *Cheni*?

Saxatilis *Cheeranthus*

Lycopus luteum gracium *saxatile* *humilius* Tournef. Cor. 16

Habitat herb. Fus.

Caules, ut videtur, decumbentes, fruticulosi, teretes: rami subanescentes, scabini
sculi. Folia petiolata, pollucana, stultu, remota, patentia, otulo armato pi
lis adpressi. Siliqua tripolliaces, tetragona, inlano, acuminè semiunguiculari
terminato.

an specimen cultum?

varius Cheiranthus

Hesperis peregrina foliis dentatis floribus variis Tournef. Inst. v. h.

Habitat herb. mus. Pont. Euxinum herb. Tournef

Caules ^{plures} lignosi; inferne e caespitibus foliorum squamosi, pedales; inferne ramosi: rami pin-
plices, teretes, glabri. Folia 2-3 pollicina, linearia, superiora minora et angustio-
ra, inferiora in petiolum attenuata, scabripula, integerrima, raris dente uas
siliquis erectis, tetragonis, conciscentis

habes

Q

Hesperis lusitana fruticosa purpurea alyssifolia

Leucogon minus lusitanicum purpureum alyssifolium Tournef
f. v. h. *Marval. t. 204. confer 407. Boiss. muf*
2. p. 140. tab. 11.

Habitat in Hispania dicitur
folia obovata, emarginata

lyratus Cheliranthus foliis lanceolatis dentata subpinnatifidis ^{sub} pilosis, sili-
culis pediculis incanis.

Hesperis lyrata, foliis oblongis lyrato-pinnatifidis sublaevibus, sili-
culis erectis sub hispidis acutis La Mart. Enchel. 3. p. 325

Habitat in Sibiria ? v. c. O

Caulis palmari vel panicum ultra, villosus. Folia petiolata, bi-
polluciana, pilis raris simis trifurcatis adspersa. Siliqua flores-
purpurei. Siliqua bipolluciana, spatulata, acuta, villosa.

an pinnatifidus Willden.

~~Carya hesperis~~

~~Habitat herb. La Martini~~

~~Tota glabra. Caulis ramosus, herbaceus, erectus, altus, 4 ses, lani. Folia petiolata,
policiana, oblonga, utraque acuta, remote dentata, nervosa, arena. Sili-
qua 4 in pollicaria, tertia, brevissime pedunculata. Flores parvi purpurei~~

pulchellus Cheiranthus

Cheiranthus orientalis foliis cucuraceis dentatis flore lutes magno Tour
nef. Bor.

Habitat in oriente herb Besfont. et Musci

Planta caespitosa, digitalis et ultra. Caulis plures, basi stolonis exse-
rentes; foliis minoribus. Folia dentata: caulena oblonga

variat foliis angustioribus utraque acutis, dentibus utraque distan-
tibus tribulatis

pulchellus Willd

taraxaci foliis. ^{subpeltatis} Cheiranthus foliis pubescentibus inferioribus uncinato-pinnatis
fidis, superioribus oblongis remote dentatis

Cheiranthus un Chin? Pall. t. 1. app. n. 116.

Hesperis tarax. foliis ovatis acutis dentato-angulatis lobatis, can-
te lano, petalis integerrimis. Lamark encycl. 3. p. 325.

Cheiranthus taraxi foliis, foliis pubescentibus, inferioribus unci-
nato-pinnatifidis, superioribus anguste dentata Wild. Spic. 3. p. 1. p.

525.

Habitat in Sibiriâ ad Solga ripas inundatas. V. C. ^{in p. p. & n. l. pubescentibus}

Culta tota glabra, ^{caulis} ~~caulis ramis~~, 2 tripedalis, 3 pro terea digitalis, biped-
alis pubescens ^{caulis} real. Caulis herbaceus erectus, teres. folia ^{longiora} inferior-

uncinato-pinnatifida; laciniis cuspidatis, terminali major, obtu-
sa, in culta petiolata, utrinque acuta, nervosa, averna. Flores

parvi purpurei. Siliquis tripolluicibus, brevissimis pedicellatis,

teretibus

parviflorum *Onchidocarpum* foliis lanceolato uncinatis basi acutis foliis
obovatis acutis

Annona parviflora

Habitat in America boreali: herb. Desfont. &

rami teretes, glabri. ^{apice ferrugineo, tomentoso} folia brevissime petiolata, ³quadripollicaria, ^{tomentosa} subcuneata
^{obovata} oblonga, ^{pinna}acuminata, obtusa, integerrima, glabra, subtus pallidiora, ^{costa et} ^{foliis} ^{ferrugineis} ^{tomentosa}
venis ferruginea. Flores laterales, breviter pedunculati, parvi, ^{extus tomentosi}
fructus gemini, ^{vel plures} magnitudine nucis coruli, oblongi, ^{vel obovati} mucrone terminati, vel
lis breviter flavescens, subtomentosi.

alpinus Ch. foliis linearibus integris subtomentosis, caule ramoso Lin. Manx
p. 94. N. 597. Gaeg. fl. austr. t. 8. 75

Leucogonum angustifolium alpinum, flore sulphureo.

Leucogonum angustifolium alpinum, flore sulphureo All.
prosp. pedan. 44. t. 9. fig. 3.

Habitat in alpinis montibus Italia, Gallia meridionali & ^P

Radia superne dispersa in plurimos basi vixi nudamenti copiosi
foliorum proteri anni apice foliiferi et cauliferi. Caulis plures
digitales vel palmares erecti simplicissimi. Colia sessilia cano
na extrosum parum latiora, frequentia sequi pollicaria

Thlaspi eredi integerrima. ter pilis minutis adpressis vixi caniscentia.
Cum montanum flores ratione planta magna flava sulphurea, lami Caly
luteum Morel. et flaviscenti canis. Lamina obovata filiqua angusta cano
variat caule digitali et pedali folia interdum elliptica lanceolata
90. 214. fig. 4 in solo gemmari All.
herb. mus.

β. foliis petiolatis lanceolato ellipticis dentatis caule
albo

foliis linearibus subtomentosis radicalibus dentatis integris
caulis integerrimis caule simpliciter vixi

Caulis crassus, penna anserina, canescens. Folia angustis-lan-
ceolata, utraque attenuata, integerrima, 3-4 pollicaria, ovato
armata-silloba. Calyx canescens. Siliqua tetragona. in culta
caules ascendentes, angulati, semipedales. Folia angustis, penna.

perispermoides
hemoides C.

Folius lanceolatis dentatis nudis, caule erecto simplicissimo,
mo, siliquis tetragonis fl. Suec. 6034 fl. Dan. 8. 229. fl. austr.
1. t. 74.

Lycium sylvestre Clus. hist. 1. p. 299. Bauh. hist. 2. p. 873.

Lycium luteum sylvestre angustifolium Bauh. pin. 262.

~~*Lycium angustifolium alpinum, flore sulphureo Allyn p. 102*~~
~~mont. 44. t. 9. fig. 3.~~

Habitat in Hungaria, Gallia &c.

Caulis erectus fructus sesquipedalis simplicissimus superne ramulos
vel altero florifer. e lineis decurrentibus angulatus pilis raris
appressis oculis armato videndis. Folia subsessilia basi attenuata
remote pauci dentata frequentia erecto-patenta, aerea oculis
armato pilis bellatis minutissimis adspersa tactu non levia. Racemi
terminales fructus. pedunculi breves, siliquis angustis erecto-
patentes ad eandem pilis minutis adpressis.

Koepfer

Rh. foliis laniceolatis integerrimis, caule glabro
aphyllo: stemulis simplicibus Willden. fl. Berol.

no 663

non

~~Stemulis simplicibus
Stemulis simplicibus~~

~~Chamaecrista foliis lanceolatis serratis & fl. fol. 4. p. 92.~~
multifida

numidus
acaulis

Dianthus foliis linearibus, ac aulis foliis linearibus
Dianthus uniflorus capis brevissimis, unifloris; foliis linearibus Tor
Ph. Cat. Syst. Pl. Arab. pag CXI. n. 2 & 4. acuta, glabra

Planta copiosa

Folia linearia ~~congesta~~ congesta ad terram, linearia semipollicina
Capis nullis, flores fessiles solitarii nati.
Palyca ~~gamet~~ ⁶ ~~oblongis~~ ^{oblongis} acuminati, flore breviori
bus exteriore minoribus.
Lamina petalorum dentata

helveticus C foliis lanceolatis dentatis nudis, caule erecto, filiquis
tetragonis, stylo acuminatis / V. p. 597. ~~Georg. Schrad. 89.~~
H. auct. 9.

~~Habitat:~~

Cucopum minus angustifolium Luteum Boer. mus. p. 140. V. III.

Hesperis foliis linearibus lanceolatis obtuse dentatis, filiquis erectis
tetragonis Hall. hist. n. 450.

Cheiranthus Beldone All. fl. ped. n. 900. tab. 50. fig. 2.

Habitat in Helvetia austria, Pedemontii et inque Hispania &

Bohemia Radix superne durifera. Caules plures erecti striati e linearibus decur-

rentibus angulatis pedales et ultra, ^{unicum} pedales et simpliciores mi-

nales ab helvet. interdum ^{unicum} ramosum vidi a pili adpressis vixi canescentes

Co non differt. folia ad radicem aggregata frequentia in caule plerum-

que secund. ^{retolata} fere cum fasciculis foliorum in axillis. linearia radicalia
et plerumque linearia lanceolata remote dentata

qui communicant caulina linearia integerrima raro uno alterove dente
Lesquillo caris oculis armato pili adpressis plerumque
simplicibus raro bifurcatis. Haec enim Veronialis inter
dum longitudine fere ipsius plantae flores copiosi sulphu-

rei filiqua verticillata canescente brevis pedicellata
stylo tubulato filiqua binatis brevior apice obtuso subtili

Plantae in Barbantia Creta foliis parum latioribus ^{quam hispanica} caulibus dentate serratis
uno altero ve
confertur ad hunc usque. fl. cum forte diversa.

montanum ^{Gher}
~~Engl.~~ foliis linear-lanceolatis integerrimis, pleguis inia
nis stylatis

Cheiranthus montanus Pall. *ib.* f. app. pag. 44

Habitat in Libani

Caulis herbacei, pedalis tamopi flexuoso decumben
tes. Folia radicalia longissima, linear-lanceola
ta in petiolum attenuata canescentia caulium
paucis. Calycis foliola duo basi in vesiculam quasi
producta. Siliqua lanceolata depressa tetragona
vix pollicariis patentes stylo longitudinis siliquae
terminato.

canus

^{Somentosa}
Ch foliis linearibus integris ~~somentosi~~ filiquis brevibus
subtetraedris ~~somentosi~~ caule que siabris Pell. et
Mittlerp. J. p. 146
Habitat

canus

~~Chamaecrista frutescens (L.) Greene
Habitat in praeiis
Flora. J. p. 92.
Habitat in praeiis
Flora. J. p. 92.
Habitat in praeiis
Flora. J. p. 92.~~

glabrata *Phlomis involvens* petalis brevis feni subpungentibus, calycibus
calycibus octodentatis foliis ovatis serratis.

habitat in Arabia: inter plantas Torftralei in seni absque ullo no
mine.

Caulis herbaceus erectus ^{patentior} tetragonus unguis acutis glaber
folia ovata, petiolata, serrata, serraturis obtusiusculis, basi integra
nina, acuta glabra, pollicaria.

Petiolus folio ^{sub} brevior.

Stemae verticilli remoti 6-8 flori.

Involucra brevia quadripartita, petalis, subpungentia, ca
lyce triplobreviora glabra

Calyx fere Phl. *teylanica* decem fissatus, glaber, tubulosus, octodenta
tus dentibus subulatis inaequalibus majori inferior calycis in labium
pro tridentatum productum apertum obliqua

Corolla calyce duplo longior et aequum ut in congeneribus

foliis ovatis serratis, involvens petalis brevissimis, calycis ^{bus} labio inferiore
producto tridentato, ^{rimis} caule ~~reverso~~ ^{pubescente}

quadrangulus Chenanthus foliis linearibus integris, siliquis sessilibus
oblongis quadrangulatis L. Her. fr. 9 tab. 44. p. 91 *

Habitat in desertis Libani &

Folia glabra

Spicae terminales longissimas

Caules erectus

Siliqua tetragona

Astragalus hispidus caulis scapis erectis foliis longioribus leguminibus floribus
capitatis leguminibus globosis hispidissimis.

Astragalus orientalis Candicissimus et tomentosus Tournef. Coroll.
Habitat in oriente descripta secundum specimen in herbario Tournefortii

Racem superae ramosa crassa pro magnitudine planta, lignosis

Folia plurima proveho magnitudinis polliciana et minorum pennata. foliolis 9
oppositis sessilibus, oblongis ^{obtusis} villosis inaevis exterioribus minoribus.

~~Stipulae~~ ~~bractea~~ ~~bractea~~ ~~membranae~~ ~~con~~ ~~sub~~ ~~lobata~~ ~~bifida~~ ~~laciniis~~ ~~lanceolato~~ ~~acu~~
minatis inter illas petiolus teres canus

Scapus erectus bipollicaris pilosus, p

Flores in capitula subglobosa.

Bractea pilosissima lineares longitudine calycis

Legumen subglobosum ^{oblongum} pilis longis albis densissimis tectum.

Tasgetia \odot siliquis ovalibus compressis, foliis lineari-lanceolatis,
Caule fruticoso erecto Len. Mart. 94. l. v. p. 593.
Lunaria fruticoso perennis incana, Cuvieri folio Tournef.

ibid. l. p. 92. t. 92.
Thlaspi fruticosum ramosum, Cuvieri acuti folio argenteo
um Pleben. alm. 365.
Tasgetia aegyptiaca Turra Tasgetia ven. 1765 quad. p. 1. t. 1.

Habitat in Aegypto, Arabia, Barbana &

^{radicibus} ^{ut} Indivulus ⁱⁿ Anethus, tota planta e pilis compressis canus, ramosis ⁱⁿ simplicibus.
Rami ^{sel pubescentes} sparsi & recti. Folia sessilia linearia integerrima sparsa, polli-
cana vel minor. Racemos terminalis pauciflorus. Calycis foecula
linearia. Siliquis unguiculatis fere alij clypeati stylo mucro
nata. Petala linearia rotundata, purpuriscenti alba obsolete fatis-
catis reticulata. flos fere Cheiranthi fructus variis ramis teneris
nibus et siliquis angustioribus.

Caspetia Cheiranthus siliquis ovalibus compressis, foliis linearibus lanceolatis, caule fruticoso
se erecto.

Linaria scabra; tomentosa scabra, siliquis oblongis; foliis linearibus Boiss
desf. pag. 117.

B. Cheiranthus linearis; foliis linearibus, tomentosis; caule ramoso diffusis.

Boiss. desf. pag. 120.

Habitat etiam in Regno Tunetano.

(Varietas differt tantummodo, foliis et siliquis angustioribus.)

Libinicus C. foliis lineariis canescentibus, ^{integerrimis} caule ramoso paniculato
Habitat in Libina D

Caules sesquipedalis erectus ramosi summi vagatus, subia
nesciens tres folia bis Tripollicana angusta canu uti
calycis et filiqua. Rademi ex apice ramulorum. Petala
fulphurea filiqua filiformi et stylo brevi glabro stigmate
obtusissimo.

millefolia L. foliis bipinnatis, pinnulis ovatis serratis L. V. p. 602.

Laegu. coll. 1. p. 41.

Habitat.

pubescentibus. C. Caula foliis que lanceolatis integerrimis dentatisque pubescentibus
pedicellis calycibus siliquisque tomentosis.

Habitat in Libria

Folia nervosa basi utrinque attenuata denticulo uno alterove
vel integerrima ^{glabra} trinervia. Calyci. Corolla sulphurea. Siliqua
^{non nolleis caps.} lineares. Stigmata seseli pilosa. Petala obovata.

Dentex C. foliis incanis radicalibus retrosum dentatis caulibus integerrimis

Habitat in Sibiria C

Caulis palmatis simplicissimus, erectus canescens. Folia radicalia basi attenuata pollicaria inaequaliter ^{profunde} remote dentata dentibus basi spectantibus. caulina sessilia

Lobelianus Q.

callofus Q. foliis lanceolatis integris callofis, caule angulato fu
Vicofo Len. Suppl. p. 296. L.V. p. 597.
Habitat ad Q. b. frei 5

non vidi

fruticuloso P foliis lanceolatis acutis glabris subserratis, caule fruticoso
Lin. Mant. 94. t. V. p. 597

Leucopem luteum minus fruticosum Barret. c. 122 P.

Habitat in Hispania

Smillemus Cheumat. Cheui sed palmani. Rami angulati. Folia suppeto
loba, acuminata ~~longifolia~~ ~~divisifolia~~, serratis in senoniam
nervis argutis. Flores octis minus lutei, minus fragrantis. Petala
subrotunda emarginata. anthera subconspicente hinc

cheum Q foliis lanceolatis acuti glabris, ramis angulatis, caule
fruticoso lin. 1. V
Leucogonum luteum Dod. pempt. 160.

Leucogonum luteum vulgare! Bauh. pin. 202.

B Leucogonum luteum magno flore Bauh. pin. 202.

V Leucogonum luteum serrato folio, flore grandiori Bauh. prod.
102. pin. 202.

A Leucogonum luteum pleno flore magno Bauh. pin. 202.

E Leucogonum pleno flore minus Bauh. pin. 202.

Habitat in Anglia, Helvetia, Gallia, Hispania muni testi
p. 45.

Rami a lineis decurrentibus angulati vixi carepentes. Folia basi alte-
ruata bipolliciana et ultra integerrima mucronato integerrima
na vel denticulo uno alterove vixi. Racemi fructum
elongati, pediculi lutei & ea siliqua pollicares compresso tetra-
gono iniano stylo brevi bilobis terminata

Solanum Q. foliis lanceolatis obtusis integerrimis, caule erecto, antheris
inclivis lin. Mart. 93. x 1. ✓
Habitat ad Sibina, Tatanò Salinae 5

Somellensis Q. incano, sed octavi minor, foliis brevissimis tomento
fuit. Caules erecti, per aliquot annos durant. Folia mini
me dentata. Corolla purpureo fauce flavescente. Stigma
obtusum, crispipulum, bifidum minimeque tenue. Olor
Q. incani lin

an mea lin: cum flores lutei folia petiolata utraque attenua
ta pilis raris adpressis congesta, selegia incano linea
res pollicaris

mea vix lin. et forte ^{diffinitivulus} ~~habebant~~ altero. vero ex hoto usq. quatu

mutabilis C foliis lanceolatis acuminatis argute serratis, caule fra-
scendente, siliquis pedunculatis Hort. kew. 2. p. 395.

Habitat in Madagascari

Rami ramulosi et pilis adpressis parvis canescentibus angulatis. Folia frequen-
tia, angusta utraque attenuata, utraque oculo armato pilis stellatis
superne serratis remotis versus basin integerrima subtus et pilis copio-
sioribus albidioribus. Racemi terminales elongati. ^{demum} Flores protha-
maei. Petala purpurea. Calycis duo foliola basi ^{subtis} ~~speciosa~~. Siliqua
erecta angusta apex cano apice stylo brevi stigmatibus subbilobis
terminata.

Venuifolius C. foliis filiformibus integerrimis subsericis; caule su-
tescente ramoso Hort. kew. 2. p. 395.
Habitat in Madera 5

non vidi

carnosus Ph. foliis linearibus carnosis glabris, caule fruticoso
Habitat in Cap. b. ppei Thunberg

Stictus \odot foliis linearibus acutis glabris, caule fruticoso erecto Lea
Suppl. p. 296. B. p. 597.

Habitat ad C. V. p. 5

Stictus semipedalis parte ramosa, totus glaber. Folia sparsa, sessile
subtus convexiuscula supra canaliculata sesquipolliana. Racemi ter-
minales pauciflori Calycis purpurascens.

Quomodo differt a *Clasme capensis*

Dubius R. ? ^{integerrimus} foliis linearibus pilosis caule velloso.

Habitat in Siberia ☉

Planta palmansis superne ramosa. Folia basi attenuata
bisquipollicaria. Petala obovata emarginata alba

ut hujus generis

Tubulatus

④

Scousbe e Marzio

chius C. foliis obovatis arenis emarginatis, siliquis apice subulatis

Lin. V

Leucopium Thlaspeos facie Harm. par. 192. V. 193.

Hesperis siliquis hispulis, flore parvo rubello Dill. elth. 180
t. 148 fig. 170.

Habitat in Chio C

Caulis in culta ramosi diffusi laxis pedales rari pilosi.

Folia petiolata oblonga ^{in aetate} ~~in aetate~~ canescentia et pilis stellatis
obtusa integerrima vel deinde uno alterove oppreso polli-
cana. Petala purpurea emarginata fauce flavescenti
albo stnis aliquot siliquaribus siliquis bipollicares
subulato attenuatis canescenti

— foliis oblongis obovatisve, petalis emarginatis siliquis
apice subulatis acutis

Hesperis frutescens Desfont

mantimum & foliis ellipticis obtusis nervis scabrisiculis, caule diffusis
bn. An. Mant. 56 p. 4. Am. ac. ad. 4. p. 200 x

Leucopium minus, flore violaceo Barrel. c. 1127.

Leucopium mantimum parvum, foliis viriscentibus crassius
cule Bauh. hist. 2. p. 377. Planch. v. 432. 49. 2.

Habitata in Europa australi mantimum. O

Caulis palmari vel parum ultra purpurascens, ^{velata} ramis
ramosis rami ^{caule lignosus} crassi ramosi, diffusi tenues flexuosi.

Leucopium ceteri
cum minimum
foliis subrotundis
Bauh. pin. 104 p.
herb. Musj

Folia lanceolata sessile, basi acuta obtusa, unguiculata
subinversis et pili minuto stellati integerrima vel
denticulo uno alterove obsuro. racemi laterales cum
ramo ultimus excrescente oppositi foliis vel terminales
fructiferi longitudine totius plantae. filiquis filiformibus
sesquipedalibus teretibus viridibus stylo brevi ac obtuse termina
to. Flores purpurei minuti

foliis lanceolatis obtusis subdentatis scabrisiculis, filiquis
filiformibus obtusis caule diffuso.

incanus C foliis lanceolatis integerrimis obtusis incanis, filiquis
apice truncatis compressis, caule suffruticoso. Lin. l. V. p.
Viola alba et purpurea Lobel. ii. 229.
Leucopium incano folio, hortenje Bauh. pin. 200 n. 1. 2. 4. 5. 6. 7
Habitat in Hispania maritima. }
Caulis erectus ramis raris canescentibus teretibus. folia petiolata squam
pellucida. Racemi terminales. Flores magni purpurei

Centroseles C foliis conferto capitatis recurvatis undatis, caule jaderiso.
Lin. Dec. 31. t. 16. p. 1. V. Sp. pl. p. 924 & Jacq. hort. 2. p. 179.

Habitat

♂

Radix lebrofa. Caulis semipedalis, crassitie digiti, erectus nudus. Folia
in apice caulis, conferto in capitulum more brassicae, oblonga recur-
vata sessilia, obtusa, undata, incana. Racemi longiori, fructu, erecti
aliquoties caulis pedunculi et pedicelli leviter tomentosi incana
na unda flori et fructu. Chervanthi incana. Foliis tomentosis
incanis hinc

annuus C foliis lanceolatis subdentatis obtusis incanis; filiquis cylindri-
cis apice acuti, caule herbaceo. Lin. f. V
Leucopium incanum minus Bauh. pin. 200
Habitat in Europa australi maritimis

resideratur in herbano

Littoreus & foliis lanceolatis subdentatis subtomentosis subcarneis, petalis
emarginatis, siliquis tomentosis Lin. Spec. pl. p. 925.

Leucopium maritimum menu. Clus. bot. 1. p. 298.

Leucopium maritimum angustifolium Bauh. pin. 201.

Habitat in mari mediterranei Littoreus & ~~†~~

~~alysifolius~~ Caulis pedalis inferne ramosus ramis confertis teretibus uti tota plan
tu tomentoso nuda. ^{impunctat} folia sessilia alterna frequentia obtusa

lineana subtus convexa supra canaliculata obtusa unguis
lani per plerumque integerrima vel rarius ~~dentata uno vel altero~~
~~obtusis obtusis~~. Petala numero subemarginata obscure margine
denticulata.

~~tomentosum lineana foliis
lineanibus subdentatis integerrimisve tomentosae caule
suffruticosae~~

~~Leucopium menui frutescens purpureae alysi foliis Borel.
15-804. omnino ^{ad meam} hinc proles an species diversa a Leucoi
siliquis truncatis siliqua dum Tournefort velle~~

Caules pedales, alternè ramofus incanus. Folia alterna canaliculata, carno-
sa, canaliculata, obtusa, obtuse dentata incana. Petala obcordata
purpurascencia basi albida. Siliqua subulata, angusta aequalis folio
non lignosa tomentosa her-
bæ annuus. Caulis plures erecti, pedales uti tota planta caiani
Folia semipollucina, plerumque integerrima, inferon interdum
subincisa, basi in petiolum attenuata remote dentata, interdum
linearia, breviora, angustissima. Caulis ad usum semper lignosus. Sil-
iqua subulata herb. 4usq.

int. in foliis
angustifloris

Ch. foliis linearibus incanis inferius subdentatis reliquis
integerrimis petalis linearibus plerumque sessilibus 3 dentatis
caule fruticoso
legi in Hispania et Babona
an modo vaneas Ch. ceranth. Vestis folia autem fere
omnia angustissima integerrima minime punctata et plerumque
apice non retrosum hamata

funicatus

Pl. foliis linear-lanceolatis laevis, plicis
fimbriatis, caule herbaceo.
Habitat in Tugda Schousboe

Junctus C foliis tomentosis ^{int} obtusis subfinuatis: ramis integris,
seque mucronatis. Her. Spec. pl. p. 9264

Leucogonum maritimum, finuato folio Bauh. pin. 200

Leucogonum maritimum majorem latifolium Bauh. hist. 2. p. 075.

Habitat in Hispania, ^{Italia} Montibus maritimis B

Radix descendens superne e foliis protuberanti anni circadnatus. Caules
plures simplices pedales superne interdum ramo uno vel altero,
ubi tota ~~plata~~ tomento incana. ^{frequentia} Colia ~~radicalia~~ lanceolata

radicalia et inferna caulis ^{seu} dentibus utrinque remotissimis
2. vel tribus elongatis obtusis ^{est longius majoribus} finuata superiora et ramica indurata

integerrima rudimenta ramulorum ex axillis. Racemi termi-
nales et ex apicibus ramorum lateralem multiflori. Calyces

tomento denso cum intertente purpureo vel flavo. Petala ^{interdum angustior interdum per magnitud. R. Luciani} ~~purpurea~~ ^{laminis obovatis} emarginata. ^{pedicelli breves} seque ^{quadriflori} ~~quadriflori~~
tomentosa subarticulata, erecto-patente, tuberculis minutis
sparsi raris emarginata apice ^{trifurcata} ~~trifurcata~~

Tricuspdatum C. foliis lyratis, siliquis apice tridentatis Linn. S. V. pag
Leucopium marinum Cam. hort. P. 7. t. 24. Monf. hist. 2. p.
242. f. 3. t. O. fig. 13.

Habitat in Babano montanis O

Caulis ramosi pubes velloso pubescentior, caeteris rami
diffusi. Folia lanceolata basi attenuata, obtusa, vellosa
bi pollicaria dentibus utrinque 2-3. obtusis longis fere
remotis sinuata. Racemi laterales oppositi terminales
cum ramo ulterius excrepente tandem laterales
oppositi folii petala purpurea emarginata. Flores brevis
fere pedunculati siliqua bipollicaris vellosissima tricu-
spidata: cuspides laterales patentibus

velloso

foliis sinuato subpinnatifidis obtusis, petalis obcordatis
siliquis tricuspdati

Leucopium montanum Conigerum. Coronopifolium Bion. mus. 2
pag 147 tab. III t

Folia angustissima. Siliqua porrecta herb. Gur.

vesta

Inlobus? \odot foliis dentatis obtusi, calycibus lobis, siliquis nodosis mucrona-
tis siliiformibus lobis. Lex. ~~Sp.~~ Spec: pl. p. 9257

Leucopum mantinum minimum. Bauh. prodr. p. 103. pin. 201.

Habitat in Hispania et prope insulas Boeckadum \odot

Caulis ramosi patuli, pithamoi incani. Folia lanceolata,
obtusa, unico vel duobus utraque dentibus profundioribus. Caly-
ces non pilosi. Corolla purpurea magnifera. Siliqua lineari,
teretiuscula, suturis canalicatis, latibus rotundis nodosa, apice
longo subulato acuminato glabra

4
Hesperis sylvestris linearifolia Bauh. pin. 103

600
100

Habitat in Gallo provincia

colica linearis remote subdentata floribus purpureis