

# Chelidonium

1. majus  $\text{Ch.}$  pedunculis umbellatis, foliis pennatis
2. japonicum  $\text{Ch.}$  pedunculis unifloris, foliis petiolatis pennatis ovatis
3. glaucum  $\text{Ch.}$  pedunculis unifloris, foliis amplectentibus auribus sinuatis
4. corniculatum  $\text{Ch.}$  pedunculis unifloris, foliis sessilibus pennatifidis, caule  
herpido.
5. hybridum  $\text{Ch.}$  pedunculis unifloris, foliis pennatifidis lacinantibus, caule  
tortu, plicis trivalvibus

*Chelidonium*

*Glaucom orientale* flore magno rubro Tournef. Cor.  
Wheeler

Habitat in oriente herb. Musc.  
Equales teretes, sulcatae, incisi.

Folia radicalia pennatifida, spithamea et ultra, petiolata, villosa, alia lacini-  
lanceolata subalterna, infimo alterna, integerrima, unguiculares; extior-  
sum semper majores subincise dentate, ultima dentato-angulata, alia  
lobi subovatis, oppositi, dentatis, mucronatis, latiora. caulinea semi-  
amplexicaulia, pinna lanceolata, remote et inaequaliter pauciden-  
tata, subincise. Pedunculi oppositi, unguiculares. Capsula semipeda-  
ler, pilosa, teretes, bivalves  
cum varietas corniculata?

1 majus & pedunculis um bellatis Lin. V. Fl. Dan 542.

*Chelidonium majus* Duchf. hist. Pl. 5

*Chelidonium vul majus vulgare* Bauh. pin. 144

17 foliis ~~maius~~ <sup>maius</sup> ~~maius~~ Fl. Dan tab. 676 foliis quernis Bauh. pin. 144. Flor.

Dan tab. 676.

*Chelidonium majus*, foliis laciniato Pluf. hist. 2. p. 203.

Habitat in Europa indicatis <sup>in montibus circa Bethun hist. d'Anar</sup>

Caulis bis tripedalis angulatus glaber. Folia pennata

cum in part. tripeza. Folioli oblongis oppositis sesquipedali

caesi <sup>veroniale & majus, par intimum caule approximatum</sup>

~~veroniale & majus, par intimum caule approximatum~~  
~~veroniale & majus, par intimum caule approximatum~~  
in sequens petiolatum 3 tum sespale omni

crenato incisae <sup>inferiore</sup> trifido sub lobatum interna  
basi latero <sup>inferiore</sup> basi sub pinnatisefida, ala membra  
nassa se in axillis ad foliola. Pedunculi axillares

Pedicelli 4. 5. in apice pollicares

foliis pennatis

Othonna de Dioscoride chiamata Salconi *Chelidonia indica*  
na Zaroni 154

violaceum

Chelidonium pedunculi uniglori, foliis bipinnatifidis linearibus  
caule villoso subtomentoso  
misit Dr. Thunberg.  
similis hybrida foliis angustis forte nil nisi sonetis.

2 japonicum Chel. pedunculis unifloris, foliis petiolatis <sup>pinnatis</sup> ovatis Thunb. fl. jap. pag  
I. V. pag 409

Habitat in Japonia

Caules herbaceus striatus glaber, debilis erectus. Folia pinnata  
cum impari. Foliola terma vel quina, opposita brevissime  
petiolata, ovato-oblonga, acuta, incisa, inaequaliter serrata  
serraturis acutis ciliatis, glabra subtus pallidas, pollicari  
terminali major. Pedunculi capillares longitudine  
fere foliorum. Calyx glaber. Corolla lutea. Thunb.

Glaucum & pedunculis uniflori, foliis amplexicaulis sinuatis. Caule glabro  
 Lin. Sp. p. 714 ff. Linn. V. 505.

Papaver corniculatum flavo flore Clus. herb. 2. p. 91.

Papaver corniculatum luteum Bauh. pin. 171.

Habitat in Dania, Helvetia Europa australi, Barbano aenopi.

Caule erigitur ter striatus ramosus folia radicata

caulina amplexicaulia, alterna, glauco virena  
 dentata sinuata dentibus mucronatis arenae basi dilatata  
 vae pilosa. Pedunculi axillares capsula pubescentes  
 Calyx fcti nonnullis adpressus

4 corniculatum C pedunculis unifloris, foliis sessilibus pinnatifidis caule hispido  
An. P. V.

Papaver cornutum phoeniceo flore Clusius. 2. p. 91.

Papaver corniculatum phoeniceum hirsutum Bauh. pin. 171.

β. Papaver corniculatum phoeniceum glabrum Bauh. pin. 171.

Habitat in Hungaria, Bohemia, Mompelii C palmaria

Caules erecti semipedales pilosus. Folia radicalia petiolo  
sa caulina sessilia, pinnatifida laciniis oppositis alternis

lineamentis dentatis pili parvis utraque adpersa

Calycis hirsutissimi. Corolla purpurea Calyx villosus

β. differe videtur foliis dentato vix pinnatifida  
pilosana caule glabro. folia ciliata, capsula bivalvis  
villosa. Calyx villosus

montana β culta

5 hybridum C pedunculis unifloris, foliis pennatifidis linearibus, caule teri, foli  
qui trivalvatis Lin. f. V

Papaver corniculatum violaceo flore Clus. hist. 2. p. 92.

Papaver corniculatum violaceum Bank. pin. 172.

Habitat in Europa australiore O

Caulis erectus <sup>peridys</sup> hirsutus basi ramosus, semipedalis. Folium petiolata  
inferiora bipennatifida, superiora pennatifida. Lacinia  
linearis integra vel incisè obtusiuscula ad costam subbifida

Pedunculi a basi elongati. Capsula stygosa  
V. 80. Dodecandrum differt lacinia foliorum latioribus  
villosis crassioribus varietas forte loci

β foliis angustioribus