

9

Chionanthus . Cal. 4-partita. Cor. 4-fida : laciniis linearibus, longis. Drupa
putamine ~~nuda~~ striato, 1-sperma.

24
Chionanthus . Cal. 4-partita. Cor. 4-fida : laciniis linearibus,
longis. Drupa putamine osseo striato, mono sperma

virginica 1. Chionanthus racemis terminalibus pedicellis trifloris, floribus pedicellatis, petalis linearibus lanceolatis.

Chionanthus virginica, pedunculis trifidis trifloris. Lin. Syst. Veg. 57.

latifolia α . foliis ovato ellipticis. Hort. Kew. 1 p. 14

Amelanchier virginiana, laurocerasifolia. Petiv. Sic. 241. Cat. b.

Carol. 1. p. 68. t. 68

angustifolia β . foliis lanceolatis. Hort. Kew. 1 p. 14

Habitat in America septentrionali, opposita

ramuli apice villosi. folia petiolata, basi acuta. α foliis ovato
ovalia sub pedicellis inferioribus. Petala latiora quam in reliquis
speciebus

~~Chrysophylla Olea foliis angusto - lanceolatis utraque acutis subtus
aureo nitidi paniculis lateralibus La Martia - V. Enc. pag 29
Habitat in Insula Madagascaria
Onupa globosa magnitudine rufi~~

2
compacta ~~Chionanthus~~ racemis compositis decompositisque; pedicellis trifloris flori-
bus ~~ternis~~ sespilibus; petalis attenuato-subulatis.
Sideroxylon caribaeum mucronatis foliis, Cyberis, Amer. 371.
Sideroxylon americanum p. lignum duritie ferrum emulans Plukon
Plukh. Almag. 346. t. 224. f. 2. fide herb. Vaill.

Chionanthus caribaeus; foliis utrinque longe acuminatis, calycibus cilia-
tis Jacqu. coll. 2. 110. t. 6. f. 1. La Mark. illustr.

Chionanthus caribaeus compacto; paniculis trichotomis, ultimis floribus sub
capitati calycibus villosis, foliis lanceolato-oblongis, antheris aciu-
minatis Sw. ^{art. 2} prod. 13.

Chionanthus Schreb. gener. pl. ed. Schreb. no 37

Chionanthus caribaea Sw. ^{art. 2} fl. Ind. Occid. 1. 22.

Habitat in insulis Caribaeis

Rami teretes, glabri. Folia petiolata, lanceolato-elliptica, saepe
palmata, avenia, acuminata, integerrima, glabra, nervosa, sub
coriacea. Pedunculi plerumque gemini, compositi vel decompositi.
Pedicelli u. partiales racemosi, ^{ompositi} ultimi terni, triflori. Flores sespiles
Petala angustissima. Calycis uti pedunculi tenuissima villosi sub
caescentes.

Rami teretes superne compressi angulati. Folia petiolata, opposita, glabra
intercostata. Racemi praesens uel rarius compositi, axillares et terminali

Bracteo subulato
parvo.

canescens Cordia

Habitat Lima Dombey herb. Thauri

Facies Cord. Dentata. Rami flexuosi incani. Folia petiolata, alberrima, pollicaria, ovato
subrotunda, dentato-subrepanda, venia, enervia, supra scaberrima, subtus villosa.
Pedunculi superne, alterni, incani, ~~per~~que flori, patentesissimi. Flores ses-ples. Calycis
5nati

Or Vandra monogyna secundum Dombey qui Peruvianam luteam nominavit

eadem ut lutea

⁵ ~~7~~
incrassata? Chionanthus? panicula rami decussatis fastigiatisve, floribus pedi-
cellatis, corollis tetragonis laciniis incrassatis, foliis oblongis. +

Chionanthus incrassata, paniculi rami decussatis fastigiatisve,
ultimis trifloris, corollis tetragonis, laciniis erectis incrassatis, foliis
oblongis consistentibus. Sw. prodr. 13. Pl. Ind. Occid. p. 4.

Habitat in Jamaica & sylvis montium altissimorum Jamaica & ^{terminata}
Arbor ex celsa. Rami erecti. Folia acumine brevi obtuso, subto-
riacea, nervosa, avenia. Panicula erecta, patula: pedunculi oppo-
siti, fastigati, subdivisi, ultimis trifloris. Corolla alba: Tubus bre-
vis binus, tetragonus: Caliculus laciniis, seratis, sublobatis. Fila-
menta nulla. Swartz. l. c.

tetrandra 4. Chionanthus paniculis tritotomis axillaribus; floribus pedicellatis te-
trandis; petalis ovatis attenuato subulatis

Maygea guianensis Aubl. Guian. Pl. t. 31.

Habitat in Guiana

Folia opposita, lanceolata elliptica, acuta, glabra. Pedunculi bis-
trifidi, Flores discreti, calyx villosus, ovatus. Antherae inter dum flores
racemosi; pedunculis oppositis, trifloris. Flores discreti. Calyx
villosus: laciniis ovatis. Anthera obtusa. Petala ovata, in
acumine longo desinentia.

Habitus. Rami teretes, superne compresso-angulati. Folia petiolo
paucis, opposita, glabra integerrima. Racemi magis vel minus compo-
siti, axillares et terminales.

Chionanthus ghanensis godr. Definit. 170
fructus novimus, nec ad huc clarum nun ad speciem divergiam
pertinet, vel ad cognitam.

Chionanthus

Cal. quadridentata. Corolla tetrapetala, petalis antheris connectentibus ^{petala} longe exsertis
filis 1-2 locularis: loculi monopermi

1. virginica. C. racemis terminalibus pedunculis trifloris, floribus pedicellatis, petalis linearibus
2. zeylanica C. racemis lateralibus axillaribus terminalibus, pedunculis trifloris, floribus sessilibus, petalis linearibus
3. compacta C. paniculis lateralibus terminalibusque, pedicellis trifloris floribus sessilibus, petalis attenuato-subulatis
4. ~~incrasata~~ ^{tetragona} C. paniculis trichotomis axillaribus, floribus pedicellatis, petalis attenuato-subulatis, ^{tetrandris}
5. ~~incrasata~~ C. paniculis ramis delusatis fastigiatisve, ultimis trifloris, corollis tetragonis, laciniis exsertis inaequalibus, foliis oblongis confertibus

~~Chionanthus~~ ~~incrasata~~ ~~Dominicensis~~ le Manth. Desfont
rami ~~teretes~~, glab. folia ~~petiolata~~, oblonga utrinque acuta, supra rubra
pedunculi 3 chotomi