

Chrysanthemum

Leucanthema

1. pennatifidum C. fruticosum, foliis glabris basi attenuatis pennatis fidis laciniis in-
s.
2. frutescens C. fruticosum, foliis carnosis linearibus pennatis dentatis apice trifidis
3. balearicum C. foliis ovato-lanceolatis serrulatis auriculatis
4. serotinum C. foliis lanceolatis superne serratis utrinque acuminatis
5. graminifolium C. foliis linearibus subintegerrimis
6. atratum C. foliis imis cuneiformibus lanceolatis dentato serratis superioribus lineari-
bus
7. leucanthemum C. foliis amplexicaulis oblongis: superne serratis inferne dentatis
8. montanum C. foliis radicalibus spatulatis: caulinis cuneiformibus apice dentato-
incisis, caule subunifloro
9. canescens C. foliis incanis imis subpalmatis: superioribus linearibus integerrimis
10. alpinum C. foliis cuneiformibus apice laciniato subpalmatis caulibus unifloris
11. monspeliense C. foliis pennatis pennatifidis planis linearibus, pedunculis unifloris

- 12. andersonum C. foliis bipinnatis filiformibus, caule ramofo diffusis
- 13. achillea C. foliis bipinnatis: pennis imbricatis, caule fructu multifloro
- 14. Aledum C. foliis bipinnatis serratis, florum radius longitudine disci; caule procurrente
- 15. ^{de} corymbosum C. foliis radicalibus bipinnatis: caulinis pennatis incisio-serratis

xx Chrysanthema

- 16. flospulosum C. foliis serrato-dentatis inferioribus obovatis: pedunculorum lineariibus
- 17. japonicum C. foliis petiolatis apice incisio-dentatis
- 18. indicum C. foliis simplicibus ovatis sinuatis angulatis serratis acutis
- 19. segetum C. foliis amplexicaulis: superne laciniatis inferne dentato-serratis
- 20. myconis C. foliis linguatis obtusis serratis, calycinis squamis aequalibus
- 21. coronarium C. foliis pennatis incisio-extrosus lobatis
- 22. arcticum C. foliis simplicibus cuneiformibus subpalmatis multifidis obtusis
- 23. peitinatum C. foliis pennatis lineariibus parallelis acutis integerrimis, caule subunifloro
- 24. mellefoliatum C. foliis bipinnatis, caule decumbente, corolla radius discum squante
- 25. pauciflorum C. foliis omnibus bipinnatis tomentosis, pennis integris, corymbis paucifloris
- 26. auricum C. foliis ^{tomentosis} radicalibus bipinnatis, caulinis pennatis, pennis subintegris obtusis
- 27. bipinnatum C. foliis bipinnatis serratis villosis, radius disci brevioribus

pro altun *Chrysanthemum Ventanat*

Caulis erectus simplex, purpurascens, teres, laxis, globus uti tota
 planta. Folia petiolata distantia bipollicaria, pennata pinnis
 3-4 petiolo: pinnis opposita vel alternis, ovata subpeltata est
 & imo decurrentes, ^{vel semipollicares} ovata, inciso pinnatifida laciniis lineari
 lanceolata integerrima vel extorsum dente unico serrata vel
 dente uno alterove profunda serrata asanas. Peduncululi super
 ne alterni pauci uniflori ~~floris~~ in ^{medio} folio minuto. Calycis
 foliola lineari carinata ^{opis paucis stricosa}. Corolla

muta Chamomilla *Chrysanthemum*
 inter Fidele, ut nota plantae globis, erectis. Folia pedicellata, 6-8-nervi
 ovatis oblongis nervosa. Flosa Germanici et Burgundi caeli, brevis pedic
 calicis *Chrysanthemum* *Burgundici* *Chrysanthemum* *muta Chamomilla*
 * *Chrysanthemum* *Burgundici* *Chrysanthemum* *muta Chamomilla*

Verbena folia lanceolata *Verbena*
 ovatis oblongis burgundis, caulis tenuis, spec. Pl. 27. Jacq. obs. 4. p. 2.
 t. 26.
 Habitat in regione
 Italia

Pono Veronica racemo terminali, pauciflora, calycibus glabris, foliis cordato-ovatis sessilibus
obtusis ^{demis} grosse serratis cauleque pilosis.

Veronica fruticosa terminali, foliis cordato-ovatis, sessilibus, summis alternis, gowan
Glean Bot. pag. 1. tab. 1. fig. 1. Glean Intro. in Coyot. Arroy. pag. 157. n. 5.

Veronica petraea sempervirens Pono Bald. 336. Tournef 144. Segu. pl. Ver. t. pag
235. Pluk. tab. 233. fig. 3.

Veronica petraea sempervirens Pono, ad Chamodrym vulgarem falsam addenda
Bauh. h. 3p. 209.

Veronica non ramosa Pyrenaea Pluk. tab. 233. fig. 2.

Habitat in monte Baldo et Pyrenaeis 2 exely

Caule simpliciformi pubescenti palmari vel ultra. Folia polluciana
inferiora minora obtusissima apice integerima veli rariore
adpressi. bractea linearis longitudine pedicellorum calycis ^{cinerea} ~~quinta~~
pedi ^{cinerea} ~~infima~~ ^{cinerea} ~~oblonga~~ ^{cinerea} ~~ser~~
flos et stater magnitudine Chamodry

~~Un Calycis quinquefolio~~

prope Chamodrym conolliobus

Synonyma. Pluk. minus idonei conveniunt cum specimen ab ipso Gowan communicata et illi a me
in Pyrenaeis lectis, sed a ipso et ob nom. Pluk. in positum ab ipso non potius Paderdam ob reliqua syn. Pluk.

^{Chrysanthemum} ^{sub}
Barbeleni Anthemis foliis Yeretibus inferioribus pennatis, supremis indivisis in
teretibus, caule unifloro simplicis semi

Chrysanthemum pallidus minimis imis quo foliis incis, superioribus integris
et capellambus Barb. Fr. 421. obs. 1093

Habitat in Lusitania

Caules plures, erecti, semi pedales vel parum ultra, Yeretis subvillosi.
Folia radiata plura, caulina
parva, filiformia, extorsum laciniis utrinque pennatis,
laciniis subaequalis, acuta, subullosa, ~~in~~ pedunculis apice
canescent. Calyx ante imbricatus squamis lanceolato-marginis
nigro interiori apice planis. Corolla magnitudine Anthemidis
cotula radii basi flava subtridentati. Petales nullo membran
brevis denticata Corona coronans odor fere chamomilla

glaberrimus subullosus

subullosus foliis Anthemidis radiatis
Flor. nov. p. 62.

subullosus foliis Anthemidis radiatis
Flor. nov. p. 62.

curda frus corollis barbatis, caule foliis albore multifloro, petalis ex tenori
 bus revolutis; interioribus exserto ~~reflexis~~ ⁱⁿ subundulatis submarginatis

Hort. Kew. 1. p. 68 &

Habitat in Europa australi

an. varietas & lamberti

Petala extenora rediffusa, alba purpurea infra medietatem flavicantibus ornata: barba tuberosa. Petala interiora oblonga, extenoribus paulo breviora; laminae purpureae usque squaledo lutescente. Stigmata squaleda lutescentia superne pallide purpurea Hort. Kew

~~Stigmata~~
~~interiora~~
~~exteriora~~
~~alba~~
~~purpurea~~
~~submarginatis~~
~~subundulatis~~
~~in~~
~~reflexis~~
~~interioribus~~
~~exserto~~
~~barbatis~~
~~corollis~~
~~frus~~
~~curda~~

~~Stigmata~~
~~interiora~~
~~exteriora~~
~~alba~~
~~purpurea~~
~~submarginatis~~
~~subundulatis~~
~~in~~
~~reflexis~~
~~interioribus~~
~~exserto~~
~~barbatis~~
~~corollis~~
~~frus~~
~~curda~~

Prus ~~337~~

~~Rubellum~~

~~retrocurvum~~

~~Repubertum~~

~~retrocurvum~~

~~Repubertum~~

~~retrocurvum~~

~~Repubertum~~

~~retrocurvum~~

~~Repubertum~~

~~retrocurvum~~

~~Repubertum~~

~~retrocurvum~~

~~Repubertum~~

~~retrocurvum~~

~~Repubertum~~

~~retrocurvum~~

~~Repubertum~~

~~retrocurvum~~

~~Repubertum~~

~~retrocurvum~~

~~Repubertum~~

~~retrocurvum~~

~~Repubertum~~

~~retrocurvum~~

~~Repubertum~~

~~retrocurvum~~

~~Repubertum~~

~~retrocurvum~~

~~Repubertum~~

~~retrocurvum~~

~~Repubertum~~

~~retrocurvum~~

~~Repubertum~~

~~retrocurvum~~

~~Repubertum~~

~~retrocurvum~~

~~Repubertum~~

~~retrocurvum~~

~~Repubertum~~

~~retrocurvum~~

~~Repubertum~~

~~retrocurvum~~

~~Repubertum~~

346

345

344

343

342

341

340

339

338

332

Fuscatum Chrysanthemum

Chrysanthemum fuscatum foliis bipinnatis: foliolis linearibus subulatis; ramis unifloris;
squamis calycinis magis apiceque fisanosis Desfont. fl. Atlant. 2. p. 203. tab.

237.

Habitatum apud Tuncti. herb. Desfont

Caulis ascendens, ramosus, teres, striatus. Folia bipinnata linearia integerrima
acuta: Pedunculus elongatus, tomentosus, superne incurvus. Calycis squamis magis
fisanosis nigris.

maximum Chrysanthemum

Habitat in Pyrenaeis herb. Desfont

Caulis herbaeus, erectus, simplex, sesquipedalis, glaber. Folia sessilia, tri vel quatuor
ria, lanceolata, infima in petiolum attenuata, glabra, lora, remota serrula
ta. Pedunculus elongatus, uniflorus maximus hujus generis

Chrysanthemum

Chrysanthemum pallidius minimis utriusque foliis incisivi, superioribus integris
& capillariibus Barrel. 10: 421.

Habitat. herb. musci

Caulis suffruticosus, glaber, ramosus. Folia petiolata, pennato-pectinata, lineana,
crassiuscula, semipollicaria: laciniis linearibus, acutiuscula, semunquialares, plu-
rimaque integerrimis, raro dente unico. Pedunculatus terminalis, uniflorus. Corolla
flava. Calycis foliola oblonga, pallida, margine fanofo, obtusa.

Chrysanthemum leptanum agerati folio. Plukn: 84. 1.

Habitat in Leptanum

herbario

Chrysanthemum

Leucanthemum Lusitanicum argenteo laciniato folio Tournef. Inst. v herb
pag.

Habitat in Lusitania herb. Mus

Caulis basi ramosus, erectus, pedalis, pedunculo terminatus, subtomentosus.
Folia lineata, inciso subpinnatifida, apice dentata fissis, semipollucaria
tomentoso-subsericeo. Flo. terminalis solitaria

Chrysanthemum

^{Chrysanthemi}
Leucanthemum orientale folio Tanacet. odore Turon. Turon. Cor. pag.
Habitat in oriente herb. Musf.

Caulis pedalis, angulatus, erectus; glaber, superne ramosus: folia bipollicina
na, pinnata: pinnae decurrentes, extremo confluentes, lanceolatae, serrato-
incisa, glabra. Pedunculi superne et ex apice ramorum, uniflori.
Squamae margine sic anosa, margine nigrae.

an hujus varietas

Huphthalmum orientale Tanacet. folio flore magno suaveolente
Turon. Turon. Cor.

Similis est, diversam pedunculi 1-2. ex supremis axillis et terminales
semipedales. Flores maximus purpureus

Coronopifolium Villars.

abundum Rarmond

Caulis proplex erectus semipedalis subternatis glaber. Folia sessilia, sesqui-pollicia
na, lanceolata, basi attenuata, serrato-ciliata, glabra, venis basi subparatis fi
da. Pedunculus elongatus, uniflorus. Calyx glaber, margine fuscis herb. de part.

Herbario de la Pen
Goussier
Casan - fe. var. 3. pag. 41. fe. 201.
Pseudogonolobus

pinnatifidum Chrys: Suidicofum, foliis lato lanceolatis pinnatifidis pennis serrato
incisis

Chrysanthemum pinnatifidum Suidicofum, foliis simplicibus oblongis pinnati-
fidis: pennis serratis Lin. Suppl. 3. 77. x. l. p. 773.

Habitat in Madera rupibus altissimis prope torrentibus &

Tota glabra, ramis intricatis. Folia basi attenuata ^{approximate} semiamplexicaulia
inferiora latiora, superiora basi angustiora utrinque attenuata serrata
serrata. Peduncululi ex apice saepe gemini tripartiti Pedicellis
unifloris basi foliolo lanceolato. Calycino squama ovato margine serru-
gineo arido. Receptaculum concium

Chrysanthemum pinnatif: Suidicofum foliis glabris basi attenuatis pinnatifidis
laciniis incisis Hort. Kew. 3. p. 231.

2 frutescens *Chrysanthemum fruticosum*, foliis carnosissimis lineariibus pennatis dentatis apice triplicibus
Gled. s. v. p. 774.

Chamomelum canariense *ceratophyllum fruticosum* Monf. h. 3. p. 35.

Mellis canariensis frutescens; foliis crassis Pyrethri sapore Raii suppl. 221.

Bupththalmum canariense *Leucanthemum*, cotula foliosa crassifolia
Pluk. alm. 73. t. 272. fig. 6.

Leucanthemum canariense, sapore pyrethri. Walt. bot. 31. t. 24.

Habitat in Insulis Canariis

Frutex humilis glaber. Ramis angulatis & linea a basi folii decurrente. Pedunculi elongati terminaliter ramulorum solitarii uniflori. Squama calycina ovata lato margine sup. & inf. ciliato

3 Balsamita Chryf. foliis ovato lanceolatis serratis auriculatis L. S. VI. pag. 772. * Jacq. obs. 4. pag. 104. ^{Presl. P. t. 29.}

Leucanthemum orientale, ~~est~~ hordenis folio Tournef. Corol. 37.

Bellidiordei balsamita majoris folio foliè et odora Vahl art. 550.

Habitat in Colente 4

Similis Tanacetis balsamita. Caulis erectus prostratus angulatus canescens. Folia elliptica
obtusà basi in petiolum attenuata, subtomentosa, canescentia pollicaria basi
utrinque auriculo ~~la~~ linear-lanceolata. Peduncululi ex apice ramorum bini
f. terni ^{super auripetio} foliolis petalis, uniflori. Calyx achillea squamis subaequalibus

4 *Geranium Chrysanthemum* foliis lanceolatis superne serratis utrinque acuminatis L.S.V. 772. Gaye
Obf. fol. 4. p. 9. t. 90
Bellis major, radice repente, foliis latioribus serratis Monf. h. 3. p. 29. f. 6. T. 9. f. 11 Raii h.

351.
Bellis americana frutescens ramosa Raii h. 1865.

Aster, foliis profunde dentatis et quasi laciniatis; ramosis Raii suppl. 162.

Bellis americana procerior fruticosa ramosa, flore amplissimo Pluk. alm. 65. t. 17.

fig. 2.
Habitat in America septentrionali &

Caulis erectus, sulcato angulatus, superne vix villosus, tripedalis. Folia sessilia,
utrinque glabra, subtus pallidiora, minutis pinnis punctata, longiora pollicaria. Pedun-
culi sessis apicem, erecti simpliciter foliis uniflori. Squama lanceolata
marginibus fusco siccatis.

5 Gramineifolium Chryf. foliis linearibus subintegerrimis L. S. V. p. 772.

Leucanthemum gramineo folio Tournesf. P. II. 493.

Bellis montana gramineo folio Magn. Monsp. 291. * Hort. 31. 7. 31.

Habitat montana 4

Caulis ultra pedalis simplicissimus erectus, glabriusculus. Folia remota linearia ~~in inferioribus pro~~ in petiolum longum attenuata, suprema sessilia. Dentibus ^{aliquot} angustis margini cartilagineo praecipue ad basin. Pedunculus elongatus caulem terminat, uniflorus. Squama calycina ovato-lanceolata margini fanofo albida absque nigredine.

Aliam dedit Gouan caule foliisque inferioribus pilosis. Folia superioribus cuneiformibus apice tridentatis

6 atratum ~~Alpinum~~ Chryf. foliis unci formi lanceolatis dentato serratis supremis linearibus ~~3~~

~~caule~~ caule bifido ante basi piloso.
~~Crocathemum alpinum tenuifolium~~ ~~Chryf. t. p. 335. Borel. et~~

- + Bellis alpina major, foliis rigidis Bauh. prodr. 120. P.n. 261.
- + Bellis alpina major foliis angustis rigidis Bauh. Pin. h. 3. p. 115
- + Bellis montana major, foliis acuto Bauh. Prodr. 121. P.n. 261. Marrel 4c.
- + Bellis alpina minor, foliis non rigidis Bauh. h. 3. p. 115.

+ Chrysanthemum atratum foliis omnibus unci formibus oblongis serratis ^{inifis}
Carnosi Lin. s. V. p. 712. alpinis montanum huius pedunculata videtur.

A habitat in Alpibus Helvetis austriacis 4

Raulis herbaceus semipedalis, simplicis spinosus basi ^{apice lobato} hirsutus. Folia radicalis petio ^{uma}
lata, petiolo villosa, exstrosam dentato serrata ^{apice lobato} sesqui polliciana, arenaria
caulicaria linearia inferiora serrata, superiora integerrima. Pedunculus
elongatus caerule longior unius floris. Squamis Calycini margini atris

3 Caulis sesqui pedalis. Folia sessilia, 3-4 polliciana, basi attenuata, lanceola
ta, globosa, nervosa, arenaria, obtusa, superiora acuta, exstrosam obsolete serrata.
Flos terminalis magnus herb. mus.

7 *Leucanthemum* Cray: folis amplexicaulis oblongis: superne serratis; inferne dentatis Lin. S.

v. pag.

Oculus bovis Bruijell.

Bellis major Tuttl. h. 140. Cam. epul.

Bellis sylvestris, caule folioso, majori Bauh. Pin. 261.

β. *Bellis montana*, foliis obtusis crenatis Bauh. Pin. 261. prodrom. 121. Barr. Fi. 458.

fig. 2. Gerard. Prov. 206.

γ. *Leucanthemum vulgare*, caule villis canescente Tour. F. R. 4. 492.

Habitat in pratis Europæ &

Semina nigra stria albi. Capitulo luteo cylindrico cavo. Lin.

β. Caulis erectus & rarius glaber subsimplex. Folia inferora extorsum latiori obtusa, in petiolum attenuata dentata infra usque ad caulem: superiorum canaliculato lineari remote dentata subnatis. Peduncululus ramorum

Dentes caulis vel caulem terminat uniflorus. Foliole calycinae lanceolatae marginibus majoribus
parte tenui fusca

Descript. prout. descriptis uti etiam specimen

♁ montanum Chryf. foliis radice albis spatulatis: caulibus cuneiformibus apice dentato incisif
caule subuni-floro.

Belli montana minor Bauh. hist. 3. p. 115. Magnol. mon. p. 36.

Leucanthemum montanum minus Tournef. Inst. h. H. 492. Barrel. Fe. 450. fig. 1.

Chrysanthemum montanum foliis imis spatulatis lanceolatis serratis: summis
lineari-bus. L. S. V. p. 772. Jacq. Coll. 1. p. 332.

+ Habitat mongolica inque Hispania.

Tota glabra Caulis erectus; pedalis simplicis, imas Cere unico terminatus
Folia radicalia grosse crenata petiolam folio longiore attenuata. Caulicaria
cuneiformia apice dentato-incisa basi att. valde attenuata pinnula sum
ma lineari subdentata vel integerrima Pedunculus elongatus. Squama
Calycis absque nigredine in margine. Planta polymorpha observante Bellardi.

+ β. Chrysanthemum ceratophylloides caule uni-floro, pinnis foliorum profunde pectis all.
Flor. Ped. n. 606. tab. 37. fig. 1.

Folia ima cuneiformia ^{apice} incisif; superiora dentato laciniata, interdum pinnati-
fida, pinnis linearibus simplicibus interdum bifidis

9 Canescens Chryf. foliis incanis imis incisp subpalmatis; superioribus fasciculis integerrimis
Chrysanthemum pallidum minimis imis que foliis incisp, superioribus integris et
capellanibus Barrel. Ic. 421.

Habitat in Hispania 4

Caulis basi ramisque cognosis. Rami ascendentes simplicis simi pyramidi vel clava
canescentia uti tota planta, in pedunculum ramis longior desinentes.
Totus infusus linearis ex trosum lobis incisa laciniis paralelis integris acutis
suprema linearis integra acuta. Olio terminalis. Squama calycina
ovata acuminata, margine tenui rugicante. Radix alba basi flavescens

Habitus Ch. pectinati

10 alpinum Pinyf. foliis cuneiformibus apice laciniato-folpalmatis caulibus unifloris.
Leucanthemum alpinum tenuifolium Clus. h. l. p. 335. Barrol. 9c. 450. fig. 3.
Chamomelum alpinum Bauh. pin. 136.

Chrysanthemum alpinum foliis cuneiformibus pennatifidis: laciniis integris,
caulibus unifloris L. Spec. pl. p. 1253* S.V.

Habitat in alpiibus Helvetiæ ad thermas Pyrenæas, inque Hispania.

Planta digitalis caules stoloniiferi, erecti simplicissimi flore magno terminatis
Tota plurima radicalia, petiolata apice dilatata incipens utrinque
2, 3 vel 3 in. caule linearis integerrimi, sessiles. Calycis margine lato
supio.

varietatem ex hispania habeo foliis laciniis carnosius dentibus foliorum obtusis

menium villas non nisi varietas hujus herb Desfont

Chatham Mass.

11 monspeliense Chrysanth foliis pennatis pennatifidis planis linearibus, pedunculis unifloris
Leucanthemum montanum, foliis Chrysanthemum Tournef. Inst. 492.

Bellis montana major, foliis Chrysanthemum cretici angustioribus Magnol. Monsp. 306+

Chryf. monspeliense foliis imis palmatis: foliolis linearibus pennatifidis L. S. V. pag.
472.

Habitat Monspeli 2

Accidit ad Corymbosum et Caulis laxior, ramis latioribus. Venenosis magis inor-
dinate divisi. Pedunculi 3-4 versus summum caulis latius uniflori
Flores majores. Tota glabra striata in Corymb. Petalo folium patet nute
fentes

inodorum Chrysanth. foliis pinnatis multifidis filiformibus caule ramoso diffusis
Chamomelum inodorum s. Cobula non folida Bauh. h. 3. p. 120.

Chamomelum inodorum annuum humiliss, foliis obscure virentibus Monj. h.
3. p. 36. Raii angl. 3. p. 106.

Chrysanthemum inodorum foliis pinnatis multifidis, caule ramoso diffusis
L. p. 772.

Mediciana inodora flor. Svec. 765.

β. Chamomelum mantinum perenne humiliss, foliis brevioribus crassiuscula
re virentibus Raii angl. 3. p. 106. t. 7. fig. 1. 2. Westg. 148*

Mediciana mantina receptaculis hemisphaericis, foliis bipinnatis subcarnosis
supra convexis, subtus carinatis L. S. V. p. 774

Habitat in sideratis Europa β. in mantinis C.

Caulis erectus β. decumbens; striatus ramosis glaber. Folia pinnis cap. filiformibus
remotis. Peduncululi terminales solitarii. Squama calycinis et lanceolata
to margine supio membranaceo. β. differt foliis carnosius

13 Achilles *Chrysanthemum foliis bipinnatis: pinnis imbricatis; caule stricto multifloro* L. S. V.

p. 772 *

Parthenium foliis tenuissimis, achilles eosens Michx. gen. 34. t. 29.

Habitat in Italia.

Caulis erectus subangulatus, pedalis multiflorus. Folia millefolii, sed *Oplo* majora: punctis eminentibus six conspicuis adpressa; subtus pilis albis raris; apicibus mucrone terminali albedo L. S. C.

Dedit Buch.

14 italicum Chryf. foliis bipinnatis, caule ascendente multifloro.

Penthenium foliis tenuissimis achilleae copiosius metelii Gen. 34. t. 29.

italicum Chryf. italicum foliis bipinnatis serratis, florum radius disci longitudine, caule procumbente L. Mant. 116 * S.V. p. 772.

Habitat in Italia

Simillimum Chr: mellefolio, sed caulis magis ramosus, multiflorus, erectior florum radius albidus, longitudine disci l. l. c.

ego a Bellardi habui sed planta ab illo mihi magis convenit cum C. Conymboso et forte non diversa, an igitur hic: diversa planta. (Planta Bellardi est Achillea) an Italica diversa
Cum Syn: michi. hic etiam refertur forte eadem planta bis descripta.

15 Corymbosum Chrys. foliis radicalibus bipinnatis: caulinis pennatis inciso-
fimbriatis: caulibus subcorymbosis
siccatis tercia ligd.

Tanacetum leucanthemum Tabernom. h. 379

Tanacetum montanum in odonum, minore flore Bauh. pin. 132

Chrysanthemum corymbosum foliis pennatis inciso-fimbriatis, caule multifloro L. l. v. p. 772
Genq. fl. austr. vol. 4. t. 379

13. Tanacetum in odonum, flore majore Bauh. pin. 132.

Habitat in Thuringia, Bohemia, Helvetia, Sibiria sylvaticis montosis &

Caulis erectus bipedali ramosus, rigidus. ^{glaber} folia radicalia ^{semipedalia} bipinnata
pinnis pennatifidis vel fimbriatis inciso-fimbriatis. Caulis pennatus pinnis linearibus
acutis inciso-fimbriatis. Pedunculi terminalis bipollicares plures suboppositi
tri. Squama calycina oblonga margine parum fimbriata. Semina margine
membratissima

17 Japonicum Chrysanthemum foliis petiolatis apice incisè dentatis Thunb. fl. Jap. 321.

Habitat in Japonia

Caulis simplex, erectus, striatus, villosus. Folia alterna, petiolata, oblonga, apice incisè
dentata, glabra, supra viridia, subtus pallida, bipollicaria. Thunb. l. c.

18 indicum Chryf. foliis simplicibus ovatis sinuatis angulatis serratis acutis Lin. L.V. p. 773.

Thell. - pu Rheed. Mat. 10 p. 44.

Matricaria sinensis flore minore, petalis et umbone ochrolevis Pluk. am. 142. v.

430. fig. 2

Matricaria sinensis Rumph. Amb. 5. p. 259. t. 91. fig. 1.

15. ~~Chrysanthemum mederospatanum~~ Matricaria indica latiore folio, flore pleno Monf. h. 3. p. 33.

Chrysanthemum mederospatanum, oxyacantho foliis cespit ad marginem sinosis, calyce argenteo Plur. alm. 101. t. 160. fig. 6.

Matricaria sinensis, flore monstroso Vaill. act. 1720 p. 360. Pl. reyl. Lin. 421.

Matricaria reylanica hortenfis flore pleno Raii suppl. 224

Habitat in India

15 Caulis erectus herbaceus pubescens simplex. Folia petiolata lobato sinuata grosse dentata, dentibus ^{obtusis} mucronatis, supra glabra ^{velut} subtus tomentosa. Stipula utraque ovata acuminata. Pedunculi et alis supremis et terminalibus, sesqui pollicibus folioli saepe bini oblongi lanceolati in medio, uni flori. Squama calycino ovato lanceolata glabra interiore latiore margine lato sericeo

Pyrethrum foliis longe petiolato palmatis supra dilatatis, ultimo laciniis trilobis Gmel. Sib. 2. p. 203. t. 84.

Preceptaculum paleaceum secundum Lamour.

19. *Legetum Chrys. foliis amplexicaulibus: superne laciniatis; inferne dentato serratis* L. S. V. p.

773.

Bellis lutea major Traug.

Chrysanthemum segetum Chuf. h. 1. p. 334.

Bellis lutea foliis profunde incisissimis major Bauh. Pin. 262.

Chrysanthemum segetum vulgare glaucum Monf. h. 3. p. 15. f. 6. t. 4. fig. 1.

Habitat in Europa agris &

Caulis erectus, glaber, striatus, ramosus. Folia amplexicaulia, glabra oleracea

^{summae} ~~supremae~~ dentacula ^{ext} ~~ext~~ ^{prosum} ~~prosum~~ ^{laciniata} ~~laciniata~~. Pedunculi terminales, ⁺ ~~incompositi~~ ^{uniflori} ~~uniflori~~ calycis
^{ta} ~~ta~~ ^{apice} ~~apice~~ ⁱⁿ ~~in~~ ^{brevitate} ~~brevitate~~ ^{apice} ~~apice~~ ^{stans} ~~stans~~, ^{inter} ~~inter~~ ^{are} ~~are~~ ^{fere} ~~fere~~ ^{toto} ~~toto ^{stans} ~~stans~~.~~

gemma

20 myconis Chryf. foliis lingulatis obtusis serratis, calycinis squamis equalibus L. Spec. pl. 1254. * S.V.
pag. 773 * Faicu. obs. 4. p. 10. tab. 94

Chrysanthemum 3. Cof.
Chrysanthemum myconi Lind. Dalech. h. 873. t. 83.

Bellis lutea foliis subrotundis Bauh. Pin. 262

Chrysanthemum latifolium Bauh. h. 3. p. 105.

Habitat in Lusitanis, Hispanis, Italia agris ^{terrat} O

Smilacium ^{terrat} Lycium sed caulis rigidior, folia inferiora ex toto sum latera non non vero
apice lacinata. Pedunculi ante florescentiam obfuscoris, subfusci, apice
minime incrassati. Calyx non imbricatus. Radius corollae brevior lin.

Semenum corona membranacea

2) ~~coronatum~~ ^{rium}

Chrys. foliis pennatis incisis extrosum latioribus L. S. V. pag 773

Tinctorius flor. 4. Trag.

Chrysanthemum pectum Ger.

Chrysanthemum coëticum 1. Clus. h. 1. p. 334. Mon. h. 3. p. 16. f. 6. t. 4. f. 2. 3.

Chrysanthemum foliis matricariae Bauh. Pin. 134.

Chrysanthemum majus foliis profundius laciniato magno flore Bauh. Pin. 134

Habitat in Sicilia, Creta, Barbaria

Planta spontanea, tota glabra, erecta pedalis ^{caule} vix ramifera striata. Folia unplexi
caulosa, extrosum latiora, pennata: pennis serratis incisis. Pedunculi
terminales solitarii uniflori superne incisati sulcati. Squama calycina
ovata.

22 articum Chrysanthemum foliis simplicibus cuneiformibus subpalmatis multifidis obtusis
L-Sp. pl. 1254 * S. W. p. 773

Pyrethrum foliis longe petiolatis palmatis supra dilatatis: ultimis laciniis trilobis
Gmell. Sib. 2. p. 203. t. 24.

Habitat in Kamtschata, America septentrionali

Caulis debilis diffusus, herbacei inferne ramosi. Folia petiolo longis, subcarinosa,
levia, cuneiformia trilobata, sinuato-angulata, obtusa. Flores terminales
solitarii magnitudine Chrysanth. coronari. Pedunculo subvelloso l. l. c.

23 pedunculatum Chryf. foliis pinnatis lanceolatis parallelis acutis integerrimis, caule subunifloro
L. Spec. pl. p. 1255* S.V.

Caules palmares

Habitat in Hispania, Italia &

Caules ascendentes, interdum erecti, palmares vel parum ultra, simplicissimiteretes vix pubescentes in pedunculum uniflorum terminati. Folia infera in caule, petiolata, coarsiuscula pollicata. Squamae calycinis late ovatae margine lato membranaceo.

24 millefoliatum Crisp. foliis bipinnatis, caule decumbente Corolla radii discum exsertente
Leucanthemum folio abspathis, alpinum Cassi Boeck. Lugdb. 1. p. 107.

Pyrethrum foliis duplicato-pinnatis: pennulis incisis pedunculis unifloris,
caule procumbente Gmel. Sib. 2. p. 207. t. 86. f. 12.

Achillea foliis pinnatis: folioli linear lanceolatis basi sursum acutis
Mell. Ic. 6. t. 9.

Anthemis millefoliata foliis bipinnatis: laciniis linearibus integris, pedun-
culis radii longissimis L. Spec. pl. p. 1263 *

Chrysanthemum millefoliatum foliis bipinnatis dentatis, caule decumbente, corol-
la radii disci brevioribus L. S. V. pag. 773 *

Habitat in Libia.

Habitus millefolii. Caulis striatus pubescens superne subramosus (caulicula caule
erectus). Folia ^{subquadrilobata} pubescentia linearibus acutis. Pedunculi in ramis primis
pauci alterni bipollicares et ultra apylli subflores parvis ^{caprina} exsertentibus
strati. Flores anthemidis ^{caprina} tunc minoris. Corollula radii ^{caprina} subrotunda
semena margine membranaceo coronata

pauciflora Achillea foliis tomentosis pectinatis omnibus bipinnatis, ^{pinnis integris} corymbis pauciflori
Habitat 4

Caulis ascendens semipedalis tomentosa iniana uti tota planta. pinnis indivis
lineares angustiores et acutiores quam in aurea. Corymbi ^{divisi} tri- vel quadriflori
folium nullum ^{divisum} subramificationibus. Squama calycino margine sicaroso

Chrysanthemi spec
non videtur esse Achillea cum recept. nudum

aurea Achillea foliis tomentosis ^{pinnatis} radicalibus bipinnatis. ~~pinnatis~~ caulibus pinnatis pennis subintegris
obtusis
an Achillea aurea de la Mark.

Habitat. ex horto perfrino

Planta palmans caulis pubescens, simplex. Folia tomentosa incana. pennulo later
oblongo basi parum angustato obtuso, interdum foliorum radicalium integro caulibus
interdum laetia una alterave pedunculati ramosi. Corymbus irregularis pauci
floris floris 6-8. magni. Folium lineare ad ramificationes, integerrimum
Calyces villosi

Achillea orientalis

Chrysanthemi spec

25. bipinnatum *Chrysanthemum foliis bipinnatis serratis vellophis, radio disco brevioribus* L. Spec. pl.
1255 * S. V. p. 773.

Pyrethrum foliis duplicato pinnatis: pennulis incis, pedunculis unifloris

Gmel. lib. 2. p. 205. t. 95. fig. 1.

Habitat in Sibiria 4

Habitat Antken. Sibiria. Pinnulo foliorum sublaevicolato, hirsuto, fere Tanacetum.
Pedunculi axillares, nudi, uniflori, pubescentes, longitudine foliorum. Flores
lutei: radio disco longe brevioribus L. Spec. pl.