

Chrysohalanos

oblongifolius Phrysofolanos

Habitat in Carolina herb. Rich.

Stemtus humilis. Rami teretes, glabri, purpurei. Folia brevissima petiolata,
bipollicaria, obtusissima, lanceolata-oblonga, basi acuta, supra nitida
venosa, subtus obsolete venosa, glaberrima, ^{in aequina} Peduncululi axilla
res et terminales, uti calycis ^{floris paucis utatis} incani, folio breviores, breviter pedicellati.
Calycis foliola ovata, acuta. Petala 5. Stamina 15. Calyci inserta. Cuius
duo oblongo-ovata, utraque subaequaliter rotundatae-obovatae.
Richard vidit in flore germina 3 sive Germina usque ad basin Tripartita
interveniente basi styli unius uti in floribus simpliciter germinis
variat folio cuneatis subtus tomentosis incani

Ucaio Chrysobalanos. Lin. Spec. pl. pag. 601. Jacq. hort. Tab. 94

Guajera Margrav. bot. V. 2. C. 4.

a Ucaio fructu ex albo murescente Plum. gen. 44. u. 150

b Ucaio fructu nigro Plum. gen. 44.

v Ucaio fructu purpureo Plum. gen. 44.

d Chrysobalanus fruticosus, foliis orbiculatis alternis, floribus luteis

racemosis Brown. jam. 250. V. 17. fig. 5.

Habitat in America meridionali

Rami teretes apice compressi glabri cortice fusco griseo
punctati. Folia breviter petiolata obtusata alterna utraq;
glabra subtus pallidiora subtilissime venis reticulata calyx
rima emargina bis. Sepallicioni parum parum longior
quam lata Pedunculi axillares & nichotomi compressi
apicem versus latiores ter vel quater dupli ultimi
caeserentes folio 2 plo breviores Calyx incanum