

Chrysozoma

tomentosa *Chrysocoma foliis ramisque tomentosis* Lin. Syst. veg. 1781. ad. Pers.

Habitat in Cap. b. spei. Ex herbario Royeni

Caulis statim a basi ramosus: Rami semipedales, erecti, filii ~~truncati~~
tenuis graciles, simplicissimi, uti folia in ano tomentosi. Folia
frequentia, semipollicaria, petula, angusta, acuta. Peduncululi terminales,
sesquipollicares, solitarii, uniflori, erecti, striati, glabresculi,
viridi-flavescentes. Flores Chrys. como aureo parum majores,
flavi. Calycis foliola linearia, villosa.

^{Saxifera}
~~fragrantissima. St. foliis oblongis crenulatis, calycibus tomentosis~~
~~Chrysothema fragrantissima~~

~~Habitat in Anthe Forskäl 5~~

~~Rami parvi simpliciter uniani. Sola sive parva unan
ti in crassatis. pedunculi 3-4 ad apicem ramorum uniflori
Calycis imbricati squamis oblongis~~

Strigosa

Chrysosoma foliis linearibus patentibus ramisque pilosis ^{cinerascentibus} subscaevulis, ₄

floribus erectis

Habitat in Mauritania Schoristoc. 5

Caulis ^{rigidus} fruticosus: rami sparsi, simplices, vel superne in ramulos
floriferos paucos divisi, et pilis albis adpressis, ut folia utrinque
vix canescentes. Folia sessilibus, alterna, angusta, integerrima, acuta
plana. Pedunculi terminalis, brevis uniflori. Flores Chrys. coma
aurea minor. Calycis foliola linearia

^{differt} Differt a Chrys. seneca ramis foliisque minime ^{altissimis nec} ~~resistentibus~~, sed vix canescentibus, nec ramulis ^{apice} paniculatis foliisque ^{canaliculatis nec planis.} ~~patentibus nec retortis.~~
A Chrys. cornua dignoscitur foliis utrinque ramisque ^{et pi}
lis adpressis subscaevulis, floribus erectis.

Spharodea Luitri

Habitat in Basolina herb. herb.

Caulis erectus, herbaceus, simplex, glaber, sulcatus subangulatus. Folia lancea
lata, glaberrima, basi cuneata, innervata, acuta, inferiora petiolata, 4-5 pollicaria
superiora sessilia, angustiora. Radiculi ex axillis superioribus, alterni, uniflo-
ri, villosi, folio floralibus brevior. Flores magni. Calycis foliola lata, oblonga,
obtusissima, umbellata.

Chrysocoma foliis oblongo-ovatis integerrimis subtus tomentosis, floribus
corymbis paniculato-corymbosi

Habitat ad Senegal Dupui quondam profectus horti

Crux ramosus. Rami sparsi, potentes, teretes, ^{superne} tomentoso canescentes
inians tomentosi. Solia petiolata, alterna, tri vel quadri pollicaria, ^{supra}

utrinque ^{ta} ^{venosa} sit venosa, glabra, subtus venosa, canescentia. Corymbi ^{diffusi} ^{compositi}
pedunculi ^{domantur} flexuosi, partiales divaricati; pedicelli biflori, floribus
pedicellatis. Calyx hemisphaericus, ^{ante} imbricatus: foliola ovata, acuta
marginibus apiceque villosa. Pappus reflexus, calyce duplo longior
saies ex parte ^{saer} Bachtae arborescentis at flusculi omnes herma phodit

odoratissima Liatni

Habitat in America septentrionali Ruben

Caulis herbaceus, erectus, altus, glaber, cuspidatus penna asperus, teris. Folia
integerrima, glabra, subnervosa, ovata, inferius cuneata - lanceolata, basi
attenuata in petiolum, frithamoa, superiora ovato-oblonga, basi utrinque parva
decurrentia, obtusa, suprema lanceolata, unguiculata. Flores corymbos
paniculate, parvi. Calyx subsimplex, pauciflorus: foliola linearia

Cuneifolia *Chrysosoma* foliis ^{integerrimis} radicalibus cuneiformibus, caulinis linearibus;
Corymbis decompositis
Habitat in Carolina Bosc.
Caulis herbaceus, ^{radicali et vesperti} erectus, teres; superne in pedunculatos divisus; uti tota
planta glaber. Folia plurima radicalia, ^{polycarpu} lanceolata, in petiolum
attenuata, obtusis summa, trinervi, avenia: caulina remota, angustis-
sima, sessilia, acuta. Corymbi terminales, fastigiati, foliis linea-
re subramificationibus. Flores parvi. Calyx coloratus flavescens,
quadriflorus.

~~Chrysosoma
Cuneifolia~~
Chrysosoma
Cuneifolia

erectum *Cirsium*

Cirsium erectum albis, *sinum* *cardui* *lanceolati* *folio* *Tournesf.* *Cor.*

La Mark

Habitat in Coeta herbis /

Caulis erectus, sulcatus, subarachnoideus, ^{ramosus} alatus: alis dentato sinuatis, dentibus spinis longioribus.

Folia inferiora pennata, ^{altius latius subtomen topos} pedalis: ^{limbi pedalis} laciniis ^{limbi pedalis} dentato lobatis, angulatis angulis ovatis vel lanceolatis

integerrimis, spinis ^{mutatis & lobatis} terminatis, supra glabris, ^{liberius} subtus arachnoideo tomentosis: superiora st dentato-

sinuata, dentibus ^{lateralibus solitariis} bis trifidis. flori superne in pedunculis brevibus, aggregati, parvi. Squa-

ma calycis ovata, obtusa, terminata st funicula patente. Pappus plumosus

* aequata, subtus incana

Carduus erectus La Mark n. 20

trinervis ^{lineari-} *Chrysocoma foliis lanceolatis integerrimis* ^{trinervis} (caule quo pubescenti-
bus, floribus corymbosis

Habitat in America septentrionali? Ventenat

Caulis herbaceus, erectus, teres, striatus, superne in ramis floriferis
fastigiatis divisis. Folia sessilia, sparsa, bipollicaria, lineari
semicunquam lata, acuta, viridi canescentia, ovata. Corymbi sim-
pliciter. Flores magnitudine Chr. leucopuridis. Calyx subpubescentis
folioli lineari-oblongis; interioribus obtusis. Corollula profunda
quinque partita. {

hastatus C. foliis pinnatis pinnis subtus tomentosis, flo. Calycibus glomeratis glabris
Carnus hastatus foliis amplexicaulibus hastato-canaliculatis pinnatis pinnis
subtus incanis, floribus in apice congestis subsessilibus, unico termi-
nali erecto ha. Martii Encycl.

Habitat in alpiibus Geneve.

Caulis erectus simplex, sulcatus ^{subtus incanis} superne lanato tomentosus anferne
calvefens. folia pinnatifida, radicebus petiolata laciniis lan-
colatis pinnulosis denticulatis sursum dentatis. Caulina amplexi-
caulia radicalibus paucis. Pedunculis brevis. Calycis 8 ad septem
glomerati intermedium primum florent. Quamvis canaliculato apice
nunc purascentis interiores mutico exteriores pinnula terminato.

Descr. d. em. agnoscum

microphylla Chrysocoma, foliis oblongis ^{sessilibus} ~~marginatis~~ integer rimis tomentosis

Habitat in ⁱⁿ Monte Herab Forsk. 5.

Trutext rigidus, ramosus: Rami teretes, pubescentes, ramulosi. Folia
semicunquicularia, remota, ^{alternis} mucrone brevi recurvato terminata. Flores
terminales ramulorum. Calyx imbricatus, pubescens: foliola fla
vescens, oblonga, obtusiuscula, ~~pubes~~ flavescens, apice fusca. Papp
pus ferrugineus, dens semina hirsuta. Pappus ferrugineus, dens
latus

fusco-ribes Lupulinum,

~~Chrysoloma~~ *Chrysoloma* ^{Phrynosomena} ~~integerrima~~ ^{integerrima} ~~foliis~~ ^{foliis} oblongis ~~floribus~~ ^{floribus} solitariis

in monte flore legit ~~Corchaleus~~ ^{inter descripta} non invenio

Caulis fruticulosus, Ramosus, Rami vertes, glabri vellofi.

Stipulae oblongae, acutae, integerrimae, vellofi, ^{per semi} linguae calariae.

Stores in apicibus ramorum solitarii oblongi, obtusis,

Calyx ut in procedentibus; folioli exterioribus, epuce coloratis.

interioribus longioribus, linearibus, acutis.

Pappus longitudine Calycis fermyneus.

oppositifolia Ch. foliis oppositis obovatis, floribus fasciculatis pedun-
culatis Lin. Amon. Acad. 6. p. 4

Cyanus arborescens minor, foliis majoribus Breyer u. Tob

17. fig. 2.

Habitat in Cap. b. sp. 5

Rami flexuosi teretes, ramuli oppositi, tetragoni, sculo
armato pulverulenti. Folia petiolata unguicula
na integerrima, arena, obscure ternaria, sculo arma-
to pulverulento villosi. pedunculi ad apicem ramulorum
oppositi conferti filiformes uniflori. Calycis cylindrici embri-
cati oblongi obtusi. ^{calyx 7.} flores cum pappo calycis longiore
Pappi denticulatus. Semina hirta.

Pappus Pteroniae uti Calyx. antheris absque seta
Pentaculum nudum subfoveatum

hirci uti villosa, montana proprii forte generis

Scabra Ch. foliis lanceolatis ovatis recurvis denticulato serratis, pedun-
culis pubescentibus Linn Syst. V.

Conyza africana Tenaxifolia subfrutescens, flore aureo

Dell. Cat. 104. Tab. Od. fig. 103.

Baccharis foliis ovato-lanceolatis serratis, caule suffruticoso

Lin. Att. Cliff. 4044

Habitat in Cap. 6. p. 5

Rami subramulati. Terni glabra. Vertices. Tota crassiuscula
la parva margine denticulis fuscis dentata, uti et in costa
frequentissima. pedunculi terminales solitarii uniflori

oblonga

Fruticosa Ch. foliis cuneiformibus superne pubescenti haigu.
coll. n. pag. 200. Tab. 22. fig. 2.
Habitat

non ed:

Decurrens Chrys. foliis linearibus lanceolatis obtusis glabris subdecurrentibus

^{Angustis & pinnatis}
Habitu in Cap. h. p. 5

Rami inferne e foliis deciduis mucronatis, glabri. Vicia frequen-
tia, margine utraque obsolete decurrentibus, integerrima, crispis
si uia recta. Pediculis terminalibus solitariis unifloris
unguiculatis

Tomentosa Ch. foliis ramisque tomentosis foliisque lineari-bus subtus-

Tomentosis

Chrysocoma tomentosa suffruticosa, foliis ramisque tomento-

sis lineari-bus subtus-

Habitat in Cap. 6. p. 5

non id.

patula @ foliis lineatis glabris, ramis divaricatis L. Mant.
pag. 200

Habitat in Cap. b. spec. 5

Rami teretes 2-3 thotomi elongati, glabri. Folia polluciana, glabra
crispifolia callo flavescente infidentia frequentia.
Pedunculati ex axillis supremis fastigiati uniflori inferne
foliolosi.

*Chrys.
pilosus*

Chrys. foliis linearibus ramisque pubescentibus scabris

Habitat in Montania Schousboe.

Rami sparsi teretes ascendentes glabri aphylli. juniores floriferi ut foliosi, uti folia pilis albidis adpressis pubescentibus. Folia semipollucaria patentia. Pedunculiflori
na 4-5. sicuti pollucaria foliosi uniflori. Squama calycina lanceolata sive pilosa
Habitus *Chrys. coma aurea*

com aurea Ch. foliis lineariibus rectis glabris dorso decurrentibus. Lin Syst

Veg.

Coryza othopria, flore bellata aureo, panicula brevioribus
foliis lobis raris

Loma aurea frutescens, foliis lineari angustis major

• Com. hort. 2. p. 89. tab. 45

Elechrysum africanum multiflorum venosifolium frutescens

Vol Kam. nomb. 140. Tab. 140

Habitat in Cap. b. p. 5

Rami conferti, subverrucati, erecti, teretes, glabri. Folia lineari
glabra, semipollicina, patentia inferius senescentia annata
& lori terminali. Squama calycina triplo armata subulata

floribus nublibus erectis

Cernua Ch. foliis linearibus ^{reflexis} recurvis subsaeptis, floribus natis ceruui
Lin. bot. Cliff. 397*

an Planchet. mant. 47. tab. 3 Pl. fig. 5

Habitat in Cap. b. p. p.

Rami 3-4 subverticillati, glabri, teretes. ^{Suplex} folia frequentia, glabra, angu-
cularia margine parum revoluta. flos terminalis solitarius
magnitudine Corae auro ut foliolis calycinis punctis

Squamosa Chrysocoma foliis linearibus recurvo glabri

Habitat in Cap b. spec 5

Inter ramū Diffotis, Tricottomis, ^{Inter} ~~presidentia~~ a foliis davi
dus tuberculatis foliis fuscis Chryf: comocoma at foliis
et floribus minoribus.

Ciliata Ch. foliis linearibus rectis ciliatis ramis pubescentibus. Lin

Syst. V.

Coma africana fruticosa, unico folio Com. hort. 2. p. 95.

Tab 4 D.

Habitat in Cap. b. p. 5

non vid.

Alaulis Chr. subalatis, foliis dentatis: radicalibus planis subovatis
floreolibus alternis, remotis lanceolatis Walt fl. Car. pag 196
Habitat in Carolina

non vidi

gigantea Chr foliis confectis sessilibus ovato-lanceolatis serratis rugo-
sis. In quinque lobis, floribus corymbose Walt. flor. Carn. pag
196.

Habitat in Carolina.

non vid.

odoratissima Chr. foliis radicalibus obovato-oblongis; caulinis oblon-
go lanceolatis lobatis, floribus corymbosis Walt fl. Car. pag
190
Habitat in Carolina

non vidi

purpurea Chr. folio elliptico lanceolato ^{retuso} sub serratis pubescentibus
pannicula terminali corymbosa & dist. gl. auct. pag 54
Habitat

Non vidi

Setosa g foliis lanceolatis decurrentibus adnatis ciliato-spinosis, floribus ter-
menalibus Lin. Mant. 207. * S. V. p. 783
Habitat in P. b. spec. neptibus mantimis 5

ramosa Chr. foliis lanceolatis, caule subramoso pubescente, floribus
subsessilibus spicatis Walt. fl. Car. pag 190.
Habitat in Carolina

non vidi.

paniculata Chr. foliis lanceolatis adscendentibus cauleque usque
simplici pilosi, paniculata terminali Walt fl. Car pag

190.

Habitat in Carolina

non vid.

uniflora Chr. foliis lanceolatis, pedunculis terminalibus unifloris
caule ramoso Walt. fl. Car. pag. 198.
Habitat in Carolina

non vid.

6 flora Chrysozona paniculata, foliis lanceolatis trinerviis punctatis nudis S. V. pag. 740.
Coryza linifoliae affinis rigidis et nervosis, floribus lacteis umbellatis Ann. nith. 192.
Aster calycibus oblongis luteis, foliis ex linear lanceolatis integerrimis trinerviis;
infra subtibus excavatis Gmel. Sib. 2. p. 189. t. 82. fig. 1.
Habitat in Sibiria
Flos variat cum et sine radio.

non radi

villosa Ch. foliis lanceolatis villosis, ^{lycibus} caulis ante Gmel. p. 16. L.

Syst. Veg.

Congea tomentosa Triniana, floribus luteis umbellatis, et hinc
prope vidi folio Ann. with. 190.

Cisternaiana, calycibus latis oblongis, foliis et linearibus
conicoidatis, floribus nudis umbellatis Gmel. p. 16. 2 pag
192. Tab. 82. fig. 2.

Habitat in Libia

Caules plures erecti simplicissimi pedales folia sespiter
viti caulis caetera alterna catenata inferna pollin
na sespiter minorum. Pedunculi superum pauci foliosi
1-vel biflori Calyx obovatus squamis oblongis obtusis. Pappus
calyce longior rufescens obscure denticulatus.

- iniana -

Cenopisis Cho foliis linearibus glabris, calycibus laxo Lin. V

Cynis autumnalis Plin. hist. 1 pag. 325.

Chrysocome discoloris ab Linn. Col. Expt. 1. pag. 81. t. 82

Linaria foliosa capitulo luteo, major et minor Bauh. pin. 213.

Habitat in Europa temperatae 4

Caulis erectus glaber virgatus ramis saepe subfastigiatis, foliis
tri- s. 3 pollicaria sessilibus sursum minoribus tuberculo parvo
insidentia. Flores ex apice ramorum et ramulorum soliti
ni. Calycis foliola linearia disco longiora.

pelosa Qi. folio linear aceris, cauleque simpliciter piloso, floribus sessilibus
subimbricatis pucatis Walt. fl. Car. pag 197
Habitat in Carolina

non id.

eroga. T. foliis lato-ovatis inaequaliter serratis nervosis scabris, petiolo longioribus. Linn. prodr.

p. 115.

Habitat in Dominica St. Christoph. 4

videt
hic (Chrysocoma undata
caulis per nudus
capillaria

Carlina