

# Pichoreum

1. Indicum C. floribus geminis sessilibus, foliis nuncinatis.
2. Endicra C. floribus solitariis pedunculatis, foliis integris crenatis
3. Sphenopium C. caule dichotomo spinoso, floribus axillaribus sessilibus.

*Andryum* B. floribus geminis sessilibus, foliis reniformibus Linn. V. p. 722.

*Andryum* sylvestris Lam. epit. 205. Buchf. hist. 979

*Cichorium* sylvestre f. officinarum Bauh. pin. 126

Habitat in Europa ad marginem agrorum et riarum &

*Endivia* C. floribus solitariis pedunculatis, foliis integris crenatis her. S. 722

*Indybum latifolium* Dod. pempt 634.

*Cichorium latifolium* f. *Endivia vulgaris* Bauhin 125.

β. *Endivia crispa* Bauh. p. 125

Habitat

*Culta* Caulis foliatus erectus glaber uti tota planta exceptis marginibus  
foliorum calycis. Folia ovata basi sensim angustata, in cressa  
inaequaliter grosse dentata crispa. Folia sub pedunculis et floribus  
cordatis dentatis magne scabra, calycis foliola ovato lanceolata  
ciliata

*Sperosum* C. caule dichotomo spinoso, floribus axillaribus sessilibus L. N.  
p. 722.

*Chondrilla* generis elegans, conuleo flore Clus. hist. 2. p. 145.

*Pichonum sperosum* Bauh. prodr. 62. t. 62. Pin. p. 126.

Habitat in Creta Sicilia collibus arenosis maritimis &

Caulis erectus semipedalis rigidus subsiliosus & tenuis pilis glaber uti tota  
planta. Folia radicalia linearia basi attenuata inferne versus  
sensim angustiora sinuato dentata: dentibus paucis remotis caulina  
inferiora linearia integerrima, saepe uti superiora subramis semianaplexi-  
caulis. Superiora saepe magis rotunda. Flores parvi supra dichotomia  
et in apicibus ramulorum solitarii dichotomia subsessiles: basi squa-  
mis nonnullis ovatis. Calyx parvi cylindrici folioli linearibus