

Cineraria

1. cymbalanifolia *C.* foliis ^{subtus subpelosis} lyratis impari reniformi dentato, caulibus summis amplexi-
caulibus lobatis integerrimis
2. humifusa *C.* foliis reniformibus subangulatis, petioli auriculati nudisve, pedunculis
unifloris
3. viscosa *A.* foliis pinnatifido-lobatis acutis viscidis carnulosis, pedunculis unifloris
4. lyrata *A.* foliis lyratis impari reniformi sublobato-dentato subtus tomentosis, flori-
bus paniculatis
5. geifolia *A.* foliis reniformibus suborbiculatis sublobatis dentatis, petioli auricula-
ti cauleque pilosis
6. populifolia *A.* foliis cordatis angulatis, denticulatis subtus tomentosis, petioli basi auricu-
latis, floribus paniculatis
7. lanata *A.* frutescens, foliis reniformibus angulatis subtus tomentosis, petioli simplicibus
8. malvifolia *A.* foliis cordatis angulatis infra subtomentosis, petioli simplicibus, floribus
cymosis
9. aurita *A.* foliis cordatis subangulatis subtus tomentosis, petioli basi auritis, floribus
corymbosis
10. cnicata *A.* foliis cordatis angulatis subtus purpurascantibus, petioli basi auritis, floribus
cymosis

11. lobata C. foliis cordatis lobatis glabris, floribus paniculatis.
12. hastifolia C. foliis ^{oblongis} hastatis: laciniis lateralibus bifidis divaricatis ^{pediculis ulonum lanceo} ^{caulis ter, sulcato}
13. discolor C. foliis oblongo-lanceolatis acuminatis subdentulatis glabris; subtus niveo
tomentosis, floribus corymbois, caule fruticoso.
14. glabra C. foliis oblongis acutis subdentulatis enerviis utrinque glabris subsessilibus,
23 floribus corymbois calycibus cylindricis, caule fruticoso.
15. cordifolia C. foliis caulinis petiolatis cordatis acutis serratis glabris, panicula pauciflora
caule angulato.
16. repanda C. foliis ovatis subrepandis subtus tomentosis, paniculis racemosis flexuosis, caule arbo
rescente
17. rotundifolia C. foliis petiolatis ovatis subrotundis integerrimis subtus tomentosis, pani
culis paucifloris, caule arborescente ^{subintegerrimis}
18. palciifolia C. foliis ovato-lanceolatis petiolatis subtus tomentosis, corymbis axillaribus
terminalibusque
19. americana C. fruticoso, foliis petiolatis lato-lanceolatis serratis subtus canis, panicu
lis axillaribus
20. elongata C. foliis subcordatis crispis, pedunculis longissimis subulato-squamosis.
21. sibirica C. foliis cordatis obtusis denticulatis lobatis, racemo simpliciter, caule simpliciter
22. glauca C. foliis ^{fimo monophyllo} hastulatis cordatis integerrimis, racemo simpliciter, caule simpliciter

20. petasites L. foliis radicalibus sublyatis: impari cordato lobulato caulines amplexicauli
 bus lanceolatis repando sinuatis
21. leucanthemal foliis spatulatis angulatis subtus tomentosis, floribus paniculatis, caule her-
 baceo
22. sonchifolia L. foliis amplexicaulis sinuatis difformibus
23. perfoliata L. foliis ovatis cordatis amplexicaulis, pedunculis unifloris elongatis
24. alata L. frutescens, foliis obovatis decurrentibus integerrimis, floribus corymbosis
25. cheirifolia L. foliis obovatis dentatis glabris, pedunculis unifloris
26. denticulata L. foliis lanceolatis glabris denticulatis, floribus paniculatis
27. maritima L. foliis pennatifidis distichis tomentosis, floribus corymbosis, caule frutescente
28. canadensis foliis pennatifidis subulatis: ^{caulinis sinuatis} caule herbaceo
29. lanuginosa L. frutescens, foliis oblongis tomentosis superne dentatis
30. aurea L. foliis lanceolatis serratis subtus tomentosis, floribus corymbosis
31. purpurata L. foliis obovatis subtomentosis, caule subbifloro
32. japonica L. foliis ensiformibus dentatis tomentosis, floribus terminalibus
33. lineata L. foliis lanceolatis subtus tomentosis apice serratis basi dentatis
34. crispata L. foliis caulinis spatulato-oblongis serratis obtusis amplexicaulis
 basi dilatatis dentatis, floribus paniculatis
35. deaest L. frutescens, foliis linearis lanceolatis tomentosis superne dentatis, floribus co-
 rymbosis

39. *revoluta* C. *tomentosa lanata*, foliis linearibus ^{integerrimis} mucronatis *revolutis*, pedunculis *unisani*
floris
40. *linearifolia* C. ~~*fruticosa*~~, *tomentosa*, foliis linearibus *subdentatis* *revolutis*
pedunculis unifloris
41. *integrifolia* C. foliis *denticulatis* radicalibus *oblongis* caulinis *lanceolatis*, *flori*
bis umbellatis
42. *longifolia* C. foliis *obsoletis* *denticulatis*, omnibus *oblongis*.
43. *palustris* C. foliis *lanceolatis* *dentato-sinuatis*, floribus *compositis*, caule *velloso*
44. *pinifolia* C. foliis *filiformibus* *confertissimis* *parvis* *pinuosis*, pedunculis *lanceolatis*
bis foliis longioribus filiformibus
45. *linifolia* C. foliis *parvis* *nudis*, pedunculis *unifloris*, caule *fruticoso*
46. *caecalioides* C. foliis *teretibus* *oblongis* *carinatis*, panicula *terminali elongata*
pauciflora, pedunculis *alternis*
47. *ciliata* C. foliis *linearibus* *confertis* *basi ciliatis*, pedunculis *unifloris*, caule *fruticoso*
48. *repens* C. foliis *spatulatis* *dentatis* *hirsutis*, pedunculis *unifloris*, caule *repente*
velloso
49. *hista* C. foliis *oppositis* *lanceolatis* *sessilibus*, pedunculis *unifloris*, caule *herbaceo*
50. *microphylla* C. foliis *oblongis* *oppositis* *alternisque* *marginatis*, pedunculis *uni*
floris, caule *fruticoso*, ramis *alternis*

Ortus

Cinerea

Saccolca gracilis montana, folus superne verruculatus, inferne incanis
Tournef. Cor. poz.

Habitat in ^{montanis} gracibus herb. Lus.

an. herbaria. Similis montana, ut facile varietatem conderem, lanata ^{montana}
et sa. incana. Calicis etate glabra. Folia petiolata, pinnata; lacines oblon-
go, dentato-angulato, obtuso, latiores quam in montana. Pedunculus elongatus
et laxis sublongioribus major quam in montana.

Junonulosa Cinesana

Le Month.

Habitat

herb. Quif.

Caulis teres, ramosus, ut. tota planta glabri, striatus. Folia opposita et verticillata, pollicaria, cuneata vel lanceolata, crispis, acutis, nervis, basi attenuata, dentata: dentibus acutis, superiora lanceolata, remota. Corymbis terminalibus, multifloris. Calycis complexi: foliola octona

Chamaedryfolia Cracca

Le manth

Habitat herb. frus.

Caulis inferne flexuosus, striatus, glaber. Folia petiolata, cordata, obtuse dentata, axillaria, enerviis, carpa, subtus pallidiora, utraque glabra, acuta, serrata tenui mucronatis, semi pollicaria. Petioli longitudo foliorum, superne saepe dentate acuto. Pedunculis caulium ter minans, medio folio lanceolato sessili, bis bifido, folium parvum subulatum ad basin pedicelli. Spicamula nonnulla distans, ter, lineares. Calyx polyphyllus, simplicis. Corolla magnitudine sca. Jacob. flori radiati
an tenetis, eod. folio ter.

minuta Cineraria

Cavan.

Habitat in hispania herb. Tus.

Caulis digitalis, pilis longis adpressis; utriusque folia, uniflorus. Folia parva sessilibus
inferne spatulata, apice dentata, superiora linearia, utraque dentibus
2-3. supremum lineare, integerrimum. Pedunculus terminalis caulis.

Calyx simplex, pilosus

Folia radicalia quinque dentata vel utraque bidentata pinnata vel pinnata
trifida, subtus rubro violacea

Spathulata Cineraria

ku Mark

Habitat herb. fusca: 5

Caulis fruticosus, ramosus: rami teretes, glabri, uti tota planta: ramuli sparsi.

Folia cuneata, subcarnea, decurrentia, unguiculata, integerrima. Corym-
bus terminali brevis. Calyx pentaphyllus: foliis oblongis
ab alato forte non diversa

balsamita Cineraria

Jacobaea orientalis folus oblongis non laciniatis incanis Tournef. Cor.
Habitat in Oriente herb. Rusf.

Tota incana. Caulis erectus, sesqui pedalis, simplex crispis pennis asperis
Folia inferiora petiolata, bipollicaria, oblonga, basi attenuata, obtusa, grosse
crenata, arena vix nervosa: superiora basi vix profundius serrata:
Suprema amplexicaulia, lanceolata, acuta, remote serrata, Cyma
terminalis, subcomplicata, brevis. Flores magni Seneci: Jacob. Calyx
calyculatus, basi tomentosus; Lobula interiora, linearia glabra. Corollula
plures
potius Senecio

Conyza *Canerana*

Habitat herb. Desfont.

Folia radicalia, longe petiolata, 3 pollicana, cordata, dentato-multangula, supra simpliciter venosa, glabra, nervis armata punctata, nervis, dentibus dentatis subtus nivesca, venosa, nervis glabris. Scapus erectus, teres, glaber, subtiliter striatus, simplex, pedalis, diphyllus. Folia remota, petiolus basi dilatatus, amplectens, inferius striatus radicalium, modo minus, alterum oblongum, dentato subpinnatum, in petiolum acuminatum: Florealia coriolata, inferum apice serratum, reliqua integerrima. Pedunculi 3-4, alterni, remoti, inferiores triflori, terminales uniflori, striati, glabri versus florem crassiores, foliolo uno altero ^{et alio} in fructu. Calyx simplex, glaber: foliola lineana, flavescentia, apice fusca

Pinesasia

Jacobaea virginiana folus emi *Alliania glabra*, caulibus *barbarea*
monf. hist. 3. p. 110. no 9.

Habitat in America septentrionali herb. Desfont.

Caulis herbaceus, angulatus, glaber. Folia radicalia petiolata, palmaria, cor-
dato-oblonga, obtusa, subt serrata, venosa, glabra, obtusa. Petiol. striati.
Caulina remota, amplexicaulis, uninata: lacinia terminali oblonga,
obto profunde serrata: lacinia laterale lineari-lanceolata. Cymbi super-
nae, simpliciter. Flores minores An. montano. Calyx simplex: foliola lineari-
intacta

Cineraria

Habitat in montibus circa Petrii herb. Iniamelli: apud Tusper
Tota lanato-tomentosa, folia lanceolata, pollicaria, basi attenuata,
integerrima, supra semper minore. Corymbus terminalis, simplex.
Flores magnitudine C. montanae. Calyx tomentosus, simplex, intactus.

prothulata Cineraria foliis radicalibus prothulatis integerrimis, caule subnudo. Corym-
bi simplicibus

Habitat in cap. b. p. herb. Noyni

Caulis herbaceus, erectus, uti tota planta glaber, superne in pedunculos div. ip.
Folia radicalia, prothulata. lamina oblonga, aveni, simpollicari. folium lanceo-
latum, basi dilatatum sub pedunculi. Corymbi pauciflori. Flores parvi

virgata Cineraria

Habitat in Cap. b. pp. in herb. Royeni

Caulis suffruticosus, erectus, infer ramosis, apice saepe rami 3-4. ramuli tomentosi.
stata nudi. Folio petiolata, pollicaria, oblonga, exosa, vel sinuata lobis dentatis
et dentato-^{angulatis} lobatis, glabra, asernia, basi subattenuata. Petioli filiformes
longitudine folii. Peduncululi elongati, semipedales, simpliciter vel inferne divi-
si in ramo uno alterove, adpressi squamis subulatis distantibus. Calyx sim-
plex
affinis elongato, conferenda cum Jencnis virgata.

angulosa Cinemna folus radice luteo sublyatis, caulibus amplexu aulibus lanceolatis sagittatis

Habitat in Cap. b. p. p. i.

Caudis herbaceis, erectis, semipedalis, uti tota planta glabris. Folia inferiora et radicalia petiolata, lyrata, lacina terminalis cordato-subrotunda, dentibus paucis angulata, unguiculati: lacinae duo versus apicem petioli parvas angulata, in sequentia cuneata, pollicaria, basi amplexu auli sagittata, remote dentata, duo superiora, breviora, remotissima, lanceolata sagittata, integerrima, omnia enervia, loria. Pedunculi terminalis, 3, unguiculati, squamis minutissimis, paucis. Calycis foliola lanceolata, simpliciter ordine. Corolla purpurea.

confusum Cymbalan folia

hederifolia Cicerani pubescens foliis ovatis dentatis, pedunculis, floribus

Habitat in Cap. b. p. her. b. Rayeni

Tota pubescens. Caulis herbaceus, debilis, ramosus. Rami elongati. Folia sub
pedicellata, semipellucida, subcordata, dentibus utraque 2-5. remotis ob
tusis, mucronatis. Petioli plani longitudine foliorum. Pedunculi Vermineo
les, uniflori. Flores C. geifolia parum minores, lutei

hederifolia Rayeni repens herb. Hoff

Cineraria

Jacobaea orientalis, incana et tomentosa, Acanthiifolia Tournef. Cor. pag. 36.

Habitat in Armenia herb. Tournef.

Caulis lanato-tomentosus, uti petioli et Peduncululi. Folia inferiora subreniforma, pinnata, superiora pinnatifida, suprema lanceolata: lobis inferiorum dentato-angulato, superiorum dentato-pinnato, terminalibus lanceolato, tomentosis, etate supra nudiores, subtus nives. Peduncululi superiores, elongati, alterni. Corymbi simpliciter. Calyx simplex, tomentosus; incanus: foliolis lineari. Flores duplo majores quam in *Cin. maritima*. cui affines

Cinerea

Jacobaea canadensis altissima, foliis integris subtus pubescentibus Vahl
Habitat in Canada herb. Tournef.

Rami ? striati, superne subtomentosi. Folia opposita, 3-4 proliana, lato-lanceolata,
obtusis cum mucronulo, simpliciter venosa, remotissime dentata; dentibus mu-
cronatis, basi versus integerrima, supra glabra, subtus canina. Pedunculus ter-
minalis, solitarius, uniflorus. Flor. majoris. Calyx, uti pedunculi tumentosi
incani. Pedunculi foliis linearibus angustis oppositi. Calycis foliola
linear lanceolata.

Linaria

Jacobaea orientalis, foliis oblongis (ampleximi herb.) non laciniatis, incanis
Tournef. Cor. pag

Habitat in Armenia herb. Tournef.

Herbaceus, sublanato tomentosus, incanus. Folia inferiora sublyrata: la-
cina terminalis subapolluciana, oblonga, obtusissima, obtusa et grosse unisp-
serrata: caulina simplicia, lanceolata, bipolluciana, basi versus angusta-
ta, subtus nervosa, avenia, profunde serrata. Corymbi superne, alterni
simplices. Calycis squama lanceolata, ovate glabres.

1, Cymbalaria folia Cineraria foliis lyratis impari reniformi ^{Dentata} denticulato; caulibus sim-
mis amplexi caulis lobatis integerrimis L. S.V. p. 764 Amon. Acad. 6p. 106
no 81. *

Jacobaea afro, geranii columbinae foliis Vaillant. Art. 570

Habitat ad Q. b. p. e. i.

Radix bulbis foliis Caulis herbaceus erectus simplicissimus tener. ^{extrema reniformia} folia petiolata ^{superiora} glabra nuda subtus
pilis raris adpressis, pennatisifida: laciniis extrema reliquis multo tere major reni-
formis ^{dentata} filiohiada, ^{dentata}: laterales binis parvis angulatis, ^{super-}
natis amplexi caulis. Flores binis in apice term. Pedunculis terminalibus
bifloris pedicellis squamis lanceolatis adpressis. Calyx simplicissimus glaber
oblongus. Pappus purpureus

2. *Lyrata* *Quercus* floribus paniculatis, foliis lyratis, impari reniformi sublobato dentato
subtus tomentosis
Habitat in Arabia Desfont.

Caulis herbarius erectus inferne lanuginosus etate glaber. Folia lyrata infima
reniformia, superiora lyrata ut in *Q. cymbalanifolia*, subtus tomentoso-lana-
ta laciniâ terminali reniformi, ~~se~~ subtota ~~se~~ lobata lobis trien-
tatis ut in *Q. folia* ^{laciniâ} laterales plerumque tres minus angulati. Flores
paniculati pedicelli filiformes basi foliolo petales. Calyx simpliciter glaber
sub decaphyllus flores parvi flani

Lederafolia Cineraria

emarginata. Cineraria foliis pinnato ^{glabris} lyratis laciniis serminatis
dentatis incis majoribus floribus corymbosis
Habitu

humifusa C. pedunculis unifloris, foliis reniformibus subangulatis, petiolis apice auriculatis nudisve Hort. kew. 3. p. 219

after flore luteo, folio Cymbalano Raj. hist. 3. p. 150

after africanus minimus monanthes luteus; foliis angulosis minimis, acens forma vel Cymbalano Raj. hist. 3. p. 161

Habitat in C. p. spec. 4

viscosa C. pedunculis unifloris, foliis pinnatifido-lobatis acutis, viscidis, carnulosis

Hort. New. 7. p. 219

Habitat in C. b. spec. ♂

24 *geifolia* Cineraria foliis reniformibus suborbiculatis sublobatis dentatis, petiolis ^{aureolatis} appendiculatis
cauleque pilosis

Jacobaea africana, *Hedera* terrestris folio, repens Com. hort. 2. p. 145. t. 73.

Jacobaea capensis malvosolio lanuginosa L. b. mus. 1. tab. 22. fig. 2.

Solidago foliis reniformibus suborbiculatis dentatis. Hort. Cliff. 410 *

Cineraria geifolia. pedunculis ramosis, foliis reniformibus suborbiculatis sublobatis
dentatis petiolatis L. b. V. pag. 764. Berg. Cap. 209 *

Habitata in Cap. b. frei

Tota pilosa. Caulis striatus. Folia petiolata, reniformia lobis 9-10 tridentata.
Petiolis foliis duplo longior basi utraque auricula dentata. Pedunculi elongati,
ramosi squama ad basin ramorum setacea et duo minores in ipso pedice
eo. Calyx canescens decaphyllus. Flores lutei.

Cin. geifolia pedunculi ramosi foliis reniformibus angulatis sublobatis per
tescentibus, petiolis superne auratis Hort. kew. 3. p. 220.

5 populifolia Cineraria x floribus paniculatis foliis cordatis angulatis, denticulatis
subtus tomentosis, petioli basi auriculatis
habitat in Madera

fruticosa ramis teretibus tomentosis crassitie penna asperis
folia petiolata cordata, angulata, denticulata, subpollucida
supra lanuginosa subtus tomentosa venosa

Petioli folio brevior basi auriculo aut dentato aucto.
Pedunculi axillares elongati foliis binis vel tres infra
vix fructura caulis

Stores paniculati, pedicellis tenuibus foliolis nonnullis setaceis
in squamosis

Calyx simplex foliolis 12 lineariibus, phaeolatis glabri
flores parvi

C. populifolia floribus corymbosis, foliis cordatis subangulatis subtus
tomentosis, petioli apice multipago-appendiculatis Hort. Kew. 3. p. 220.

Canota Cineraria

Cineraria lanata Jacq. coll. 3. pag. 177.

Habitat in Canariis 5

Caules plures debiles, graciles, erecti: vel ascendentes aut caespitiosi ramosi teretes bipedales pericormi sublanuginosi. Folia alterna longuè petiolata, subrotunda vel major cordata aut emarginata 5 vel 7 lobata, subtus lana densa tecta novella subtus quandoque violacea pedunculi elongati terminaliter uniflori, superne incisati, glabrescens, bracteis lanceolatis vestiti. Flores diametro bipollicari calyce simplex glabro, 14 phyllis foliolis lanceolatis acutis fratis. Corollae radii 14 dentato extus albi intus superne purpurei: disci fabricate purpureo. Pappus albus pelosus Jacq.

malvifolia P. floribus cymosis, foliis cordatis angulatis infra subtomentosis, petiolis simpli-
cibus Hort. kew. 3. p. 220 L Herbar. bot. bayl. tab 32
Habitat in Arcos 7

non vid.

aurea Q. floribus corymbosis, foliis cordatis subangulatis, subtus tomentosis, petiolis basi breviter
natis Hort. Kew. 3. p. 220 L'Heret. fest. Angl. tab 31.

Habitat in Canariis

Rami teretes, tomentosi, glabre nudi. Folia 2-3 pollicaria, cordata acuta,
supra nervosa, arena, nitida, subtus tomentosa, inaequaliter dentata. Petioli
nervi, basi folio semicirculato aucti. Corymbi axillares et terminalis. com-
positi. Calyx glaber. foliola linearia herb. Desfont. an L'Heret?

non vidi

enientia C. floribus cymosis, foliis cordatis angulatis subtus purpurascen-
centis Hort. kew. 3. p. 221. La^{ff} Hæcher fest. angl. tab 33.
Habitat in Canariis 4

non vidi.

6 lobata ~~Corymb~~ Cineraria floribus ^{corymbosis} paniculatis foliis cordatis ^{lobatis} glabris

Cap. 6. maj 5

Caulis ramosus, Rami teretes, glabri, striati, virgati ^{axillares}

Folia petiolata subcordata angulata angulis 3 lobis 3 dentatis, margine ^{inter} ~~inter~~ ^{venis} ~~venis~~ ^{glabris} basi subtransversis

Petiolus pollicaris folio duplo longior, basi latior amplectens

~~Flores corymbosae paniculatis~~
Flore paniculatis
subfastigiatis squamis minutis ad basin
Peduncululus elongatus structura Caulis. Pedicellis $\frac{1}{2}$ liformibus

Calyx simplex heptagynellus, foliolis linearibus glabris acutis, flosculi:

16.

Cineria lobata floribus subcorymbosis, foliis subrotundis multilobatis glabris, petiolis basi acutis, calycibus subcalyculatis Hort. Kew. 3. p. 221.

L'Heret - scilicet - angl. tab 34

3. hastifolia Cinerario foliis hastatis: laciniis lateralibus bifidis divaricatis Lin. Suppl. pag. 376. *

S.V. pag. 765

Habitat in C. b. p. p. i

narva

Caulis erectus, tenax herbaceus, semipedalis. ^{in frithamensis simplicissimus} ^{cum Pedunculo} ^{inferiora superne in caute} <sup>glabra, subtus palli-
diora</sup> folia longe petiolata, ~~ca~~ ^{approximata}
hastata: lobis ^{caudatis} ^{intermediis} lanceolatis, ^{ca} ^{superum} lobis, utrinque saepe denticulo
notata: laterales bifida ^{superum} lobis divaricatis, ^{superum} et ^{deorsum} ^{sa} ⁱⁿ
terdum denticulata ^{unico}. Petioli sesqui pollicares, filiformes, basi parum
latiores. Peduncululus longitudine caulis, foliis lanceolatis, inferionibus dentatis
superionibus integerrimis adpressis. <sup>uni-
septus</sup> Calyx subdecaphyllus. Corolla lutea

pelosa. Cinerea. pelosa foliis ovatis petiolatis trilobis integris que pedunculatis
unifloris elongatis
Habitat in Cap. b. p. i.
herbacea folia per petiolum decurrentia opposita

Papirus pelosus obtusus denticulatus

an hujus generis cum folia opposita

40 repens Cineraria pedunculis unifloris, ^{spathulata} foliis ovatis petiolatis dentatis hirsutis, caule repente.
Habitat in cap. b. pici.

Planta parva facie Bellis minuti, Caulis repens hirsutus. Folia ad apices congesta
petiolata, ~~h.~~ ^{h.} spathulata ^{dentata} utraque bi- ^{tri} ^{angulata} ^{dentata}, hirsuta. Pedunculus
uniflorus, foliis duplo longior ^{filiformis}. Calyx simplex 6-phyllus.

eadem a. Tulof

ramentosa cinerascens floribus corymbosis, foliis cordatis angulatis subtus tomentosis,
petioli superne appendiculatis, calycibus ramentosis & herb. p. 26. n. 8

Cacalia echinata L.

Habitat in Canariis

Calyces adpressi denticulis numerosis

multiflora Ciner floribus cymosis, foliis cordato-ovatis subtus tomentosis, petiolis
dimidio aequalis L'Herit. p. 26. n. 10
Habit. in Inf. Cananen. collibus

non vidi

*Desplagina Cineraria floribus caeruleo paniculatis, foliis reniformi-cordatis multan-
gulis subtomentosis, petalis basi auratis* Ekret. p. 26. n. 12.

Habitat in Canariis O

non vid.

Scapiflora Cineraria pedunculis longissimis unifloris, foliis ovatis glabris duplicato-
dentatis ^{Essent. pag. 25. ii. 3}
Hab: in Cap. b. p. i.
Folia saepe sublobata

ab elongata var. diversa

13 elongata Cineraria foliis subcordatis crispis, pedunculis longissimis subulato-squamosis.
Linn. Suppl. p. 374. L.V. pag. 265.

Habitat in Cap. b. sp. c.

Caulis erectus ramosus sesquipedalis, rufescens ad ramificationes tomentosus. Folia
petiolata subcordata distantia, subnerviis inaequaliter ciliolata, nuda, obtusius-
cula pollicaria. Petioli longitudine foliorum basi subdecurvatis. Pedunculi
terminales longissimi, solitarii simpliciter uni flori, squamis subulatis adpressis.
Calyx simplicissimus lobis 12-14 lam. corollata longitudine flori. Corolla lutea
Pappus nullus L. Suppl. l. c.

Folia tomentosa etate glabra herb. Roy

mitellofolia Cineraria pedunculis subfloris, foliis cordatis glabris late dentatis
petiolis simplicibus & Her. n. 4.

Senecio cordifolius Lin

Tablk in C. bonoppei

Caulis teres filiformis glaber folia petiolata alterna
ovata, craspula avenia densa glaberrima petiolus
longitudine foliorum pedunculi filiformis 2-3.
uniflori elongato

8 cordifolia Cineraria panicula pauciflora, foliis caulinis petiolatis cordatis acuta
ferratis glabris caule angulato L. Suppl. pag. 375. Fairb. fl. Austr. tab. 176
Jacobaea 3. latifolia Clushev. 2. p. 23.

Jacobaea alpina foliis rotundis serratis Bauh. Pin. 70 tab. 67

Jacobaea alpina, ^{foliis subrotundis serratis} laciniata flava Ruprecht. Bauh. Pin. 131.

Jacobaea montana integris rotundo foliis Boie. Mus. 2. p. 61. tab. 49. Barrel. 4c. 145.

Senecio foliis cordato-lanceolatis serratis Hall. h. 63.

Senecio alpinus Scop. fl. Carn. p. 164.

Habitat in Austria

caulis sulcato angulatus. folia petiolata, cordata, supra glabra, subtus pallidiora
scabriuscula, biserrata, acuta, interdum basi utrinque auriculo acuta. Flores
ad apicem in panicula subsessile. Pedicelli et calyx basi tomentos. foliolum
setaceum. ad basin pedicellorum foliola calycina subulata brevia ^{fil.} fusca.

10 rotundifolia Cineraria paniculata pauciflora, foliis petiolatis ovatis-subrotundis integerrimis subtus tomentosis, caule arboreo *Verst. prodr. p. 56 n. 294.*

Brachyglottis rotundifolia *Verst. Gen. n. 46. 1.*

Habitat in nova zelandia

105 - glauca Cineraria racemo simplicis, foliis spatulato cordatis integerrimis, caule simplicis
fimo L. Spec. pl. pag. 1242. tab. V. pag. 764 +

Solidago floribus spicati, foliis subcordatis glaberrimis glaucis oblonge ellipticis om-
plexit aulis Gmel. lib. 2. p. 166. tab. 74

Habitat in Libinia 4

Simplex semper ^{craspedi} digni
Caulis interdum altitudine hominis, glaberrimus sicut tota planta, ^{superne striatus,}
inanis. Folia radicalia plura copiosa, petiolata, ^{magna} spatulata, integerrima
basi angus glauca, subarosa, nervis alternis. Petiolus marginatus super-
ne dilatatus: caulina remota, amplexicaulis, ovata, summa cordato
acuminata basi minor. Flores racemosi. ^{supra doni Ceteri} Pedicelli caulium termi-
natissimi attenuati. Pedicelli simplicissimi, approximati, uniflori
folioli petalis adpressi. Lobula calycis circiter tridecim.

16 petasites Cineraria foliis radicalibus sublyratis; impari cordato sublobato; caulinis amplexi
caulibus lanceolatis repando sinuatis.

Habitat ad fretum magellanicum? Babinus

Caulis herbaceus stratus crassitie fere penno asperis, glaber. ^{glabra axillaria} Folia radicalia
conspicua sublyrata: laciniis extrema cordato lobata subinde ~~subdentata~~ subdentata, apice rotun-
dato basi per petiolulum decurrens in laciniis basi alternis depressis: caulina
lanceolata, amplexicaulia repando sinuata, obtusa subtus pallidiora
Flores in corymbis terminali. Calyx glaber simplex basi squamis nonnullis
fere ser: affinis Radice lutea

17 ^{Cucianthema} ~~pusquamifera~~ Cineraria floribus paniculatis, foliis ^{fratellatis} subcordatis angulatis fistis tomentosis

Caulis herbaceus

Habitat ad fretum magellanicum? Fabricius

Raulis herbaceus ramifus: rami striati angulati stete glabri. Folia alterna
fratellata lamina subrotunda angulata, concava supra glabra, ^{et} infra
subtus tomentosa. Petiolus tomentosus lanatus amplexitricaulis. Flores
paniculati. Calycis glabri basi squamis nonnullis. Pedicelli squamis
Cis adpressi

18 C. in. Cucianthema floribus paniculatis foliis oblongis acutis denticulatis
subpinnatis utraque lanuginosis radicibus cordatis petiolatis adv. p. 253

Leucanthema Pinerana

11 *Salicifolia* Cineraria corymbis axillaribus terminalibusque, foliis ovato lanceolatis petiolatis
et pubescentibus subtus tomentosis

Habitat in America meridionali Banks

Rami teretes striati superne incani. Folio petiolata alterna, ^{Injolluciana} ovato-lanceolata
elongata, consistentia semper verrucosa, supra glabra, subtus tomentosa, integer
rima, interdum minute denticulata, margine parum revoluta. Petiolus
tomentosus semiconquivalans. Corymbi ex alis supremis pedicellis 2-4 flori
squamis minuti setaceis adpressi. Calyx simplex pubescens. Flores parvi radiati
flavi

29. *Difflora* & floribus corymboseis, foliis oblongo lanceolatis acuminatis subdenticulatis
glabris, subtus nervis tomentosis; caule fruticoso Sw. prodr. p. 114.
Habitat in Jamaica 7

non di

12 americana Cinnamomum fruticosum paniculis axillaribus, foliis alternis petiolatis lato lanceolatis
serratis supra glabris subtus canis L. Suppl. pag. 373. t. I. V. pag. 765

Habitat in America meridionali t

Tota planta vestita epidermide et tenuissima lana, quo infra membranula facile
abraditur; hae rami, petioli, pedunculi et inferior foliorum pagina albescunt. Caulis
lignosus. Folia lato lanceolata serrata, venosa confluenta semper recedunt. Pani-
cula axillares. Pedicelli bracteis squamatis, rarius biflori. Calyx polyphyllus
aqualis, ut monophyllum esse credere, basi squamis aliquot irregularibus L. Suppl.
p. 1. c.

P. yglabra B. floribus corymbosis, calycibus cylindricis; foliis oblongis acutis subdeca
siulatis enerviis, utrinque glabris subsessilibus; caule fruticoso Sw. prod.

p. 113.

Habitat in Jamaica 7.

Facies solidaginis a Pisonis

10 *fonchifolia* Cineraria foliis amplexicaulibus pinnatis difformibus L. S. V. pag 764.

Gaiobea fonchifolia, flore purpureo amplo, africana Bryn. prod. 3. p. 31.

Tab. 21. fig. 1.

Habitat in Q. b. p. c.

Caulis herbaceus erectus sempetalis. Folia amplexicaulia; in senio apice dilatata triloba superiora cordata acuta. Pedunculi terminales bini uni flori. Radius 6 florus. Jacq. fig. Bryonii.

non Di.