

Circaea

Calyx. diphyllus, superior. Cor. 2-petala. Caps. 2-loculari non dehiscens: loculis
ms nos per mis.

1. lactiflora foliorum subdentatis glabris
2. ~~intermedia~~
2. alpina & foliorum cordatis acutis glabris remote serratis

63

86

Circaea

Cal. 2-phyllus, superior. Cor. 2-petala, ^{Caps.} 2-locularis, non dehis-
cens: loculis 1-spermis

Lutetiana 1. Curcua caule erecto, foliis ovatis denticulatis opacis pubescentibus
Smith. Fl. Angl.

Lappa sylvestris Frax. Com. p. 843

Curcua lutetiana Lob. Ic. 1. 266.

Curcua lutetiana; caule erecto racemis pluribus; foliis ovatis Lin. Syst. Veg.
Clor. Don. t. 210. hist. Pollut. hist 1. p. 6

β. Curcua canadensis latifolia, flore albo. Tournef. Inst. r. herb. p. 301

Habitat in Europa nemoribus, β in America boreali 4

Caulis erectus, ^{interius glaber} ~~pubescentis~~; parum ramosus. Folia pedicelata, ~~opaca~~ ^{remota}, magne
subrepanda. Racemus terminalis, longus, multiflorus. Tolia ~~interea~~
glabra β. Caulis glaber. Folia elliptico ovata, saepe tripolliciana, extior
sum remota denticulata, basin versus integerrima. Racemus pedalis. Flores
remoti, semi. Calyx glaber.

Prencipem Eranthemum folia ovata opposita, repulis prencipi, floribus luteis
solitaneis Lour. fl. Coch. pag. 19.

Habitat Morambici

Caulis suffruticosus pedalis erectus. Folia parva, integerrima, pilosa. Flores
lutei violacei pedunculati. Cal. 2 phyllis. Corol. tub. filiformis
basi curvatus.

alpina 2. Circaea caule ascendente, foliis cordatis ^{remote serratis} ~~dentatis~~ ^{dentatis} nitidis, calycis mem-
branaeico

Circaea minima Colum. Euphr. 2. p. 79. V. 80.

Siderifolia Circaea alpina Bauh. pin. 168 mon. hist. pl. 52.
s. 7. 34. fr. ult.

Circaea foliis cordatis, acuta dentatis Hall. bot. Helv. n. 814

Circaea alpina; caule prostrato, racemo unico, foliis cordatis Lin. Syst. V.
50

intermedia β foliis ovato cordatis acuminatis pubescentibus dentatis glabris Hoffm.
Fl. germ. 3. Flor. Dan. tab. 256. Ek. beytr. 4. p. 42.

Habitat ad montium radices in frigida et sylvis in frigidis locis β

^{Syst. aler. pro palm. arch.}
Caules humiliores quam in Lutetiana, basi diffusi, geniculis rubris
foliis late ovatis, remote dentatis. Racemi axillares, terminales plerum-
que terni. Calyx albus, apice rubro.

β . magnitudine aequal Circ. Lutetianam et racemo solitario gaudet
Comm. spec. foliis petiolatis oppositis; floribus racemosis; capsulis hispidis

Habitus. Caules herbae vel ^{heres} simples, foliis petiolatis, dent. indivisa
dentata. Flores racemosi, remoti, oppositi.

grandiflorum *Jasminum* foliis oppositis pennatis: foliolis cernis confluentibus L.f.v.

p. 56. Sp. pl. p. 9. 2. 4

~~*Jasminum* foliis ^{magiore} flore externa rubente
4 *Jasminum* *hispanicum* Bauh. h. 2. p. 101. Journ. of the L. S. Soc.~~

~~*Jasminum* *odoratum* Menar. Surin. Tab.~~

Pitragam - nulla Rheed. Malab. 6. p. 91. Tab. 52

Habitat in Malabar & et in America &

4 *Chamogelminum* *grandiflorum* Lab.

Jasminum *humile* *magna* *flore* Bauh. pin 390.

grandiflorum 7. foliis oppositis pennatis: foliolis obtusifoliis, gemmis horizontalibus H. Kew. 1. p. 10

Simili officinali ^{olea} folia inferiora magnitudini infrequentum
par ultimum cum terminali connatum