

# Cisampelos

1. parviflora L. foliis peltatis cordatis
2. caespitosa L. foliis basi petiolatis cordatis
3. smilacina L. foliis cordatis angulatis.
4. frutescens L. caule erecto fruticoso, foliis cuneatis

*Cusampelos*

Habitat Cayenne herb. Desfont 7  
Solubilis. Rami teretes, tomentosi. Folia petiolata, alterna, 2-5 pollicaria, ovata vel  
oblonga, acumine brevi terminata, coriacea, supra glabra, obscure venosa, subtus incana  
nervosa, reticulata, quinque nervia, nervi duo interdum superiores. Petioli  
pollicari, apice incrassatus. Panicula incana, contracta, petiolo parum longior.  
Flores minuti. Fructus oblongi, tomentosi, incani

*Cinnamomifolia* Cusampelos

— Habitat in Java herb. Rich. 5

Rami glabri, teretes. Folia breviter petiolata, basi triplicata, elliptica - lanceolata, acuminata, basi versus semper attenuata, acuta, venosa, glaberrima, hinc et raris, integerrima, subnitida. Flores masculi in corymbis parvis racemosis, longitudine folii. Fructus compressifolius subglobosus, subnegotus, majora etudine  
pisi

1. *Pareira* A. foliis peltatis cordatis emarginatis Linn. S. V. p. Sw off. 6.

pag 300.

*Caapeba* Martz. Bras. 24. Pl. bras. 94

*Caapeba* foliis orbiculati et umbilicato Linn. Plum. gen. 33.

Plematis bacc. fere glabra et villosa, rotundo et umbilicato  
foliis Plum. am. 70. 7. 93. fig. 1. ~~70~~

Cajampeloi caule exerto suffruticoso simplicissimo Linn. et 2674

13. *Caapeba* foliis orbiculati umbilicato et tomentoso Plum  
gen. 33.

Habitat in America meridionali et India orientali.

Caulis scandens volubilis 10-15 pedalis striatus glaber vel  
hirsutus. Folia peltata, cordata alterna integerrima

vel emarginata mucronata supra glabra subtus  
penni infra tomentosa nervosa venosa <sup>tipolliciana</sup> ~~foliati~~

Racemi compositi axillares, flexuosi simpliciores  
in foemineis, pedicelli masculi subdorsi foemineis inflo  
conferti 5-6. flores minutissimi <sup>folia</sup> racemi <sup>8 nipa nipa</sup> ~~racemi~~ <sup>strucum</sup>

foliorum caulis vix peltati. <sup>8 nipa nipa</sup> ~~germina~~ <sup>lupeda</sup>

vel emarginata indifferenter

Caapeba *S. foliis basi petiolatis integris* Lin. P. V.

Caapeba folio orbiculati non umbellato Plum. gen 33.

c. 67. fig. 2.

Habitat in America meridionali.

Similis procedenti differt foliis non peltatis

micromia sub hoc nomine mis. Swats folio velloso simile  
meniper paniculato & v. diversa.

Rami teretes glabri; ramuli indivisi. Folia ovato-cordata, multinervia  
venosa, mucrona terminata, supra glabra, subtus tenuiter villosa, cana  
& centis 12-3 pollicariis. An a caapeba diversa cum secund. figura  
folia basi cordata (sunt hinc 4 us).

*Juncus* Q. foliis cordatis acutis angulatis Lin. P. V  
*Sonchus* tenuis, folio angulato pedicello Pat. Carol. 1. p. 51. v. 51.  
Habitat in Carolina  
fructificationem imperfectam tantum vidit Linnæus.

non vidi

4 fruticosa P caule erecto fruticoso, foliis ovatis petiolatis integris Len Suppl  
pag 432. S.V. pag 898.

Habitat ad Cap. b. Speit,

glaber. Folia alterna interdum plura ex eadem gemma  
cuneata subcoriacea basi acuta, obtusi sive unguicula  
na integerrima pedunculati axillares

Cunila