

# Cistus

## \*\*\* Stipulati herbacei

ledifolius C. erectus, floribus solitariis subsessilibus, capsulis calyce longioribus  
salicifolius C. prostratus, floribus racemosis erectis, pedicellis horizontalibus  
capsulis longitudine calycis

meloticus C. erectus subtomentosus, floribus subsessilibus racemosis, foliis ellipticis  
agrythaeus C. <sup>calyce rotato</sup> erectus foliis linearibus lanceolatis, petalato calyce inflato  
colla majoribus

## \*\*\*\* Stipulati suffruticosi

liquarietis C. <sup>tenax, glabro</sup> foliis oppositis glaucis orbiculatis

lippii C. foliis alternis oppositisque <sup>tenax, glabro</sup> oblongis villosis tomentosis,  
quibus lateralibus grandis

surjanus C. procumbens, foliis ovato-oblongis subsessilibus, petalis lanceolatis

nummularius C. foliis inferioribus et ramulorum suborbiculatis, superioribus  
caulis oblongis

canariensis C. foliis obovatis planis oppositis alternisque canis, capsulis  
pubescentibus.

- Loetius* C. procumbens, stipulis lanceolatis, foliis oblongi scabri  
*Sesquillifolius* C. foliis oblongis, calycibus lobatis  
*asciendens* C. caulibus ascendentibus simplicibus foliisque oblongis <sup>velloso</sup> subtus rugosis  
 bracteis cordato-ovatis, capsulis glabris  
*Dorsifolius* C. procumbens, foliis ovatis <sup>velloso</sup> petiolatis <sup>velloso</sup> revolutis, in aeneo  
*glutinosis* C. foliis linearibus <sup>velloso</sup> oppositis <sup>alternis</sup> alternisque, pedunculatis <sup>velloso</sup>  
 glutinosi <sup>stipulae sunt lanceolatae et abaque</sup>  
*Thymifolius* C. erectus foliis linearibus oppositis glabris, pedunculatis calyci-  
 busque <sup>velloso</sup> viscosis ramis lobatis  
*Torofus* C. foliis linearibus oppositis <sup>velloso</sup> marginatis ramisque <sup>velloso</sup>  
 scabris, et <sup>forte</sup> <sup>mea</sup> <sup>sancti</sup> <sup>procedenti</sup>  
*Arabicus* C. procumbens foliis linearibus ramulorum confertis linearibus  
 oppositis, floralibus alternis lanceolatis  
*rubellus* C. procumbens in aeneo, foliis linearibus revolutis, calycium  
 nervi pilosis, capsulis pubescentibus, stipulis linearibus  
*pilosus* C. praetenuifolius in aeneo, foliis linearibus revolutis, stipulis ac-  
 cularibus, calycibus <sup>pubescentibus</sup>

Carandula folius C. foliis lanceolatis linearibus tomentosis, calycibusque secundis racemosis  
si tomentosis racemosis secundis pendulis tenuissimis cernuis

racemosis C. foliis linearibus canescentibus, calycibus racemosis nervoso-angulatis glabris

geminatis  
nigris

erectus C. erectus ramosis foliis linearibus lanceolatis obtusis supra nudis subtus canis, stipulis linearibus ciliatis an varietas Helian

angustifolius C. diffusus, foliis lanceolatis, calycibus hirsutis

fulgens C. caule ramoso erecto, foliis linearibus lanceolatis subtus inanis stipulis subulatis, caule angustif. pinnata an varietas nigra

apennina C. patulus, foliis subtus inanis in fimo lanceolatis planis, superioribus linearibus revolutis

heros C. foliis oblongis ~~ovatis~~, racemosis secundis calycibus hirsutis, capsulis villosis  
linearibusque revolutis

Helianthemum C. procumbens, stipulis lanceolatis, foliis oblongis ~~revolutis~~ ciliatis lanceolatis

mutabilis C. procumbens, stipulis lanceolatis, foliis oblongis planis glabris subulosis, calycibus villosis

polifolius C. procumbens, foliis oblongis - ovatis inanis, calycibus lobatis petalis cernuis

*Limnium* Lestri herbaceus ex stipulatus foliis oppositis lanceolato  
oblongis 4-6 nerviis, petalis fenatis Caron. Fi. 2. p. 57. tab  
175 fig. 1.

Habitat in Hispania

Folia glutinosa. Gyllofa Corolla lutea unguibus nigris  
omnino pinnatis quittate Diversus tantummodo petalis fenatis  
Caron. folio

*Helianthemum creticum* annuum lato plantagineo flore  
aureo Tournefort. herb. Mus.

encoides *Cistus* *extipulatus* caule suffruticoso erecto, foliis alternis im-  
bricatis semicylindricis brevibus Lavan. cc. 2. p. 56. tab. 172.  
Habitat in hispania.

Caules erecti pedales ramosi. Folia conferta imbricata glabra  
semiteretia supra canaliculata. Flores solitarii terminales &  
axillares veluti pedunculati semipolliniferi. Calyx rubescens  
Corolla saturate lutea. Cappula globosa Cav

non vidi

cinereus *Cistus erythralis* suffruticosus foliis oppositis subtomen-  
topis ovato acutis, floribus racemosis. racemis subtinctor  
minutibus Cavan. Ic. 2 p. 33. tab. 141.

Habitat in regno valentino

Caules prostrati valde ramosi rami oppositi albidis cinerei  
ut. tota planta et tomento brevissimo. Petoli connati  
foliis brevioribus. Pedicelli alterni. Calyx ovatus rubescens  
lobis albis 2 externis foliola <sup>petala</sup> minima internis  
ovata. Corolla lutea immaculata. Capsula 3-lobis  
3-loculari Cavan.

violaceus Cistis stipulatus suffruticosus, foliis oppositis lineari-  
subtomentosi calycibus corbis violaceis Caran. f. 2. pag  
30. tab. 147.

Habitat in Regno Valentino ?

Caules declinati rami erecti semipedales. tomento tenuisimo  
pubescenti inferne foliosi superne nudi. Folia subsessilia  
marginem revoluta. Stipula subulata. racemis termi-  
nali; pedicelli basi stipulati Cal. glaber 5-natus foliolis  
duo externis ovata. Corolla alba unguibus luteis  
Caran.

Cori. Cotui stipulatus suffruticosus foliis linearibus brevibus oppositis  
margine revolutis Caran. Desf. Ic. 2. p. 35. tab. 145 fig. 1  
an Chamacistus luteus thymifolius seu major Barab. ii. 443.  
Habitat in Hispania 3

Caulis heri, rami erecti semipedales teretes glaberrimi uti  
tota planta supra tantum vili alyquod. folia sessilia angus-  
ta. floralia alterna bipinnulata. Racimi terminalis 4-5 flori-  
peda illis uniflori. Foliole externae calycis linearisetacea  
interiora ovata concava sive ut nati. Corolla saturate  
lutea immaculata. Caps. loculis semonopis nri Caran

non vidi



organifolius - Cistis: folus oppositi petiolatis ovatis utroque pilosi  
La Mart. Bot. Em: vol. 2. no 35 - Caran. G: vol. 3. pag 31.

tab 262. fig. 1.

Habitat in Hispania 5

Asperifolius ex stygularis

mollis *Cistus foliis suborbiculatis. tomentosissimus* Cavan. Ic. vol. 3. pag.

32. tab. 262 fig. 2.

Habitat in hispania  
suffrutic. sem. ex stipulatis

Dichotomus Cistus foliis ovatis glabris, floribus racemosis, caule dicto  
tomo Casuar. 4. vol. 3. pag 32 Tab. 263. fig. 1.  
Habitat in Hispania 5.  
exstrigulatus suffruticosus 3

glauca Cist. foliis ovatis glaucis margine revolutis floribus roseis  
Cavan. hi: vol. 3. pag. 31. Tab. 261.

Habitat in Hispania &  
suffruticosus populatus

Lineari Cestris suffruticosis, stipulatis, tomentosis, foliis lineari-  
floribus racemosis. Coran. u. Vol. 3. pag. 8. Tab. 216  
Habitat in Hispania 5

an racemosus

*Stenotus Cistus folis subsulcatis canis, ramis oppositi fructu Cava*

4c. vol. 3. pag. 32. tab. 263. fig. 2.

Habitat in Hispania  
Stipulatus suffruticosus

Cedifolius P. erectus glaber, floribus solitariis <sup>sub</sup>scapulis, foliis ternatis oppositis  
Horn. l. v.

Pastus annuus, foliis Cedi Lobel. ic. 2. p. 110.

Pastus hedi folio Bank. pen. 465

Habitat montis pelii C.

variet caule prope glabro et villos, folia floralia saepe absque  
stipula hinc simplicia

capulis calycis

congruentibus

non vidi

*Lalicifolus*  $\odot$  patulus villosus; floribus racemosis erectis, pedicellis horizontalibus.

Lin. h. V.

*Cistus annuus* L. Clus. 1. p. 76.

*Cistus folio filii* Bauh. pin. 465.

*Helianthemum annuum humile*, foliis ovatis, flore fugaci sequ.  
fl. ser. 3. p. 197. t. 6. fig. 3.

Habitat in hispania, Hispania  $\odot$

Caulis pluri vel caulibus ramosis, raro superne, digitales vel  
per mare adfidentes teretes villosi puberuli. Folia  
inferiora opposita petiolata oblonga vel lineari lanceola  
sa obtusa villosa pubescentia unguiculari, superiora  
alterna cum stipula utraque ternata, floralia absque  
stipula lineari lanceolata. Stipula lineares duo utroque  
ad singulum folium folio breviori, lineari. Racemus termi  
nalis ante <sup>incurvatus</sup> exsertionem florescentiam apice revolutus,  
pedicelli brevissimi oppositi folii. Folia calycis  
lanceolata attenuata villosa duo exteriora minor  
flos pallide flavus

capulis longitudine

calycis



Egyptiacus C. erectus, foliis linear-lanceolatis, pedicelatis, calycibus inflatis  
Corolla majoribus L. V. p. Mont. 404. & Jacq. off. 3. p. 174. G. D.

Habitat in Egypto C

Planta palmari erecta, caule filiformi, ramis, villosis. Rami  
opposita foliis linear-lanceolata. pedunculata racemus semi-  
nalis tri- & quadriflori. Doliola 2 externa calycis parva ad  
basin calycis linearia: interna 3 conuientia in vesicam ovatum  
inflatan nec deficiente ante maturitatem fructus. Membrana  
membranacea, margine perispermica nervi quatuor aliatis  
calyx ovatus attenuatus

Squamatus <sup>Q</sup>, folus oblectis squamis orbiculatis Len. Spec. pl. pag. 743 &  
Pistis humilis, floribus compactis in verticillis, minori halimi  
foliis Boec. mus. 2. p. 76. t. 64. Mart. c. 27.

Habitat in Hispania <sup>tota</sup>

distinctissima ab omnibus squamis argenteis actidis uti in Elcagno  
erectis ramis oppositi folia petiolata lanceolata vel oblonga  
obtusis plana inferna pollitana. Rami <sup>secundis</sup> terminalibus  
foliis et la axillaris oppositi, saepe bifidi. foliolo  
calycis exteriora linearia interiora oblonga nervitibus  
altis <sup>plus gyna</sup> <sup>conspicuo</sup> <sup>vidund cor.</sup>  
elevatis petala longaitudine calycis. bracteo parve  
ovato

Surrejanus P. procumbens, foliis ovato-oblongis subpulvis, petalis laniolatis  
Linn. p. v.

Helianthemum vulgare, petalis florum perangustis Will. Elm.  
177. t. 145. fig. 174

Habitat in Angliâ comitatu Surrejano prope Croydon

non vidi

canariensis C. procumbens, foliis subovatis alternis et oppositis, racemis erectis.  
Floreus Musc. 2. p. 399 G. rar. 8. 16. L. V. p. 499

Habitat in Canariis

Rami uti folia tomento tenuissimo canescente. Folia plerumque  
alterna inferna unguiculata basi acuta. Stipula  
minuta subulata. Racemi terminales secundi, flores distan-  
tes bractea minuta setacea ad basi pedicellorum. Calycis folio-  
la exteriora setacea, interiora pubescentia nec vis perpersis  
ovata obtusa.

---

foliis <sup>planis</sup> obovatis oppositis alternisque canis  
capsulis pubescentibus

Leppi: Cistus suffruticosus stipulatus cretus, foliis alternis oppositisque lanceolatis pabris,  
specie secundis l. F. V. pag. 499 An. mant. 2457  
Cistus stipulatus; fruticosus; foliis confertis, tomentos ovalibus, breviter petiolatis; mar-  
gine revolutis Corrh. de Kir. pag. 100

(Planta spontanea ramis foliisque utriusque canescentibus, folia juniora axillarum raro  
culta Stipula sericea. Calycis pilosi, fereci.

Culta fruticulus semipedalis ramis alternis albidis, folia oblonga  
obtusiuscula seminequeulana. <sup>interna cinerei</sup> picea terminalis solitarii pedunculata  
Cacti cum ramo alternis et confertis demum laterales, folios ternis  
to oppositis <sup>incunata</sup> picea 3-7 floris foliola saepe inter flores, ovata. Stipula  
lanceolata & alio villosa tomentosa. Petala calycis vix majora  
flava

oblongis villosis tomento

si, specis lateralibus secundis

~~2~~ cordifolia Trigia

melchior C erectus subtomentosus, floribus racemosis solitariis sessilibus oppositifolius  
Linn. Mant. 246. \* I. Vray 499.

Habitat in Aegypto C

Caulis pubescentissimus pedalis, erectus teres subtomentosus. Rami radiales  
ces adscendentes breviores: caulini versus summitatem alterni  
erecti, pauci. Folia opposita petiolata, elliptico lanceolata  
sa, patula, subtomentosa venosa, articuli longiora. Stipulae  
lobis ensiformibus folio dimidio breviores, persistentes.  
Racemus terminalis erectus fructus. Flores alterni subsessiles  
solitarii oppositifolii. Petala lutea. Calycis foliolo  
terna interiora trinervi extensa linearia similis  
ledifolia at multo major Linn

foetida & prostrata, *Rapula lanicolata* foliis oblongis scabri Gaoyu  
Musi: 2. p. 341. 4c. var. t. 10.

non vidi.



*Scrophyllifolius* C., foliis oblongis calycibus loricatis L. S. V

*Chamaecistus* 2. Pluf. hist. 1. p. 23.

*Chamaecistus repens scrophyllifolia* Lutea Bauh. pin. 466

*Chamaecistus scrophyllifolius* nigricans et hispatus, flore aureo odorato

Bauh. hist. 2. p. 17.

Habitat in Austria, Stiria alpebus.

non vidi

alliconi diversa a lina

Syn. Bauh. pin. ad aliam forte  
plantam pertinet

Bosch. *C. procumbens*, foliis ovatis petiolatis revolutis incanis

*Cotula stipitata* Bosch.

Habitat in Egypte

Trunculus digitalis basi ramosus, floribus radiatis. foliis minutis confertis

Ha .

arabicus Cistus suffruticosus stipululatus procumbens foliis linearibus <sup>pedunculorum</sup> alternis, ramulorum confertis Tab.

Helianthemum coccineum linearifolium florae croceae Tournef.

<sup>Carol.</sup> Cistus arabicus: suffruticosus & stipululatus, foliis alternis lanceolatis planis lobis lin. l. v. par. 500

Rami aphylli procumbentes domum ascendentes, saepe pedales, teres, glabri, tenuis, apice in pedunculum absque ramulis descentes. Ramuli a basi usque ad apicem

spatium bis tripel longe si alterni, pollicares, patentes, simpliciter, d. hautes, steriles, supremi floriferi simpliciter elongati cineo pubescentia folia in ramulis sterilibus conferta, bilinearia, declinata, linearia, rigidia sculo, acuta, obtusiuscula, ultima tomento subcinerea. Stipula minuta ovata. Folia ramorum floriferorum latiora et longiora pubescentia. Stipula lanceolata

Racemus terminalis 3 si 4 florus, bracteatus. Pedicelli distantes veloso pubescenti, sub flora versus apicem, sub flora parum crasiores

Paley pilosus subvillosus: Follicula interna in nervis, interstitialis  
membranacea: externa lanceolata.

hispidus G.

Helianthemum flore albo folio angusto hispido Tournef. i. v. l.  
hab. Musci

Habitat 22 t 9us/

Frustrum sergii pedalis, erectum ramis oppositis

Cistus

Cistus humilis L. Clus. hist. hisp. 151.

Helianthemum lanuifolium majorand folio Tournef. inst. v. h.  
herb mus.

Habitat in Hispania ad T. Guesen

41-42 Cardanulifolius Cistus suffruticosus stipulatus, foliis lanceolato-linearibus tomentosis

calycibus racemosis tomentosis, secundis pendulis

Cistus folio lavandulae Clus. hist. l. p. 72. Turis

Cistus folio spiceo Bauh. Pin. pag. 465.

Cistus folio lavandulae Clusio, forte idem cum Helianthemo recte Bauh. h. 2.  
pag. 5.

Cistus lavandulae latifolius folio Barrel. Ic: 238.

In Hispania, Maspicio ad collibus aridis regni Tunetani observari ty

Cistus lavandulae frutex palmaris, interdum pedalis, inferne ramosus. Rami teretes; erecti,

ca. folio Thymifolius tomentosifiniari

Barrel. Ic. 243.

Folia Petiolata, opposita, lanceolata linearia, utraque tomentosa incana  
avancis revoluta, rigida, mucronata, polluciana, fasciulis foliorum minorum  
in singula axilla.

Petiolus brevissimus.

Stipulae utranque geminae, subulatae, ultra molliter pelosae, ultra purpureascentes, patentes

apice reflexo.

Radunculi terminales, solitarii, saepe gemini. Basemi

Racemi terminales, solitarii, saepe gemini, ante florescentiam, apice revolu  
ti. Floris secundis pendulis. Bractea nulla

Calycis solidi duo exteriora lanceolata, ultra pelosa-ciliata; interiora ovata,  
et causa majora, acuminata, tomentosa, incana, intus glabra, in

~~major, acuminata, tomentosa, incana, enervia, intus glaberrima~~

~~Corolla flava immaculata.~~

~~Differ~~

major, acuminata, tomentosa, incana, enervia intus glaberrima

Corolla flava

~~Corolla flava immaculata  
fuit tomentosa, incana, enervia, intus glaberrima~~

41-42. ~~Corolla flava immaculata. fuit tomentosa, incana, enervia, intus glaberrima. Corolla flava immaculata.~~



racemosus Cistus suffruticosus striplatus, foliis linearibus, <sup>revolutis</sup> <sup>anaphylatibus</sup> calycibus racemosis secundis glabris  
nervosis angulatis, glabris.

Cistus racemosus suffruticosus striplatus, foliis lanceolato-linearibus pubes  
tomentosis Lin. V. par. 500. ex classe Syl. 1300. que ad Lavandulifolium

Frustr debilis: <sup>femineo</sup> ramis superioribus et caulis foliorum remote marginatis, superne  
tomentosis, inians.

Folia opposita, brevissime petiolata, linearia, revoluta, levissime tomentosa.

Stipula setacea, purpurascens; utroque gemini, longitudine petioli.

Flores in racemo terminali, solitariis, secundis, pendulis. Bractea nulla

Calyces glabri, ovati, acuti angulati. lobula duo exteriora setacea, interiori  
bus breviora: exteriora ovata, nervosa, fulcata.

(Differet a Lavandulifolia foliis angustioribus, brevioribus, minus tomentosis  
absque microne in apice, neq foliiculis foliorum in axillis: Calycibus  
calycibus minoribus glabris et nervis ovatis angulatis.)  
Synon.

<sup>icant</sup>  
~~negras~~ C. excelsus ramiflorus foliis supra linearibus lanceolatis obtusis supra nudis  
subtus micans stipulis linearibus ciliatis

Habitat in <sup>inferna</sup> Hispania

ramis <sup>inferna</sup> teretibus glabris articulatis a caepe foliorum filiformes, oppositi  
fili simpliciter. Solia unguiculata, petiolo, opposita supra  
linea exarata, arearia. Stipulae folio dimidio breviores. Raris  
bractea linearis pedicello duplo brevior calyx nervi et lobis  
si pubescentibus  
folia exsiccatione nigrescentia

in folia plana

Intocularis Conthones <sup>Conthones</sup> capsulis Intocularibus Trivalvatis Inguetris: angulis bifidis /  
tris, foliis oblongis: serratis infimis setaceis etc. L. V. pag. 101.  
Conthones ostuans Tosh. Deser. pag. 101

angustifolius & diffusus, foliis lanceolatis calycibus hispitis Jacq. hort. 3. 8. 53  
L. S. pag. 500.

non vidi characterem sufficiens

*Cnicus*  
splendens C. caule ramoso erecto, foliis lanceolatis subtus incanis.

Habitat in Hispania

Cultra glabris, sicut caule foliis supra calycibusque glabris  
spontanea villosa. rami oppositi folia unguiculata mar-  
ge revoluta. omnia opposita, stipula subulata. racemus  
elongatus saepe calycis nervis purpureis angulati.

affinis videtur C. racemoso

as *Stipula glabra* an nigricante *diversus*

racemosus C. foliis lanceolato linearibus subtus tomentosis Lin Mant 7 6. x

f. V. pag. 500

Cistus Lavendula folio, Thysfordi Barr. ii. 293.

Habitat in Hispania.

*Helianthemum*  $\odot$  procumbens, stipulis lanceolatis, foliis oblongis revolutis subpilis  
sit in spec. p 7444 fl. Dan. tab. 101.

Flor. solis, *Panax chronium* Cam. epit. 501.

*Chamaecistus* vulgari flore luteo Bauh. pin. 465. Loeffm. 43. tab. 0.

Habitat in Europa passim sicut

Caulis feli formis villosi. Folia petiolata, omnia opposita proter  
unum vel alterum brevem linearem in pedunculo. Folia juniora  
nisi supra pilosissima subtus cespitosa. Petala flava ungue  
fulvo integerrima. Capsula villosa

In montosis Europa australi occurrit Cistis ab hoc *Helianthemum*  
forte sit diversa. caulibus et foliis majoribus. caulis scabri  
folia polliciana supra pilosissima margine vix reflexa, dentibus  
to scabris, pili longiores in calyce et nervi majori elevati  
alia adhuc Tuncis lecti conspicua calycibus flombusque  
majoribus quam in hel. nostra. folia juniora utrinque casana  
stipula angustiores.

mutabilis & procumbens, stipulis lanceolatis, foliis oblongis glabris planis Saegyu.  
Misp. 2. p. 340. Fr. rar. 4. 17. S. V. p. 560.

non visc



apenninus C patulus, foliis lanceolatis hirsuti Lin. 1. V

Helianthemum album germanicum Tabern. ii. 1062.

Helianthemum saxatile, foliis et caulibus incanis oblongis, floribus  
albis Mentz. pug. 8. fig. 3.

Habitat in apenninis, et alio montibus.

Q. Cuius helianthemis parum diversa foliis caule ericaceo magis  
pubescente stipula angustiores et breviores foliis superioribus  
lineari-bus revolutis cuncta folia infra. Capsula ut in  
helianthemis pubescente

patulus foliis subtus incanis <sup>margin</sup> inferioribus lanceolatis planis  
superioribus lineari-bus revolutis

polifolius Q proclumbens, foliis oblongo-ovatis incanis, calycibus lobatis,  
petalis serratis L. P. V

Cistus humilis alpinus duros, foliis oppositis folio candicante. Pluk.  
alm. 107. t. 23. fig. 6

Chamaecistus montanus, foliis folio Ray angl. 4. p. 274. t. 274. fig. 2.

Helianthemum montanum, foliis folio incano, flore candido Hill. Clus.  
174. t. 145. fig. 172.

Habitat in Ofpuano Sabano anglorum ad Brendenon 5. d. d. t. 4. fig.

Helianthemum foliis polii montana Tournef. 2. v. herb. 365

Cistus olea foliis villosis flore aureo Tolemus Barrea. p.  
365. See. herb. Mus.

~~namdi~~

geminatus  
~~diffusus~~ C. foliis lanceolatis canescentibus junioribus revolutis racemis termi-  
nalibus geminatis

Habitat in Regno Marocano Schousboe

Caulis ascendens superne alterne ramifus. folia petiolata  
superiora alterna subtus venosa <sup>at utriusque</sup> magis canescentia plana  
vix pollicaria fasciculus foliorum in axillis foliorum utri-  
suprema margine revoluta stipula lineari parva. racemi  
ex apice ramorum plerumque gemini. floris parvi calyces  
villosi acuti trinervi folioli exterioribus angustissimis interiori-  
bus ovatis capsula pubescens